

ESTADÍSTICAS 2022

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD)
Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Eva SÁNCHEZ.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Rosario BALLESTA
Ara MILLÁN
Mónica TENA
Lara FORNOVI
Antonio SUÁREZ

Aragón

Carmen BARANGUAN
Francisco Javier FALO
Laura JOSÉ

Asturias

José María BLANCO
José Antonio GONZALEZ
Luisa GONZÁLEZ
Javier DOLADO
Julio César FERNÁNDEZ

Baleares

Francisca BIBILONI
Rut SUÁREZ
M^a Eugenia JANER
Alicia MAGISTRIS
Ana FERRER

Canarias

Nayra FERNÁNDEZ
Nicolás PERDOMO
Nicolás AMADOR
Ángel RODRIGUEZ
María del Mar VELASCO

Cantabria

Carmen DIEGO
Antonia RUEDA

Castilla-La Mancha

Carlos ALONSO
Carmen DE PEDRO

Castilla y León

Susana REDONDO
Ana SÁNCHEZ
Esperanza VÁZQUEZ
Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Joan COLOM
Mercè GOTSSENS
Xavier MAJO
Regina MUÑOZ
Josep M. OLLÉ

Extremadura

Mercedes CORTÉS
M^a Pilar MORCILLO
José Antonio SANTOS

Galicia

Sara CERDEIRA
Mercedes LIJO
María TAJES
Sergio VEIGA
Jaime FRAGA

Madrid

Ana RUIZ
Piedad HERNANDO
M^a del Carmen ÁLVAREZ

Murcia

Mónica BALLESTA
M^a Dolores CHIRLAQUE
Juan Francisco CORREA
Lourdes MORENO
Isabel ROSA

Navarra

Raquel GONZÁLEZ
M^a Ángeles NUIN
Esther FIGUERAS

País Vasco

Elena ALDASORO
Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA
Itziar LARIZGOITIA
Mikel SÁNCHEZ

La Rioja

Cristina NUEZ
Pello LATASA

Comunidad Valenciana

Ofelia GIMENO
M^a Jesús MATEU
Francesc J. VERDU
Blanca NAVARRO
Noelia SELLES

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA
Ana POSTIGO
Cleopatra R'KAINA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO
Juan Luis CABANILLAS

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las comunidades autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional y Departamentos de Educación de las comunidades autónomas.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre el Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, responsables en las diferentes comunidades y ciudades autónomas y organizaciones no gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

CONTACTO

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid
Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08
Correo electrónico: cendocupnd@sanidad.gob.es
Internet: <https://pnsd.sanidad.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 133-22-092-1

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado (CPAGE): <https://cpage.mpr.gob.es>

CITA SUGERIDA: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Estadísticas 2022. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Madrid: Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; 2022. 304 p.

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) hace público su informe cada año. En él se compila sistemáticamente información de las diferentes fuentes y sistemas de obtención de datos sobre aspectos del consumo y sus consecuencias, de reducción de la demanda de drogas, y también sobre el control de su oferta. La continuidad de este informe a lo largo de los años, y el mantenimiento de las series y de su comparabilidad son uno de los mayores activos de esta Delegación del Gobierno. A lo largo de los años y de los cambios, todas las personas que la han dirigido han velado por preservarlo.

En esta edición se incluyen los resultados pormenorizados de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) del año 2021, junto con el análisis de los indicadores de admisiones a tratamiento, urgencias, y mortalidad relacionada con las drogas, además de sus tendencias hasta 2020. Incluye también información sobre otros problemas relacionados, como las infecciones en consumidores o el consumo problemático, así como capítulos específicos dedicados al Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT) sobre nuevas sustancias psicoactivas, o relativos a la oferta de drogas y las medidas de control.

La solidez y trayectoria de los informes anuales elaborados por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, permiten establecer de forma robusta un diagnóstico global del estado de situación de las drogas y las consecuencias de su consumo a nivel nacional. Este es un ejercicio de gran valor para que las políticas y actuaciones se basen en datos, y sirve de apoyo a la toma de decisiones. Pero además proporciona información a la ciudadanía y a todos los agentes sociales para un mejor conocimiento de esta realidad, proporcionando respuestas a la demanda social de transparencia.

Este informe no habría sido posible sin la colaboración de todas las personas e instituciones que, con su trabajo, contribuyen anualmente a su edición: quiero expresarles mi más sincero agradecimiento. En particular, deseo reconocer la profesionalidad y dedicación del equipo de profesionales del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: sin su labor y su esfuerzo, la sociedad no tendría este informe a su disposición.

Joan R. Villalbí

Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

ESTADÍSTICAS 2022

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

ÍNDICE

Presentación	3
Introducción	31
1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas	32
1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EADDES), 1995-2022	33
1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2021 ..	34
Metodología: muestra	
1.2.1. Evolución del tamaño de muestra (alumnos, colegios y aulas) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021	34
1.2.2. Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021	35
1.2.3. Error muestral de la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p=q=0,5$). España, 2021	35
1.2.4. Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2021	36
1.2.5. Distribución de los estudiantes de 14 a 18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2021	37
1.2.6. Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2021	38
Prevalencia de consumo de drogas: total, sexo, edad	
1.2.7. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021	39
1.2.8. Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2021	41
1.2.9. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021	42
1.2.10. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021	43

1.2.11.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2019-2021	44
1.2.12.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021	45
1.2.13.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021	46
1.2.14.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2021	46
1.2.15.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2021	47
1.2.16.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2021	47
1.2.17.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2021	48
1.2.18.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	48
1.2.19.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2021	50
1.2.20.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2021	50
1.2.21.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2021	51
1.2.22.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2021	51
1.2.23.	Edad media de inicio (años) en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 2021	52
1.2.24.	Edad media de inicio (años) en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2021	53
1.2.25.	Prevalencia de consumo de drogas y otros trastornos comportamentales alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	54
1.2.26.	Prevalencia de consumo de drogas y otros trastornos comportamentales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	56
1.2.27.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	58
1.2.28.	Prevalencia de consumo diario de drogas y otros trastornos comportamentales en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021	59

Prevalencia de consumo de drogas: comunidad/ciudad autónoma, 2021

1.2.29.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (años). España, 2021	59
1.2.30.	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021	60

1.2.31.	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021	61
1.2.32.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021	62
1.2.33.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021	63
1.2.34.	Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021	64
1.2.35.	Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021	65
1.2.36.	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021	66
1.2.37.	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021	67
1.2.38.	Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021	68
1.2.39.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021	69
1.2.40.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021	70
1.2.41.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021	71
1.2.42.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021	72
1.2.43.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021	73
1.2.44.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021	74
1.2.45.	Prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021	75
1.2.46.	Prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021	76

Prevalencia de consumo de drogas: evolución temporal 2014-2021

1.2.47.	Evolución de la incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2021	77
1.2.48.	Evolución de la incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (números absolutos). España, 2014-2021	77

Prevalencia de consumo de drogas: incidencia 2021

1.2.49.	Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021	78
1.2.50.	Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos). España, 2021	78

Consumo por tipo de droga: bebidas alcohólicas

1.2.51.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) (%), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal (años), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2021	79
1.2.52.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	80
1.2.53.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	80
1.2.54.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	81
1.2.55.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 1994-2021	81
1.2.56.	Características generales del consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2021	82
1.2.57.	Incidencia del consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (números absolutos). España, 2014-2021	83
1.2.58.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	83
1.2.59.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	84
1.2.60.	Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021	84
1.2.61.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2021	85
1.2.62.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2010-2021	85
1.2.63.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	86
1.2.64.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 1994-2021	86
1.2.65.	Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2016-2021	87
1.2.66.	Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2014-2021	87
1.2.67.	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2014-2021	88
1.2.68.	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	88
1.2.69.	Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años y proporción de los que han hecho binge drinking entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2008-2021	89

1.2.70.	Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2014-2021	89
1.2.71.	Prevalencia de consumo en atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021 . . .	90
1.2.72.	Prevalencia de borracheras, binge drinking y botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años, según sexo (%). España, 2021	90
1.2.73.	Evolución de la prevalencia de borracheras, binge drinking y botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años (%). España, 2016-2021	91
1.2.74.	Evolución de la prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) y de botellón (últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021	91
1.2.75.	Evolución de la prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) y de botellón (últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2008-2021	92
1.2.76.	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en el último mes, según sexo y edad (%). España, 2014-2021	92
1.2.77.	Prevalencia de botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	93
1.2.78.	Evolución de la prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2016-2021 . . .	93
1.2.79.	Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2021	94
1.2.80.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2021	94
1.2.81.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021	95
1.2.82.	Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2021	95
1.2.83.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2021 . . .	95
1.2.84.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según se hayan emborrachado, hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2021	96
1.2.85.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	96
1.2.86.	Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 30 días y según sexo (%). España, 2021	96
1.2.87.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	97
1.2.88.	Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 30 días y según edad (%). España, 2021	97

1.2.89.	Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2021	98
1.2.90.	Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2021	98
1.2.91.	Motivos principales por los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años beben alcohol, según sexo (%). España, 2021	99
1.2.92.	Prevalencia de consumo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias según el consumo de alcohol que hayan realizado sus padres (%) España, 2021	99
1.2.93.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking, borracheras y botellón en la población de estudiantes de 14-18 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (%). España, 2008-2021	100
1.2.94.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking y borracheras en la población de estudiantes de 14-18 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2008-2021	100
1.2.95.	Evolución de los lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días que han conseguido bebidas alcohólicas por ellos mismos (%). España, 2016-2021	101
1.2.96.	Evolución de los lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021	101
1.2.97.	Evolución de los modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021	102
1.2.98.	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2021	102
1.2.99.	Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2021	103
1.2.100.	Evolución de los modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021	103
1.2.101.	Prevalencia de borracheras, binge drinking, botellón y consumo de alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según los motivos por los que beben alcohol (%). España, 2021	103
1.2.102.	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2021	104
1.2.103.	Evolución de los lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021	104

Consumo por tipo de droga: bebidas energéticas

1.2.104.	Comportamientos de ocio y académicos de los estudiantes de 14-18 años que han tomado bebidas energéticas (% de fila). España, 2021	105
1.2.105.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2021	105

1.2.106.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014-2021	106
1.2.107.	Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido bebidas energéticas o bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2021	106

Consumo por tipo de droga: tabaco

1.2.108.	Prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2021	107
1.2.109.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2021	108
1.2.110.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2021	108
1.2.111.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2021	109
1.2.112.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	109
1.2.113.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2021	110
1.2.114.	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021	110
1.2.115.	Media de cigarrillos consumidos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (nº de cigarrillos). España, 1994-2021	111
1.2.116.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021	111
1.2.117.	Prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	112
1.2.118.	Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	112
1.2.119.	Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021	113
1.2.120.	Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	113
1.2.121.	Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2021	114
1.2.122.	Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (números absolutos). España, 2014-2021	114
1.2.123.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente. España, 1994-2021	114
1.2.124.	Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la prevalencia de consumo de tabaco (%). España, 2021	115

1.2.125.	Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco. España, 1994-2021	115
1.2.126.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y del riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	116
1.2.127.	Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado tabaco en los últimos 30 días y entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021	116
1.2.128.	Evolución de la prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016-2021	117
1.2.129.	Evolución del porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro (%). España, 2014-2021	117
1.2.130.	Evolución del porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2016-2021	118
1.2.131.	Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia con la que fumen (%). España, 2021 ..	118
1.2.132.	Evolución de la prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan fumado tabaco o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2021	119
1.2.133.	Evolución de la prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2021	119

Consumo por tipo de droga: cigarrillos electrónicos

1.2.134.	Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2021	120
1.2.135.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	120
1.2.136.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos electrónicos alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2019-2021	121
1.2.137.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016-2021	121
1.2.138.	Evolución de la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2021	122
1.2.139.	Evolución de la prevalencia del consumo de tabaco alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2021	122
1.2.140.	Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2021	123

1.2.141.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos según el tipo de cartuchos utilizados, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cigarrillos electrónicos y según sexo y edad (%). España, 2021	123
1.2.142.	Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2021 ..	123
1.2.143.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo (%). España, 2019-2021	124
1.2.144.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años que ha fumado cigarrillos electrónicos, según sexo (%). España, 2019-2021	124
1.2.145.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de cigarrillos electrónicos y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2021	124
1.2.146.	Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2021	124

Consumo por tipo de droga: hipnosedantes

1.2.147.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021	125
1.2.148.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	125
1.2.149.	Prevalencia del consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	126
1.2.150.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	126
1.2.151.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021	127
1.2.152.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	127
1.2.153.	Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	128
1.2.154.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2021 ..	129
1.2.155.	Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021	129
1.2.156.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	130
1.2.157.	Prevalencia de consumo de analgésicos opioides entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2019-2021	130
1.2.158.	Prevalencia de consumo de analgésicos opioides entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021	130

Consumo por tipo de droga: cannabis

1.2.159.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%) y edad media de inicio del consumo (años). España, 1994-2021	131
1.2.160.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016-2021 . . .	131
1.2.161.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	132
1.2.162.	Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (números absolutos). España, 2014-2021	132
1.2.163.	Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	133
1.2.164.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016-2021 . . .	134
1.2.165.	Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días y según sexo (%). España, 2021	134
1.2.166.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2021	135
1.2.167.	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal, entre los estudiantes de 14 a 18 años que no lo han probado nunca, según sexo (%). España, 2016-2021	135
1.2.168.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021	136
1.2.169.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	136
1.2.170.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	137
1.2.171.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis a diario en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021	137
1.2.172.	Número medio de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (número de porros). España, 2016-2021	138
1.2.173.	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido una cantidad media de porros al día por término medio en los últimos 30 días y número de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (% y número de porros). España, 2016-2021 . . .	138
1.2.174.	Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis (%). España, 2016-2021	138
1.2.175.	Evolución de la distribución en el orden de las edades de inicio en el consumo de cannabis y tabaco (%). España, 2002-2021	139
1.2.176.	Consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la posible legalidad del consumo de hachís o marihuana (%). España, 2021	139
1.2.177.	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal. España, 2016-2021	140

1.2.178.	Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y botellón en los últimos 12 meses y número de drogas consumidas en los últimos 30 días entre la población de estudiantes de 14 a 18 años y entre los consumidores de cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2021	140
1.2.179.	Evolución del % de THC (tetrahidrocannabinol) presente en cannabis según el tipo de presentación analizada; THC contenido en la resina de cannabis y THC contenido en la hierba de cannabis o marihuana. España, 2002-2021	141
1.2.180.	Porcentaje y estimación de consumidores problemáticos de cannabis (según escala CAST) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2021	141
1.2.181.	Categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2021	142
1.2.182.	Características de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST $\geq$ 4) en la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2021	142
1.2.183.	Categorización de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST, según sexo y edad (%). España, 2021	143
1.2.184.	Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días entre el total de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y según la clasificación de los estudiantes en la escala CAST (%). España, 2021	143
1.2.185.	Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2021	143
1.2.186.	Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq$ 4) entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2021	144
1.2.187.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq$ 4) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2006-2021	144
1.2.188.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq$ 4) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad (%). España, 2012-2021	145
1.2.189.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4) (%) España, 2016-2021	145
1.2.190.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4), según sexo y edad (%). España, 2016-2021	145
1.2.191.	Características de la forma de consumo de cannabis entre los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST $\geq$ 4) y entre la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2021	146
1.2.192.	Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y botellón en los últimos 12 meses y número de drogas consumidas entre la población de estudiantes de 14 a 18 años y entre los consumidores problemáticos de cannabis (CAST $\geq$ 4) (%). España, 2021	146
1.2.193.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2021	146

Consumo por tipo de droga: cocaína

1.2.194.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021	147
1.2.195.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	147

1.2.196.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	148
1.2.197.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	148
1.2.198.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la forma de presentación (%). España, 2021	149
1.2.199.	Incidencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (números absolutos). España, 2014-2021	149
1.2.200.	Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	149
1.2.201.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante el consumo de cocaína en polvo habitual y de la disponibilidad de cocaína en polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021	150
1.2.202.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2021	150
1.2.203.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2021	151

Consumo por tipo de droga: éxtasis

1.2.204.	Prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021	151
1.2.205.	Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021	152
1.2.206.	Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021	152
1.2.207.	Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	153
1.2.208.	Prevalencia del consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	153

Consumo por tipo de droga: anfetaminas

1.2.209.	Prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021	154
1.2.210.	Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021	154
1.2.211.	Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021	155
1.2.212.	Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	155
1.2.213.	Prevalencia del consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	156

Consumo por tipo de droga: alucinógenos

1.2.214.	Prevalencia del consumo de alucinógenos (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021	156
1.2.215.	Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021	157
1.2.216.	Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021	157
1.2.217.	Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	158

Consumo por tipo de droga: setas mágicas

1.2.218.	Prevalencia de consumo de setas mágicas (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2010-2021	158
1.2.219.	Prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021	159

Consumo por tipo de droga: heroína

1.2.220.	Prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021	159
1.2.221.	Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	160
1.2.222.	Percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2021 ..	160

Consumo por tipo de droga: inhalables volátiles

1.2.223.	Prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021	161
1.2.224.	Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	161

Consumo por tipo de droga: GHB

1.2.225.	Prevalencia de consumo de GHB (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2021	162
1.2.226.	Evolución de la prevalencia de consumo de GHB alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2021	162

Consumo por tipo de droga: metanfetaminas

1.2.227.	Prevalencia de consumo de metanfetaminas (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2010-2021	163
1.2.228.	Prevalencia del consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2021	163

Consumo por tipo de droga: esteroides anabolizantes

1.2.229.	Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2012-2021	164
1.2.230.	Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2021	164

Consumo por tipo de droga: sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio

1.2.231.	Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad. (%). España, 2021	165
1.2.232.	Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2019-2021	165
1.2.233.	Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido este tipo de sustancias estimulantes alguna vez en la vida (%). España, 2016-2021	165
1.2.234.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, borracheras, tabaco y consumo problemático de cannabis en los últimos 12 meses y binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida y entre el total de los estudiantes de 14 a 18 años (%). España, 2021	166
1.2.235.	Modo de obtención de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 que han consumido sustancias estimulantes (%). España, 2016-2021	166

Consumo por tipo de droga: nuevas sustancias psicoactivas

1.2.236.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2014-2021	167
1.2.237.	Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2021	167
1.2.238.	Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2021	168
1.2.239.	Forma de obtención de nuevas sustancias psicoactivas entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2021	168
1.2.240.	Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 2014-2021	169
1.2.241.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2012-2021	169
1.2.242.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido o no la sustancia alguna vez en la vida (%). España, 2016-2021	169
1.2.243.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias psicoactivas, según hayan consumido o no la sustancia alguna vez en la vida (%). España, 2016-2021	170
1.2.244.	Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga). España, 2010-2021	170
1.2.245.	Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2021	171

1.2.246.	Evolución del desconocimiento de la existencia de determinadas nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2012-2021	171
1.2.247.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2021	171
1.2.248.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	172

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

1.2.249.	Evolución del consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB y heroína alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2021	172
1.2.250.	Evolución del consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB y heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2021	173
1.2.251.	Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2021	173
1.2.252.	Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2021	174
1.2.253.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales alguna vez en la vida en función de haber consumido o no nuevas sustancias psicoactivas (NSP) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021	174
1.2.254.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2021	174
1.2.255.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2021	175
1.2.256.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la edad (%). España, 2021	175
1.2.257.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021	175
1.2.258.	Prevalencias del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad y sexo (%). España, 2021	176
1.2.259.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2021	176
1.2.260.	Evolución de la prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2021	177
1.2.261.	Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) sin incluir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2021	177
1.2.262.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) sin incluir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2021	177

1.2.263.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) sin incluir ni alcohol ni tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2021	178
1.2.264.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2021	178
1.2.265.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2021	178
1.2.266.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021	179
1.2.267.	Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2021	179
1.2.268.	Prevalencia de consumo de una, dos, tres o cuatro o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2021	179
1.2.269.	Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos, cannabis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, éxtasis, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2021	180
1.2.270.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según han realizado o no consumos intensivos de alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2021	180
1.2.271.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2021	181
1.2.272.	Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2008-2021	181
1.2.273.	Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2008-2021	181
1.2.274.	Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2012-2021	182
1.2.275.	Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 30 días según sexo y edad (%). España, 2012-2021	182

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

1.2.276.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2021	183
1.2.277.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad. España, 2021	184
1.2.278.	Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2008-2021	184

1.2.279.	Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de cannabis y tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2021	185
1.2.280.	Evolución del riesgo percibido del consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021	185
1.2.281.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2021	186
1.2.282.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2021	186
1.2.283.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2006-2021	187
1.2.284.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2021	188
1.2.285.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2021	188

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

1.2.286.	Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2021	189
1.2.287.	Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según edad y sexo (%). España, 2021	190
1.2.288.	Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan realizado o no consumos intensivos de alcohol en los últimos 30 días (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 2021	190
1.2.289.	Evolución de la disponibilidad de cocaína polvo y/o base percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2021	191
1.2.290.	Evolución de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 2000-2021	191
1.2.291.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2021	192
1.2.292.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil) y % de respuesta Ns/Nc entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2014-2021	193

1.2.293.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna droga ilegal, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo y edad (%). España, 2021	193
1.2.294.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021	194
1.2.295.	Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2021	195
1.2.296.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna de las siguientes drogas, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo (%). España, 2021	195

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: información y formación sobre drogas

1.2.297.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo (%). España, 2014-2021	195
1.2.298.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y edad (%). España, 2021	196
1.2.299.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal y según sexo (%). España, 2021	197
1.2.300.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga legal y según sexo (%). España, 2021	198
1.2.301.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según sexo y edad. (%). España, 2021	199
1.2.302.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones, según sexo. (%) España, 2021	199
1.2.303.	Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones, según sexo. (%). España, 2016-2021	199
1.2.304.	Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2021	200
1.2.305.	Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias legales e ilegales alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones (%). España, 2016-2021	201

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

1.2.306.	Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2021	201
1.2.307.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo y edad (%). España, 2012-2021	202

1.2.308.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%) España, 2014-2021	202
1.2.309.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2021	203

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: relación con sus iguales

1.2.310.	Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2021	203
1.2.311.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2021	204
1.2.312.	Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales hacen botellón (últimos 30 días) (%). España, 2021	204
1.2.313.	Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2021	205
1.2.314.	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o solo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2021	205
1.2.315.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o solo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2021	206
1.2.316.	Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2021	206
1.2.317.	Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen este tipo de sustancias (alguna vez en la vida) (%). España, 2021	207

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: permisividad de los padres

1.2.318.	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de alcohol según el consumo de alcohol que los estudiantes tengan. España, 2021	207
1.2.319.	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas, según sexo y según edad (%). España, 2016-2021	208
1.2.320.	Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de cannabis según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan. España, 2021	208

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: ocio y entorno escolar

1.2.321.	Frecuencia de actividades de ocio realizadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo (%). España, 2021	209
----------	---	-----

1.2.322.	Prevalencia de consumo de sustancias de en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas (%). España, 2021 . . .	210
1.2.323.	Prevalencia de consumo de sustancias de en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas, según sexo (%). España, 2021	211

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: salidas nocturnas y hora de regreso

1.2.324.	Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	211
1.2.325.	Frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2021	212
1.2.326.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	212
1.2.327.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2021	213
1.2.328.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	213
1.2.329.	Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	214
1.2.330.	Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2021	214
1.2.331.	Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	214
1.2.332.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	215
1.2.333.	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	215
1.2.334.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	216
1.2.335.	Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	216
1.2.336.	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	217

1.2.337.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	217
1.2.338.	Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	218
1.2.339.	Prevalencia de consumo de drogas legales e ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021	218
1.2.340.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y edad (%). España, 2021	219
1.2.341.	Hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2021	220
1.2.342.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2021	220
1.2.343.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según sexo (%). España, 2021	221
1.2.344.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2021	221
1.2.345.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa y según sexo (última salida en fin de semana) (%). España, 2021	222
1.2.346.	Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2021	222
1.2.347.	Prevalencia de binge drinking, borracheras (últimos 30 días), hacer botellón (últimos 12 meses) y consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2021 ..	223
1.2.348.	Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según sexo (%). España, 2021	223

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: dinero disponible

1.2.349.	Dinero gastado a la semana (euros) para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de tipo de estudios, titularidad del centro y notas que sacan habitualmente. España, 2021	223
1.2.350.	Dinero gastado a la semana (euros) para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de si han faltado a clase y si han repetido curso. España, 2021	224
1.2.351.	Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad. España, 2021	224

1.2.352.	Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2021 . . .	224
1.2.353.	Situación económica de la familia entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias en los últimos 30 días. España, 2021	225
1.2.354.	Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2021	225
1.2.355.	Dinero gastado a la semana (euros) para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los hobbies que practican. España, 2021	226
1.2.356.	Dinero gastado a la semana (euros) para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses. España, 2021	226
1.2.357.	Dinero gastado a la semana (euros) para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). España, 2021	227

Consumo de sustancias psicoactivas: consecuencias negativas del consumo

1.2.358.	Prevalencia de comportamientos relacionados con el rendimiento escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2021	227
1.2.359.	Evolución de la prevalencia de bullying (acoso) a través de internet o por otros medios (acoso directo o indirecto físico, verbal, psicológico, sexual o social) en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2016-2021	228
1.2.360.	Evolución de la prevalencia de bullying (acoso) exclusivamente a través de internet, según sexo (%). España, 2014-2021	228
1.2.361.	Conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y viajar como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021	228
1.2.362.	Prevalencia de experimentar ciertas situaciones en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (%). España, 2021	229
1.2.363.	Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2021	229
1.2.364.	Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2021	230
1.2.365.	Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor que conducía bajo los efectos del alcohol o alguna droga ilegal entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2019-2021	230
1.2.366.	Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido alcohol o alguna droga ilegal, según sexo (%). España, 2019-2021	231

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2020 .. 233

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2020

2.1.1.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2020	233
2.1.2.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1996-2020	234
2.1.3.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales y por alcohol. España, 1998-2020	235
2.1.4.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2020	236
2.1.5.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2020 ...	237
2.1.6.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2020	238
2.1.7.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2020 ..	239
2.1.8.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2020	240
2.1.9.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de estimulantes distintos de la cocaína: anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis. España, 1996-2020	241
2.1.10.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alucinógenos (ketamina u otros alucinógenos). España, 2005-2020	242
2.1.11.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2020 ...	243
2.1.12.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de diferentes sustancias como droga principal. España, 2014-2020	244
2.1.13.	Número de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento) que utilizan la vía intravenosa. España, 1996-2020	245
2.1.14.	Número de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admiti- dos a tratamiento por primera vez) que utilizan la vía intravenosa. España, 1996-2020	246
2.1.15.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2020	247
2.1.16.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2020	248
2.1.17.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2020	249
2.1.18.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2020	250
2.1.19.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2020	251
2.1.20.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2020	252
2.1.21.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2020	253
2.1.22.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2020	254

2.1.23.	Proporción de tratados por primera vez por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parenteral, según CCAA. España, 1991-2020	255
2.1.24.	Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2020 . . .	256
2.1.25.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2014-2020	257
2.1.26.	Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1996-2020	257
2.1.27.	Prevalencia (%) de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2020	258
2.1.28.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (%). España, 2019-2020	259

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2020

2.1.29.	Número y proporción de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal por sexo (%). España, 2020	260
2.1.30.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2020	261
2.1.31.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2020	261
2.1.32.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol, en función del sexo (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2020	262
2.1.33.	Número de casos y tasas por 100.000 habitantes de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según comunidad/ciudad autónoma. España, 2020	263
2.1.34.	Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2020	263
2.1.35.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2020	266
2.1.36.	Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2020	269
2.1.37.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento por sexo. España, 2020	272
2.1.38.	Edad media de inicio en el tratamiento actual, edad del primer uso y latencia primer uso hasta el tratamiento actual. España, 2020	275
2.1.39.	Número de casos que entran a tratamiento en función de que presenten policonsumo de sustancias, total y en función del tratamiento previo. España, 2020	275
2.1.40.	Número de casos admitidos a tratamiento por grupos de edad en función de la droga principal. España, 2020	276

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2020 . . . 277

Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2020

2.2.1.	Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España, 1996-2020	277
2.2.2.	Evolución del número de urgencias relacionadas con el uso de analgésicos opioides. España, 2005-2020	278
2.2.3.	Proporción de urgencias por tipo de opiáceo notificado en el total de urgencias relacionadas con opiáceos. España, 2005-2020	278
2.2.4.	Número de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje según tipo de droga. España, 1996-2020	279
2.2.5.	Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2020	280
2.2.6.	Evolución vía de administración (número y porcentaje) de los episodios de urgencias hospitalarias en consumidores de drogas, según tipo de droga. España, 2011-2020	281

Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas. Datos 2020

2.2.7.	Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España, 2020	282
2.2.8.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España, 2020	282
2.2.9.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2020	283
2.2.10.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas). España, 2020	283
2.2.11.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas), según sexo. España, 2020	284
2.2.12.	Porcentaje de sustancias relacionadas con los episodios de urgencia hospitalarias (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas), por edad. España, 2020	285
2.2.13.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas únicamente con el consumo de alcohol. Total y según sexo. España, 2020	285
2.2.14.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas únicamente con el consumo de hipnosedantes. Total y según sexo. España, 2020	286

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2020 287

Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2020

2.3.1.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 1983-2020	287
2.3.2.	Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2020	288

Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas y Registro General de Mortalidad

2.3.3.	Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2020	288
2.3.4.	Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en función del sexo. España, 2020	290

2.3.5.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1996-2020	291
2.3.6.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1996-2020	291
2.3.7.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico en función del sexo. España, 2020	292
2.3.8.	Porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína, opioides y/o diferentes combinaciones de estas sustancias). España, 2005-2020	293
2.3.9.	Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España, 2003-2020	294
2.3.10.	Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide, aunque haya otras sustancias). España, 2005-2020	295
2.3.11.	Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España, 1985-2020	295
2.3.12.	Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos). España, 2005-2020	296
2.3.13.	Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en hombres). España, 2010-2020	296
2.3.14.	Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en mujeres). España, 2005-2020	297
2.3.15.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo. España, 2004-2020 . .	297
2.3.16.	Evolución número de fallecidos por códigos CIE en el Registro General de Mortalidad. España, 2010-2020	298
2.3.17.	Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2020	298
2.3.18.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas según el Registro General de Mortalidad, según sexo y estimación del número de defunciones. España, 1999-2020	299
2.3.19.	Evolución de las edades de los fallecidos en 6 ciudades españolas. España, 2005-2020	299
2.3.20.	Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2020	300
2.3.21.	Evolución del índice de infranotificación (Registro General de Mortalidad-Registro Específico). España, 2005-2020	300
2.3.22.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas (estimación nacional). España, 1983-2020	301

Información complementaria 302

Páginas web de interés	303
----------------------------------	-----

INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, analgésicos opioides, drogas ilegales y nuevas sustancias), otros trastornos comportamentales y los problemas asociados, en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

El presente informe, denominado *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2022*, se estructura en dos capítulos que se detallan a continuación:

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población de estudiantes de 14 a 18 años ante el consumo de drogas y otros trastornos comportamentales desde el año 1994 hasta 2021. La fuente de información es la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), en sus sucesivas ediciones. ESTUDES se realiza de forma bienal y se promueve y financia directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas contando con la estrecha colaboración de las comunidades y ciudades autónomas.

En el presente documento no se incluye información de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), en población general, ya que los últimos datos disponibles, al cierre de este informe, corresponden al año 2020 y ya han sido publicados en el *Informe y Estadísticas 2021 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España*.

En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas desde 1987 hasta 2020. La información procede de tres indicadores clave: Indicador “Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, Indicador “Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas” e Indicador “Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”, así como información relacionada con las infecciones en consumidores de drogas e información relativa al consumo problemático de drogas.

Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las comunidades y ciudades autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal, laboratorios toxicológicos, etc.). En algunos casos, los ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información. Los indicadores sobre infecciones y consumo problemático proceden de varias fuentes, pero fundamentalmente de la DGPNSD y de otras áreas del Ministerio de Sanidad.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998:

<https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/CinformesOED.htm>

Consumo,
percepciones
y opiniones
ante las drogas



1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2022

En 2022, siguiendo con la serie de periodicidad bienal iniciada en 1995, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha llevado a cabo la décimo-cuarta edición de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES). Esta encuesta se realiza en todo el territorio nacional, en la población general residente en hogares (15-64 años), y se realiza a domicilio.

El objetivo general de la misma es conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre la población general en todo el territorio nacional, con la finalidad de conseguir información que permita diseñar, desarrollar y evaluar estrategias y políticas dirigidas a prevenir el consumo y a abordar las consecuencias negativas del uso de drogas, del mal uso de las tecnologías y de otras conductas relacionadas.

Los objetivos concretos y comunes a toda la serie de encuestas son conocer:

- La prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras conductas relacionadas.
- Las características sociodemográficas de los consumidores.
- Los patrones de consumo de sustancias psicoactivas.
- La disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido ante diversas conductas de consumo.
- La visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
- La opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las medidas para reducirlos.
- La evolución temporal (desde 1995) de los aspectos antes expuestos.

Al cierre de este informe los resultados de EDADES 2022 no están disponibles, por lo que serán publicados en el próximo Informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

La metodología y los resultados, hasta el año 2020, pueden consultarse en la página web del Plan Nacional sobre Drogas: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_EDADES.htm

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2021

1.2.1.


Evolución del tamaño de muestra (alumnos, colegios y aulas) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.2.

Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.3.

Error muestral de la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p=q=0,5$). España, 2021.

	Número de centros	Número de alumnos	Error*
Andalucía	61	2.659	1,9%
Aragón	22	952	3,2%
Asturias	18	789	3,5%
Baleares	21	864	3,4%
Canarias	30	1.150	2,9%
Cantabria	15	609	4,0%
Castilla-La Mancha	29	1.156	2,9%
Castilla y León	30	1.195	2,9%
Cataluña	55	2.493	2,0%
C. Valenciana	45	1.891	2,3%
Extremadura	19	848	3,4%
Galicia	30	1.244	2,8%
Madrid	52	2.343	2,1%
Murcia	26	1.131	2,9%
Navarra	17	824	3,4%
País Vasco	29	1.226	2,8%
La Rioja	11	451	4,6%
Ceuta	6	251	6,1%
Melilla	7	245	6,2%
Total España	523	22.321	0,6%

* Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y $p=q=0,5$

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.4.

Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2021.

	1994	2000	2006	2012	2014	2016	2019	2021
COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
Andalucía	471.794	402.840	326.571	345.073	296.955	307.453	321.268	333.606
Aragón	69.699	49.597	40.860	45.224	39.471	40.463	43.406	44.782
Asturias	73.467	48.271	33.888	32.381	26.746	27.234	28.070	28.288
Baleares	39.271	34.923	31.333	35.788	31.203	32.753	36.250	37.995
Canarias	113.256	96.577	74.244	81.402	67.994	73.074	78.018	79.980
Cantabria	36.909	26.253	19.609	19.980	16.536	17.541	18.764	18.566
Castilla y León	160.256	117.058	89.776	87.789	73.070	74.887	76.182	76.041
Castilla-La Mancha	90.837	79.729	73.297	81.315	69.444	71.507	73.671	74.138
Cataluña	384.125	262.519	236.139	275.946	250.522	249.005	271.365	290.928
C. Valenciana	251.506	190.873	160.648	180.461	153.623	161.202	173.196	181.853
Extremadura	57.224	54.160	46.757	44.111	38.292	38.332	39.436	39.061
Galicia	182.834	134.929	94.564	87.948	73.481	75.578	79.623	80.808
Madrid	347.417	251.754	207.926	227.068	199.999	211.462	230.278	246.595
Murcia	73.929	60.005	51.755	59.440	51.322	54.473	58.481	59.696
Navarra	32.758	22.174	19.640	22.524	21.251	21.858	23.789	23.764
País Vasco	151.581	90.058	67.592	72.410	64.174	68.202	75.229	78.859
Rioja	17.809	11.940	9.755	10.976	9.628	10.262	11.006	10.778
Ceuta	3.379	3.611	2.797	3.209	2.715	3.230	3.616	3.321
Melilla	2.961	3.197	2.791	3.776	3.105	3.421	3.778	3.407
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO								
Pública	1.911.828	1.362.588	1.093.906	1.189.700	1.014.070	1.056.289	1.123.968	1.169.785
Privada	649.184	577.880	496.036	527.121	475.461	485.648	521.458	542.681
TIPO DE ESTUDIOS								
ESO	237.115	953.021	891.860	826.153	826.260	850.831	867.852	921.993
Bachillerato	1.510.024	724.972	576.960	594.090	550.619	560.404	582.505	583.240
Formación Profesional	813.873	262.475	121.122	296.578	112.652	130.702	195.069	207.233
TOTAL	2.561.012	1.940.468	1.589.942	1.716.821	1.489.531	1.541.937	1.645.426	1.712.466

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTES: Ministerio de Educación y Formación Profesional y OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.5.

Distribución de los estudiantes de 14 a 18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2021.

	1994	2000	2006	2012	2014	2016	2019	2021
COMUNIDAD AUTÓNOMA								
Andalucía	2.075	2.372	2.750	2.378	4.636	2.970	2.884	2.659
Aragón	941	671	1.764	2.464	2.710	2.781	2.590	952
Asturias	875	661	1.737	2.024	1.890	1.898	2.039	789
Baleares	661	602	622	806	859	913	840	864
Canarias	859	739	2.079	1.155	3.592	3.214	1.328	1.150
Cantabria	575	1.244	1.376	1.923	1.885	1.859	1.960	609
Castilla y León	1.120	919	1.107	1.151	2.284	1.220	2.538	1.156
Castilla-La Mancha	982	1.749	984	1.721	1.941	2.133	2.036	1.195
Cataluña	1.881	1.552	2.177	2.353	2.510	2.617	2.640	2.493
C. Valenciana	1.466	2.287	1.657	1.696	3.260	3.502	3.628	1.891
Extremadura	659	443	777	860	905	817	907	848
Galicia	1.436	1.170	2.244	2.022	2.102	2.089	2.026	1.244
Madrid	1.979	2.929	3.055	3.250	4.404	4.321	4.172	2.343
Murcia	818	727	1.601	1.054	1.085	1.259	2.240	1.131
Navarra	659	627	570	605	662	773	2.353	824
País Vasco	1.104	852	884	1.096	1.164	1.286	1.314	1.226
Rioja	651	462	525	477	507	1.076	1.033	451
Ceuta	128	323	289	232	224	319	668	251
Melilla	97	121	256	236	866	322	814	245
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO								
Pública	13.716	10.421	13.050	18.848	25.976	24.383	25.402	14.824
Privada	5.250	10.029	13.404	8.655	11.510	10.986	12.608	7.497
TIPO DE ESTUDIOS								
ESO	5.129	13.664	15.983	14.953	21.278	20.219	21.224	12.636
Bachillerato	10.495	5.869	8.468	10.384	14.624	13.496	13.858	7.994
Formación Profesional	3.342	917	2.003	2.166	1.584	1.654	2.928	1.691
TOTAL	18.966	20.450	26.454	27.503	37.486	35.369	38.010	22.321

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.6.

Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según comunidad/ciudad autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2021.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
CENTROS														
Andalucía	45	45	45	54	60	64	70	77	62	63	110	68	68	61
Aragón	19	18	18	17	35	32	33	49	63	68	69	69	66	22
Asturias	19	18	18	17	18	16	29	48	63	59	55	53	51	18
Baleares	12	12	13	15	32	32	15	41	77	22	20	23	21	21
Canarias	22	23	22	21	23	22	33	57	30	32	92	80	33	30
Cantabria	13	12	13	28	29	28	28	39	58	58	50	49	51	15
Castilla y León	18	19	27	25	30	27	32	35	29	33	61	32	65	29
Castilla-La Mancha	25	24	17	44	58	22	25	31	29	43	52	53	51	30
Cataluña	44	38	39	37	43	70	53	56	53	55	58	59	59	55
C. Valenciana	33	33	33	56	37	35	40	46	66	48	78	86	89	45
Extremadura	16	14	16	10	19	31	19	25	22	27	27	23	22	19
Galicia	23	26	29	25	36	30	39	62	65	60	57	53	52	30
Madrid	40	37	40	66	75	71	71	85	81	81	98	96	95	52
Murcia	16	16	16	17	38	25	25	48	25	27	25	29	52	26
Navarra	13	13	15	15	14	14	13	16	15	17	17	18	52	17
País Vasco	26	24	27	21	22	26	28	30	28	30	32	33	32	29
Rioja	11	12	12	12	12	17	12	25	37	12	11	25	23	11
Ceuta	–	5	1	5	3	5	7	7	6	6	6	7	17	6
Melilla	–	–	3	3	7	6	5	7	48	6	23	7	18	7
Total	395	389	404	488	591	573	577	784	857	747	941	863	917	523
AULAS														
Andalucía	92	92	90	108	119	128	139	154	125	126	218	136	127	160
Aragón	38	36	38	31	101	95	92	98	128	136	138	137	127	52
Asturias	42	36	36	30	35	32	84	96	125	125	106	106	99	52
Baleares	29	28	27	24	84	93	30	82	153	43	40	46	40	52
Canarias	44	46	44	41	46	44	98	114	60	66	182	160	59	74
Cantabria	28	28	28	48	58	84	81	78	116	117	98	98	98	30
Castilla y León	38	40	40	47	58	54	64	70	60	71	121	64	126	68
Castilla-La Mancha	54	55	55	69	116	44	50	62	63	96	104	106	100	63
Cataluña	88	78	78	74	87	140	103	112	111	115	116	118	117	113
C. Valenciana	68	65	69	90	72	70	80	92	136	92	154	172	169	118
Extremadura	34	32	53	19	37	92	38	50	45	57	50	46	44	47
Galicia	56	55	33	43	102	60	116	124	129	120	114	104	101	66
Madrid	85	80	58	119	144	142	142	170	160	166	196	190	185	168
Murcia	34	36	79	29	72	74	75	96	51	55	50	58	104	85
Navarra	30	28	26	22	26	28	26	32	32	30	32	36	102	35
País Vasco	52	52	33	40	44	51	56	60	56	60	60	66	61	58
Rioja	25	29	29	20	22	50	24	50	74	24	22	50	44	26
Ceuta	–	10	2	15	6	10	14	14	12	12	12	19	32	23
Melilla	–	–	8	6	22	24	10	14	94	12	45	14	34	21
Total	837	826	826	875	1.251	1.315	1.322	1.568	1.730	1.523	1.858	1.726	1.769	1.311

* No se han realizado ampliaciones de muestra en el año 2021.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.7.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021.

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida														
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alcohol	84,1	84,2	86,0	78	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9	73,9
Tabaco	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5	41,3	38,2
Cannabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1	33	28,6
Hipnosedantes*	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9	18,4	19,6
Hipnosedantes**	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0	8,6	10,3
Cocaína polvo y/o base	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2	2,9	2,7
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3	2,6	3,1
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9	1,7
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0	1,7	1,8
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4	1,7	1,3
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6	1,5
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5	1,5
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8	0,7	0,5
GHB	-	-	-	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	0,6	0,4
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses														
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alcohol	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9	70,5
Tabaco	-	-	-	-	-	-	34	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7	35,0	30,7
Cannabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3	27,5	22,2
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6	12,5	13,6
Hipnosedantes**	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4	6,1	7,2
Cocaína polvo y/o base	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5	2,4	2,1
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9	1,8
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,4	1,0
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0	0,9
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	0,8	0,9	1,1	0,9
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,5	1,0	1,2	1,1
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1	0,8
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4
GHB	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3

1.2.7. (continuación)

Prevalencia de consumo en los últimos 30 días														
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alcohol	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	53,6
Tabaco	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3	26,7	23,9
Cannabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3	19,3	14,9
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9	6,4	7,5
Hipnosedantes**	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6	2,9	3,6
Cocaína polvo y/o base	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0	0,9	0,6
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6	0,7	0,6
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4	0,5	0,3
Inhalables volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,4
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,2
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2
GHB	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Prevalencia de consumo diario en los últimos 30 días														
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alcohol	-	-	-	-	-	-	1,9	2,9	6,0	2,7	1,7	1,6	1,0	1,1
Tabaco	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8	9,8	9,0
Cannabis	1,0	1,4	1,8	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8	2,0	2,3	1,6
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	2,7	3,0	3,7
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	1,1	1,2	1,4

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.8.

Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	73,9	70,5	53,6	9,0
Alcohol	38,2	30,7	23,9	1,1
Hipnosedantes*	19,6	13,6	7,5	3,7
Hipnosedantes**	10,3	7,2	3,6	1,4
Cannabis	28,6	22,2	14,9	1,6
Éxtasis	2,7	2,1	0,6	-
Alucinógenos	2,3	1,9	0,5	-
Anfetaminas	1,2	0,8	0,2	-
Cocaína polvo y/o base	3,1	1,8	0,6	-
Cocaína polvo	1,4	0,9	0,4	-
Cocaína base	1,7	1,0	0,3	-
Heroína	0,5	0,4	0,2	-
Analgésicos opioides***	1,7	0,9	0,3	-
Inhalables volátiles	1,8	1,1	0,4	-
GHB	0,4	0,3	0,2	-
Metanfetamina	1,5	0,9	0,3	-
Setas mágicas	1,3	0,8	0,2	-
Esteroides anabolizantes	0,4	0,3	0,2	-
Nuevas sustancias	2,0	1,4	0,8	-
Ketamina	0,7	0,4	0,2	-
Spice	0,6	0,5	0,2	-
Mefedrona	0,3	0,2	0,1	-
Salvia divinorum	0,3	0,2	0,1	-
Ayahuasca	0,4	0,3	0,2	-

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.


** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

*** Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.9.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021.



	2021
Alcohol	73,9
Tabaco	38,2
Hipnosedantes*	19,6
Hipnosedantes**	10,3
Cannabis	28,6
Cocaína polvo y/o base	2,7
Cocaína en polvo	2,3
Cocaína base	1,2
Éxtasis	3,1
Anfetaminas/speed	1,4
Alucinógenos	1,7
Heroína	0,5
Analgésicos opioides***	1,7
Inhalables volátiles	1,8
GHB	0,4
Metanfetamina	1,5
Setas mágicas	1,3
Esteroides anabolizantes	0,4
Nuevas sustancias	2,0
Ketamina	0,7
Spice	0,6
Mefedrona	0,3
Salvia divinorum	0,3
Ayahuasca	0,4

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.


** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

*** Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.10.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021.



** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.


** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

*** Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.11.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2019-2021.



	2019	2021
Alcohol	75,9	70,5
Tabaco	35,0	30,7
Cannabis	27,5	22,2
Hipnosedantes*	12,5	13,6
Hipnosedantes**	6,1	7,2
Nuevas sustancias	1,7	1,4
Cocaína polvo y/o base	2,4	2,1
Éxtasis	1,9	1,8
Anfetaminas	1,1	0,9
Metanfetamina	1,2	0,9
Alucinógenos	1,4	1,0
Setas mágicas	1,1	0,8
Spice	0,5	0,5
Inhalables volátiles	1,0	1,1
Heroína	0,5	0,4
GHB	0,4	0,3
Salvia divinorum	0,3	0,2
Mefedrona	0,3	0,2
Ketamina	0,4	0,4
Esteroides anabolizantes	0,3	0,3


** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.12.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021.



	2021
Alcohol	53,6
Tabaco	23,9
Hipnosedantes*	7,5
Hipnosedantes**	3,6
Cannabis	14,9
Cocaína polvo y/o base	0,6
Cocaína en polvo	0,5
Cocaína base	0,2
Éxtasis	0,6
Anfetaminas/speed	0,4
Alucinógenos	0,3
Heroína	0,2
Analgésicos opioides***	0,3
Inhalables volátiles	0,4
GHB	0,2
Metanfetamina	0,3
Setas mágicas	0,2
Esteroides anabolizantes	0,2
Nuevas sustancias	0,8
Ketamina	0,2
Spice	0,2
Mefedrona	0,1
Salvia divinorum	0,1
Ayahuasca	0,2

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.


** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

*** Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.13.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021.



* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.14.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2021.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.*** Cocaína polvo y/o base. **** Para colocarse.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.15.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2021.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.*** Cocaína polvo y/o base. **** Para colocarse.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.16.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2021.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.*** Cocaína polvo y/o base. **** Para colocarse.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.17.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según sexo (%). España, 2021.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.18.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alguna vez en la vida																
Alcohol	84,3	84,0	78,2	77,9	78,4	80,7	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2	76,3	79,4	71,6	76,3
Tabaco	56,6	65,1	57,1	66,7	42,0	49,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7	38,2	44,3	35,1	41,5
Cannabis	23,8	18,0	36,2	30,1	38,0	34,6	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9	34,5	31,5	29,3	28,0
Hipnosedantes*	5,8	8,1	7,3	10,2	12,0	18,8	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5	15,1	21,5	15,3	24,1
Hipnosedantes**	4,8	7,4	5,2	8,6	5,8	9,2	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8	6,7	10,3	2,6	4,7
Cocaína polvo y/o base	3,1	1,9	8,4	4,5	6,8	4,7	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2	3,9	1,9	3,4	1,9
Éxtasis	4,7	2,5	7,6	4,8	4,2	2,5	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9	3,1	2,1	3,4	2,8
Alucinógenos	6,7	3,6	7,2	4,4	5,7	2,7	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1	2,7	1,2	2,3	1,1
Inhalables volátiles	4,1	2,1	5,7	3,0	4,1	2,0	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9	1,9	1,5	1,9	1,7
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	3,0	1,4	1,8	0,8	2,0	0,8	2,4	1,0	1,8	0,8
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	1,3	0,6	1,1	0,4	1,7	1,0	1,9	1,3	1,8	1,2
Anfetaminas	5,3	3,1	5,7	3,3	4,2	2,7	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2	2,0	1,1	1,9	1,0
Heroína	0,7	0,3	0,8	0,3	1,5	0,5	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5	1,0	0,4	0,8	0,2
GHB	-	-	-	-	1,8	0,6	1,9	0,8	1,3	0,8	0,8	0,4	0,7	0,4	0,6	0,2
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	1,1	0,3	1,0	0,3	0,8	0,2	0,6	0,2	0,7	0,2

1.2.18. (continuación)

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Últimos 12 meses																
Alcohol	82,8	82,7	77,3	77,3	73,4	76,3	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9	74,1	77,5	67,8	73,3
Tabaco	-	-	-	-	30,2	37,5	33,1	37,5	29,6	33,2	32,6	36,9	31,4	38,5	27,3	34,2
Cannabis	21,2	15,2	32,2	25,2	31,6	28,2	29,7	23,3	28	23,0	28,1	24,4	29,2	25,9	22,6	21,8
Hipnosedantes*	-	-	-	-	7,3	11,1	8,4	14,9	7,7	13,8	8,8	14,4	9,8	15,1	9,7	17,6
Hipnosedantes**	3,2	5,6	3,5	6,6	3,7	5,8	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7	4,7	7,4	2,6	4,7
Cocaína polvo y/o base	2,3	1,2	6,4	3,1	5,2	3,1	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6	3,2	1,7	2,7	1,5
Éxtasis	4,2	2,2	6,4	3,9	3,3	1,6	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1	2,4	1,4	2,1	1,5
Alucinógenos	5,7	3,1	5,5	2,9	4,1	1,6	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6	2,0	0,8	1,4	0,6
Inhalables volátiles	2,5	1,3	3,3	1,8	2,6	1,1	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,8	1,2	0,9
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	2,1	0,8	1,2	0,5	1,3	0,5	1,7	0,6	1,1	0,5
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	1,0	0,4	0,8	0,3	1,3	0,7	1,6	0,8	1,1	0,7
Anfetaminas	4,4	2,5	4,6	2,4	3,3	2,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,2	0,6
Heroína	0,5	0,2	0,7	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,5	0,2
GHB	-	-	-	-	1,3	0,4	1,5	0,5	0,9	0,4	0,6	0,2	0,5	0,3	0,5	0,1
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	0,8	0,2	0,7	0,2	0,5	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1
Últimos 30 días																
Alcohol	75,3	74,9	60,4	59,9	58,1	58,0	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1	57,2	59,8	51,5	55,8
Tabaco	26,0	36,3	27,3	37,1	24,8	30,6	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0	23,9	29,3	21,2	26,7
Cannabis	15,1	9,8	24,5	16,9	22,3	18,0	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9	21,5	17,3	15,7	14,1
Hipnosedantes*	-	-	-	-	3,5	5,5	4,7	8,5	4,2	8,1	4,4	7,3	5,1	7,7	5,0	10,0
Hipnosedantes**	1,9	3,3	1,7	3,4	2,0	2,8	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3	2,2	3,5	2,6	4,7
Cocaína polvo y/o base	1,4	0,7	3,4	1,5	3,1	1,6	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5	1,3	0,6	0,9	0,3
Éxtasis	2,9	1,4	3,8	1,7	2,1	0,7	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	0,8	0,4
Alucinógenos	3,6	1,7	2,6	1,3	2,0	0,7	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,1
Inhalables volátiles	1,5	0,8	1,8	1,1	1,7	0,6	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2	0,6	0,4	0,6	0,3
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0,6	0,1	0,7	0,2	0,4	0,1
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,2
Anfetaminas	2,9	1,6	2,6	1,4	2,0	1,0	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,6	0,1
Heroína	0,4	0,1	0,5	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,5	0,2	0,6	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0
GHB	-	-	-	-	0,9	0,2	1,0	0,3	0,6	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0
A diario en los últimos 30 días																
Alcohol	-	-	-	-	3,0	1,0	3,3	2,0	2,2	1,3	1,9	1,3	1,3	0,7	1,3	1,0
Tabaco	17,8	25,4	19,3	27	12,5	16,9	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0	9,4	10,3	8,8	9,2
Cannabis	1,5	0,5	5,5	1,9	4,2	2,2	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3	3,3	1,4	2,1	1,1
Hipnosedantes*	-	-	-	-	0,4	0,5	0,9	0,8	0,8	0,9	2,3	3,0	2,5	3,4	2,6	4,7
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	1,0	1,2	1,0	1,3	1,1	1,8

H = Hombres, M = Mujeres.

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.19.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2021.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	21,6	30,9	41,2	50,0	36,8	55,9
Alcohol	53,5	68,3	78,8	86,0	72,8	87,9
Hipnosedantes*	15,9	17,6	20,3	22,0	19,1	26,0
Hipnosedantes**	7,6	8,9	10,9	12,1	10,0	13,7
Cannabis	11,7	19,6	31,0	41,7	26,9	50,1
Éxtasis	1,0	2,0	3,1	4,9	2,8	6,3
Alucinógenos	0,5	1,0	1,8	2,9	1,6	3,0
Anfetaminas/speed	0,4	0,9	1,6	2,1	1,3	2,9
Cocaína polvo y/o base	1,3	2,0	2,4	3,5	2,3	6,6
Cocaína polvo	0,7	1,5	2,2	3,2	2,0	5,9
Cocaína base	0,9	1,1	1,0	1,3	1,1	2,3
Heroína	0,3	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6
Analgésicos opioides***	0,5	1,2	1,8	2,6	1,5	3,5
Inhalables volátiles	1,1	1,6	1,8	2,2	1,7	2,6
GHB	0,1	0,3	0,5	0,5	0,4	0,9
Metanfetamina	0,4	1,0	1,5	2,3	1,3	3,5
Setas mágicas	0,4	0,8	1,5	1,8	1,2	2,8
Esteroides anabolizantes	0,3	0,2	0,6	0,6	0,5	0,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. *** Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.20.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2021.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Alcohol	50,6	64,5	75,3	82,6	69,3	85,2
Tabaco	18,4	25,1	33,3	39,0	29,6	43,7
Cannabis	8,9	15,9	25,1	31,6	21,1	36,6
Hipnosedantes*	11,4	12,4	14,0	15,0	13,3	17,4
Hipnosedantes**	5,8	6,3	7,6	8,3	7,1	9,3
Cocaína polvo y/o base	0,9	1,5	1,9	3,0	1,9	5,0
Cocaína polvo	0,6	1,2	1,7	2,8	1,6	4,6
Cocaína base	0,5	0,8	0,8	1,0	0,8	1,4
Éxtasis	0,6	1,3	2,0	2,9	1,8	2,8
Alucinógenos	0,4	0,7	1,1	1,7	1,0	1,3
Inhalables volátiles	0,6	0,9	1,1	1,4	1,0	1,5
Setas mágicas	0,3	0,5	1,0	1,0	0,7	1,7
Metanfetamina	0,2	0,7	1,0	1,4	0,9	1,5
Anfetaminas/speed	0,3	0,6	1,1	1,2	0,8	1,4
Heroína	0,1	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4
GHB	0,1	0,2	0,4	0,4	0,3	0,6
Esteroides anabolizantes	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,2
Analgésicos opioides***	0,4	0,8	1,0	1,2	0,9	1,4

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. ***Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.21.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2021.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	13,0	18,2	26,7	31,4	22,9	36,9
Alcohol	34,1	45,9	57,1	66,9	52,1	72,8
Hipnosedantes*	6,6	6,8	7,4	8,2	7,3	9,4
Hipnosedantes**	3,0	3,5	3,4	4,1	3,5	4,6
Cannabis	6,2	10,2	16,9	21,3	14,1	25,2
Éxtasis	0,2	0,5	0,6	1,0	0,6	0,8
Alucinógenos	0,2	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4
Anfetaminas/speed	0,2	0,2	0,4	0,6	0,4	0,3
Cocaína polvo y/o base	0,3	0,4	0,7	0,7	0,5	1,1
Cocaína polvo	0,2	0,4	0,7	0,6	0,5	1,1
Cocaína base	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3
Heroína	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
Analgésicos opioides***	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,6
Inhalables volátiles	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5
GHB	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
Metanfetamina	0,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6
Setas mágicas	0,0	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4
Esteroides anabolizantes	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

*** Para colocarte.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.22.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la edad (%). España, 2021.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	2,7	5,1	9,8	14,0	8,2	18,4
Alcohol	0,5	0,9	1,2	1,4	1,0	2,7
Hipnosedantes*	3,6	3,5	3,8	3,6	3,6	4,0
Hipnosedantes**	1,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,5
Cannabis	0,2	0,8	1,7	2,5	1,4	4,6

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.23.

Edad media de inicio (años) en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 2021.

	Total	Hombres	Mujeres
Hipnosedantes*	14,1	13,8	14,2
Alcohol	14,0	14,0	14,0
Tabaco	14,1	14,1	14,1
Hipnosedantes**	14,4	14,3	14,4
GHB	15,0	15,0	14,9
Heroína	14,7	14,6	15,0
Inhalables volátiles	14,9	15,0	14,7
Esteroides anabolizantes	14,4	14,2	14,9
Tabaco (consumo diario)	14,7	14,8	14,7
Cannabis	14,9	14,8	14,9
Cocaína base	14,9	14,7	15,3
Alcohol (consumo semanal)	15,2	15,2	15,3
Alucinógenos	15,6	15,6	15,5
Setas mágicas	15,5	15,5	15,5
Cocaína polvo y/o base	15,3	15,3	15,4
Analgésicos opioides***	15,1	15,3	14,9
Metanfetamina	15,4	15,2	15,5
Cocaína en polvo	15,4	15,4	15,3
Anfetaminas	15,3	15,4	15,2
Éxtasis	15,4	15,5	15,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

***Para colocarte

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.24.

Edad media de inicio (años) en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2021.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alcohol	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0	14,0	14,0
Inhalables volátiles	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8	14,0	14,9
Tabaco	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1	14,1	14,1
GHB	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2	14,4	15,0
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	14,5	14,4
Heroína	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0	14,5	14,7
Tabaco (consumo diario)	-	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6	14,7	14,7
Borracheras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	14,8	14,7
Cannabis	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8	14,9	14,9
Cocaína base	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	14,6	15,2	14,8	14,6	15,1	14,9
Alucinógenos	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2	15,2	15,6
Alcohol (consumo semanal)	-	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	15,6	14,8	15,1	15,0	15,1	15,2	15,2
Cocaína polvo y/o base	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,3	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1	15,2	15,3
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	15,2	15,4
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,2	15,5
Cocaína polvo	-	-	-	-	-	-	15,4	15,4	15,4	15,6	15,1	15,2	15,3	15,4
Éxtasis	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2	15,4	15,4
Anfetaminas	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1	15,4	15,3
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	13,8	14,0	13,9	14,3	13,9	13,7	14,0	14,1
Hipnosedantes**	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,2	14,6	14,2	14,0	14,3	14,4

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.25.

Prevalencia de consumo de drogas y otros trastornos comportamentales alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	38,2	35,1	41,5	21,6	18,3	25,0	30,9	26,7	35,0	41,2	38,5	44,1	50,0	46,8	53,3	55,9	53,2	58,8
Tabaco en pipas de agua	40,5	40,4	40,7	22,7	20,5	24,9	31,1	29,5	32,6	44,5	46,5	42,5	53,8	53,4	54,4	59,4	60,5	58,2
Cigarrillos electrónicos	44,3	46,9	41,7	32,4	33,1	31,7	38,9	40,2	37,5	48,5	51,3	45,6	51,7	55,9	47,4	53,9	58,0	49,4
Cigarrillos electrónicos con nicotina	16,5	15,4	17,6	9,1	7,6	10,6	12,0	10,7	13,3	18,6	17,1	20,1	22,2	22,1	22,3	24,5	22,5	26,6
Cigarrillos electrónicos sin nicotina	35,6	38,6	32,5	27,7	28,8	26,5	32,4	33,7	31,0	39,2	42,7	35,4	40,2	44,8	35,4	39,5	45,1	33,5
Cigarrillos electrónicos de los 2 tipos	10,2	9,7	10,7	6,1	5,4	6,9	7,9	6,8	9,0	11,6	10,9	12,2	13,6	14,0	13,1	13,1	12,7	13,5
Alcohol	73,9	71,6	76,3	53,5	49,9	57,3	68,3	63,9	72,7	78,8	77,0	80,7	86,0	85,0	87,0	87,9	87,8	88,1
Borracheras	48,0	43,8	52,4	24,7	18,8	30,7	36,9	30,8	43,0	53,4	50,0	57,0	64,7	61,8	67,7	71,5	68,3	74,9
Hipnosedantes con o sin receta	19,6	15,3	24,1	15,9	11,6	20,3	17,6	13,5	21,6	20,3	15,9	24,8	22,0	17,2	26,9	26,0	21,7	30,7
Hipnosedantes sin receta	10,3	7,8	12,9	7,6	4,9	10,3	8,9	6,4	11,3	10,9	7,9	14,0	12,1	9,7	14,5	13,7	12,1	15,4
Cannabis	28,6	29,3	28,0	11,7	11,0	12,4	19,6	19,4	19,7	31,0	32,6	29,4	41,7	42,3	41,2	50,1	51,5	48,5
Cannabis lo probaría si fuese legal	13,0	11,9	14,1	15,0	12,7	17,3	15,3	13,2	17,4	12,6	12,0	13,3	10,7	10,8	10,5	8,9	8,9	9,0
Cocaína polvo y/o base	2,7	3,4	1,9	1,3	1,9	0,6	2,0	2,0	1,9	2,4	2,9	1,8	3,5	4,4	2,6	6,6	9,6	3,4
Cocaína en polvo	2,3	2,9	1,6	0,7	1,0	0,4	1,5	1,7	1,4	2,2	2,7	1,7	3,2	4,0	2,5	5,9	8,6	3,0
Cocaína base	1,2	1,7	0,7	0,9	1,4	0,4	1,1	1,3	1,0	1,0	1,4	0,6	1,3	2,1	0,5	2,3	3,4	1,1
Éxtasis	3,1	3,4	2,8	1,0	0,9	1,0	2,0	1,9	2,2	3,1	4,0	2,2	4,9	4,8	4,9	6,3	8,3	4,1
Anfetaminas/speed	1,4	1,9	1,0	0,4	0,6	0,2	0,9	1,1	0,7	1,6	2,0	1,2	2,1	2,6	1,6	2,9	4,3	1,3
Alucinógenos	1,7	2,3	1,1	0,5	0,5	0,4	1,0	1,2	0,7	1,8	2,4	1,1	2,9	3,9	1,9	3,0	4,3	1,6
Heroína	0,5	0,8	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	0,2	0,5	0,9	0,2	0,7	1,1	0,4	0,6	1,1	0,0
Analgésicos opioides para colocarte	1,7	2,2	1,2	0,5	0,5	0,4	1,2	1,3	1,1	1,8	2,5	1,0	2,6	3,2	1,8	3,5	4,8	2,2
Inhalables volátiles	1,8	1,9	1,7	1,1	1,2	1,1	1,6	1,7	1,4	1,8	1,6	1,9	2,2	2,5	1,9	2,6	3,2	1,9
GHB	0,4	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,5	0,2	0,5	0,9	0,1	0,5	0,7	0,2	0,9	1,1	0,7
Metanfetamina	1,5	1,8	1,2	0,4	0,4	0,3	1,0	1,1	0,8	1,5	2,0	1,1	2,3	2,4	2,2	3,5	4,7	2,2
Setas mágicas	1,3	1,8	0,8	0,4	0,4	0,3	0,8	1,1	0,6	1,5	2,2	0,8	1,8	2,6	1,1	2,8	3,5	1,9
Esteroides anabolizantes	0,4	0,7	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,0	0,6	1,0	0,3	0,6	1,0	0,3	0,3	0,5	0,1

1.2.25. (continuación)

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Sustancias estimulantes																		
para mejorar estudio	6,5	6,2	6,9	4,7	4,0	5,4	5,9	5,4	6,3	6,5	6,2	6,8	7,5	7,0	8,0	10,2	11,3	9,1
Metilfenidato	0,8	0,9	0,7	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,3	0,7	0,8	0,6	1,2	1,2	1,2	1,4	1,9	0,9
Elvanse, Adderall	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3	0,6	0,1	0,5	0,6	0,4	0,8	1,4	0,1
Piracetam	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5	1,0	1,4	0,6
Donepezilo	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,1	0,5	0,7	0,3	0,1	0,2	0,0
Modafinilo	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,1	0,4	0,7	0,0
Durvitan	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,1	0,5	0,5	0,4	0,1	0,3	0,0
Anfetaminas para estudiar	0,7	0,9	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,6	0,4	0,7	1,0	0,4	1,0	1,2	0,8	1,4	2,3	0,4
Cocaína para estudiar	0,9	1,2	0,7	0,3	0,4	0,3	0,9	0,9	0,8	0,9	1,2	0,7	1,2	1,5	0,8	1,5	2,4	0,6
Nuevas sustancias psicoactivas	2,0	2,3	1,6	1,3	0,9	1,7	1,4	1,7	1,2	2,0	2,4	1,5	2,8	3,3	2,3	2,7	4,3	1,0
Ketamina	0,7	0,9	0,4	0,3	0,4	0,2	0,6	0,8	0,4	0,6	0,9	0,4	1,0	1,3	0,7	1,2	1,9	0,5
Spice	0,6	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,9	0,3	1,0	1,2	0,9	0,8	1,4	0,2
Mefedrona	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,4	0,4	0,3	0,4	0,8	0,0
Salvia divinorum	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,4	0,7	0,1	0,3	0,7	0,0
Ayahuasca	0,4	0,6	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,0	0,5	0,7	0,3	0,6	1,1	0,1
CIUS (uso compulsivo internet)	26,9	21,1	32,8	25,7	17,8	33,7	26,5	20,4	32,5	28,4	21,9	35,1	26,7	22,5	31,2	26,5	24,9	28,2
Lie/Bet (posible juego patológico)	3,4	5,0	1,9	2,1	2,6	1,7	2,4	3,7	1,1	3,3	4,8	1,7	4,6	6,8	2,3	6,7	9,2	3,9
Bullying a través de internet	10,7	7,9	13,5	11,1	8,2	13,9	11,3	7,7	14,8	10,2	7,7	12,7	10,2	8,1	12,3	10,9	8,0	14,1
Alguna droga ilegal*	29,5	30,2	28,7	12,5	12,0	12,9	20,3	20,2	20,5	31,9	33,6	30,2	42,6	43,3	41,8	50,7	52,3	48,9
Alguna droga ilegal sin cannabis**	5,1	6,0	4,2	2,1	2,6	1,7	3,3	3,3	3,2	5,1	6,4	3,8	7,4	8,1	6,7	10,7	14,1	7,0

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* Alguna droga ilegal (definición del EMCDDA)= No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB

** Alguna droga ilegal sin cannabis (definición del EMCDDA)= cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.26.

Prevalencia de consumo de drogas y otros trastornos comportamentales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	30,7	27,3	34,2	18,4	14,4	22,5	25,1	20,6	29,6	33,3	30,4	36,4	39,0	36,3	41,8	43,7	40,1	47,6
Cigarrillos electrónicos	22,8	25,2	20,4	21,1	21,1	21,1	21,1	22,3	19,9	24,2	27,3	21,0	23,7	28,4	18,9	24,9	27,1	22,6
Alcohol	70,5	67,8	73,3	50,6	46,2	55,0	64,5	59,7	69,1	75,3	73,1	77,6	82,6	81,4	83,9	85,2	84,9	85,6
Borracheras	39,4	35,4	43,6	20,8	15,0	26,8	30,8	24,8	36,7	44,5	41,2	48,0	51,9	49,2	54,7	58,0	56,3	59,8
Botellón	41,1	38,7	43,5	26,9	22,1	31,8	36,9	32,3	41,4	46,6	45,3	48,0	48,5	47,9	49,1	47,3	48,1	46,3
Bebidas alcohólicas y cannabis	13,7	14,4	13,0	4,4	3,5	5,3	9,3	8,9	9,7	16,1	16,9	15,2	20,1	21,6	18,5	23,4	28,1	18,5
Bebidas alcohólicas y cocaína en polvo y/o base	0,9	1,2	0,6	0,3	0,5	0,2	0,6	0,5	0,7	1,0	1,3	0,7	1,1	1,6	0,7	2,4	3,4	1,4
Hipnosedantes con o sin receta	13,6	9,7	17,6	11,4	7,6	15,2	12,4	8,9	15,8	14,0	9,8	18,3	15,0	10,4	19,8	17,4	14,0	21,0
Hipnosedantes sin receta	7,2	5,1	9,4	5,8	3,5	8,2	6,3	4,2	8,4	7,6	5,1	10,2	8,3	6,1	10,5	9,3	8,5	10,2
Cannabis	22,2	22,6	21,8	8,9	7,9	9,9	15,9	15,5	16,3	25,1	26,2	23,9	31,6	32,0	31,2	36,6	39,3	33,7
Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)	17,8	20,8	14,6	13,3	16,0	11,4	15,2	16,4	14,1	15,4	18,6	11,7	19,7	22,5	16,7	23,9	28,0	18,4
En tratamiento para reducir consumo cannabis	4,4	5,7	3,0	2,7	2,8	2,6	4,0	4,5	3,4	5,0	6,2	3,5	4,9	6,9	2,6	4,7	6,3	2,7
Cocaína polvo y/o base	2,1	2,7	1,5	0,9	1,2	0,6	1,5	1,5	1,5	1,9	2,4	1,3	3,0	3,8	2,2	5,0	7,2	2,8
Cocaína en polvo	1,9	2,4	1,3	0,6	0,9	0,4	1,2	1,3	1,1	1,7	2,1	1,2	2,8	3,5	2,1	4,6	6,6	2,3
Cocaína base	0,8	1,1	0,5	0,5	0,5	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	0,4	1,0	1,5	0,5	1,4	1,9	0,7
Éxtasis	1,8	2,1	1,5	0,6	0,8	0,5	1,3	1,3	1,3	2,0	2,6	1,3	2,9	2,9	2,8	2,8	3,9	1,5
Anfetaminas/speed	0,9	1,2	0,6	0,3	0,5	0,1	0,6	0,8	0,5	1,1	1,5	0,7	1,2	1,5	1,0	1,4	2,4	0,4
Alucinógenos	1,0	1,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,7	0,9	0,5	1,1	1,6	0,5	1,7	2,4	1,0	1,3	1,9	0,6
Heroína	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,6	0,2	0,5	0,7	0,3	0,4	0,8	0,0
Analgésicos opioides para colocalte	0,9	1,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8	0,7	1,0	1,5	0,5	1,2	1,5	0,9	1,4	2,4	0,4
Inhalables volátiles	1,1	1,2	0,9	0,6	0,7	0,6	0,9	1,1	0,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,6	1,1	1,5	2,2	0,8
GHB	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	0,1	0,4	0,7	0,1	0,4	0,6	0,1	0,6	0,7	0,5
Metanfetamina	0,9	1,1	0,7	0,2	0,3	0,1	0,7	0,8	0,6	1,0	1,4	0,7	1,4	1,5	1,4	1,5	2,3	0,5
Setas mágicas	0,8	1,1	0,5	0,3	0,3	0,2	0,5	0,7	0,3	1,0	1,5	0,6	1,0	1,4	0,5	1,7	2,3	1,2
Esteroides anabolizantes	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,1	0,2	0,5	0,0
Nuevas sustancias psicoactivas	1,4	1,7	1,1	1,1	0,7	1,4	1,1	1,4	0,8	1,2	1,5	0,9	2,0	2,2	1,7	2,0	3,4	0,4
Ketamina	0,4	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,6	0,7	0,5	0,9	1,6	0,1
Spice	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,3	0,7	0,8	0,6	0,6	1,0	0,1
Mefedrona	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,4	0,1	0,3	0,6	0,0
Salvia divinorum	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,0
Ayahuasca	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,0	0,4	0,6	0,3	0,4	0,8	0,0

1.2.26. (continuación)

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Conducir + alcohol	2,6	3,5	1,6	0,5	0,5	0,5	1,4	1,8	1,1	3,0	3,9	2,0	3,9	5,5	2,2	6,0	8,6	3,1
Conducir + hachís	1,5	2,2	0,8	0,3	0,4	0,1	1,1	1,5	0,6	1,7	2,5	0,8	2,0	2,9	1,0	4,1	5,7	2,5
Conducir + cocaína	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,1	0,5	0,9	0,0
Pasajero + alcohol	15,0	13,7	16,3	9,0	6,1	11,8	10,9	9,4	12,4	15,4	14,9	16,0	20,7	19,9	21,5	23,7	22,3	25,3
Pasajero + hachís	6,9	7,4	6,4	1,9	1,3	2,5	4,2	4,1	4,3	7,1	8,0	6,2	10,7	12,2	9,2	15,1	14,8	15,5
Pasajero + cocaína	1,6	1,8	1,4	0,5	0,4	0,5	1,3	1,5	1,1	1,7	1,9	1,5	2,2	2,4	2,0	3,4	4,1	2,6
Accidente + droga	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,1	0,6	0,5	0,6	0,8	1,1	0,4	1,1	1,6	0,6
Pelea + droga	4,8	6,2	3,3	2,2	2,3	2,2	3,6	4,4	2,8	5,5	7,3	3,6	6,3	8,5	4,0	7,5	9,8	5,1
Conflicto o discusión	40,6	34,3	46,8	36,7	30,6	42,9	39,3	33,3	45,2	41,7	35,2	48,4	43,2	36,2	50,4	41,7	37,9	45,8
No recordar lo sucedido	17,9	15,0	21,0	11,5	8,3	14,7	15,0	11,6	18,2	20,0	16,8	23,4	22,3	19,0	25,8	22,5	22,3	22,9
Dificultad de concentración	17,2	14,5	19,9	13,0	8,3	17,7	15,5	12,0	19,0	17,7	15,8	19,8	20,1	18,4	21,9	21,5	20,3	22,9
Expulsión del centro educativo	5,9	8,8	2,9	4,6	6,2	3,1	5,5	8,6	2,6	6,5	9,8	3,0	6,4	10,0	2,7	6,5	9,1	3,7
Resaca	31,4	26,6	36,3	16,3	10,4	22,3	24,9	19,4	30,2	34,6	30,0	39,3	42,1	37,9	46,5	45,4	41,3	49,8
Arrepentimiento de relaciones sexuales	6,9	7,3	6,5	3,0	2,9	3,2	5,1	4,9	5,4	7,2	7,4	7,0	9,9	10,7	9,0	12,0	14,2	9,6
Relaciones sexuales sin preservativo	16,3	14,5	18,2	4,0	2,9	5,2	9,4	8,0	10,8	17,0	15,2	18,8	26,7	24,2	29,2	34,2	29,4	39,2
Bullying (internet y presencial)	10,7	7,9	13,5	11,1	8,2	13,9	11,3	7,7	14,8	10,2	7,7	12,7	10,2	8,1	12,3	10,9	8,0	14,1
Uso internet por diversión	99,4	99,3	99,5	99,6	99,6	99,6	99,6	99,3	99,8	99,5	99,5	99,4	99,1	99,2	99,1	98,9	98,1	99,7
Visita de páginas sólo para adultos	53,0	74,8	30,7	43,7	62,7	24,6	50,0	71,3	29,3	56,7	79,0	33,6	57,2	80,7	32,6	59,3	82,5	34,4
Juego a videojuegos	85,1	96,9	73,0	88,0	98,5	77,3	86,1	97,4	75,0	85,2	96,8	73,0	83,1	96,2	69,2	80,9	93,7	66,8
Juego a eSports	48,6	65,9	30,8	52,5	67,6	37,4	50,1	67,5	32,9	48,1	65,1	30,4	45,6	65,1	25,3	44,9	62,1	26,2
Espectador eSports	37,7	56,1	18,8	40,1	57,3	22,9	38,9	58,7	19,6	37,2	56,1	17,6	36,4	54,9	17,0	33,1	49,3	15,4
Jugar dinero online	9,4	15,0	3,8	7,6	11,5	3,7	7,4	11,7	3,4	9,5	15,5	3,5	10,8	17,3	4,1	15,3	24,6	5,6
Jugar dinero presencial	17,2	22,7	11,6	12,5	14,0	11,0	14,1	18,5	9,9	16,8	23,1	10,5	20,9	28,7	12,8	28,1	36,8	18,9
Alguna droga ilegal*	23,0	23,6	22,3	9,5	8,7	10,3	16,5	16,3	16,8	25,7	27,1	24,3	32,5	33,1	31,9	37,6	40,3	34,8
Alguna droga ilegal sin cannabis**	3,5	4,3	2,7	1,5	1,9	1,1	2,3	2,5	2,2	3,6	4,6	2,6	5,2	6,1	4,2	6,9	9,4	4,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* Alguna droga ilegal (definición del EMCDDA): no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales; es ilegal la manera de usarlos: cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

** Alguna droga ilegal sin cannabis (definición del EMCDDA): cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.27.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	23,9	21,2	26,7	13,0	10,0	16,0	18,2	14,5	21,8	26,7	24,2	29,3	31,4	29,6	33,3	36,9	33,2	40,9
Cigarrillos de cajetilla	28,2	26,2	29,8	31,3	29,8	32,2	27,8	26,6	28,6	26,8	24,5	28,7	26,3	24,9	27,5	34,6	31,1	37,7
Tabaco de liar	22,5	21,8	23,2	21,9	21,4	22,2	21,6	21,1	21,9	20,8	19,9	21,5	25,3	24,5	26,1	21,6	20,0	22,9
De los 2 tipos	49,2	52,0	47,1	46,8	48,8	45,6	50,6	52,3	49,5	52,4	55,6	49,8	48,4	50,6	46,4	43,8	48,9	39,4
Cigarrillos electrónicos	8,1	9,4	6,8	8,1	8,5	7,8	7,1	7,1	7,1	8,3	10,0	6,6	8,4	11,3	5,4	9,7	10,8	8,5
Alcohol	53,6	51,5	55,8	34,1	29,9	38,3	45,9	43,4	48,5	57,1	55,5	58,8	66,9	65,1	68,8	72,8	72,3	73,3
Borracheras	23,2	20,8	25,6	11,7	7,4	16,0	16,9	13,6	20,2	25,9	24,0	27,9	31,9	30,4	33,5	35,5	35,0	36,1
Binge drinking	27,9	26,3	29,6	15,7	11,1	20,3	21,1	18,4	23,7	29,8	29,3	30,3	37,9	37,4	38,4	42,7	43,2	42,2
Bebidas energéticas	45,0	50,7	39,0	44,0	46,1	41,9	46,0	49,7	42,3	45,0	52,3	37,3	44,5	53,9	34,6	45,6	50,3	40,6
Bebidas energéticas + alcohol	16,1	17,5	14,6	12,1	11,3	12,8	14,4	15,2	13,6	17,0	18,8	15,1	18,3	21,3	15,2	20,6	22,7	18,4
Hipnosedantes con o sin receta	7,5	5,0	10,0	6,6	4,4	8,8	6,8	4,6	9,0	7,4	4,7	10,3	8,2	5,4	11,1	9,4	7,1	11,9
Hipnosedantes sin receta	3,6	2,6	4,7	3,0	1,7	4,2	3,5	2,3	4,6	3,4	2,3	4,6	4,1	3,0	5,3	4,6	4,8	4,5
Cannabis	14,9	15,7	14,1	6,2	6,0	6,5	10,2	10,1	10,2	16,9	18,2	15,6	21,3	22,3	20,2	25,2	28,2	22,0
En forma de porros o canutos	13,4	14,0	12,9	5,3	5,0	5,6	9,0	8,8	9,3	15,4	16,2	14,5	19,1	19,8	18,3	23,5	26,3	20,4
Usando pipas de agua	1,5	2,2	0,8	0,6	0,7	0,5	0,8	1,1	0,6	1,6	2,5	0,6	2,2	3,1	1,2	3,5	5,4	1,4
Usando cigarrillos electrónicos	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0	0,3	0,6	0,0
Por vía oral	0,8	1,0	0,5	0,3	0,3	0,2	0,4	0,7	0,2	0,8	0,9	0,7	1,3	2,0	0,5	1,6	1,5	1,7
Cannabis mezclado con tabaco	11,4	11,9	11,0	4,1	3,4	4,8	7,3	7,2	7,4	13,2	14,0	12,4	16,7	17,3	16,0	20,8	23,4	18,1
Cocaína polvo y/o base	0,6	0,9	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4	0,5	0,3	0,7	1,2	0,3	0,7	1,1	0,3	1,1	1,5	0,7
Cocaína en polvo	0,5	0,8	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,3	0,7	1,0	0,3	0,6	1,0	0,2	1,1	1,5	0,6
Cocaína base	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,6	0,0	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1
Éxtasis	0,6	0,8	0,4	0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	0,4	0,6	1,1	0,1	1,0	1,1	0,9	0,8	1,2	0,3
Anfetaminas/speed	0,4	0,6	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,5	0,0	0,4	0,6	0,1	0,6	0,9	0,4	0,3	0,6	0,0
Alucinógenos	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,4	0,7	0,0	0,5	0,7	0,3	0,4	0,7	0,0
Heroína	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5	0,0	0,3	0,6	0,0
Analgésicos opioides para colocarte	0,3	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,5	0,4	0,6	1,0	0,2
Inhalables volátiles	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,6	0,7	0,5	0,5	0,8	0,2
GHB	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,4	0,2
Metanfetamina	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,3	0,4	0,8	0,1	0,4	0,5	0,3	0,6	1,0	0,1
Setas mágicas	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,3	0,6	0,0	0,4	0,5	0,2	0,4	0,8	0,0
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,3	0,5	0,1	0,2	0,5	0,0
Nuevas sustancias psicoactivas	0,8	0,9	0,6	0,5	0,3	0,6	0,5	0,7	0,3	0,9	1,1	0,7	1,0	1,3	0,7	0,9	1,6	0,1
Ketamina	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,0
Spice	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,6	0,1
Mefedrona	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0
Salvia divinorum	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,0
Ayahuasca	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	0,0
Alguna droga ilegal*	15,3	16,3	14,4	6,5	6,3	6,6	10,5	10,7	10,4	17,3	18,7	15,9	21,7	22,8	20,5	25,6	28,9	22,2
Alguna droga ilegal sin cannabis**	1,2	1,7	0,8	0,6	0,9	0,3	0,8	1,1	0,6	1,3	2,0	0,5	1,9	2,3	1,5	2,0	2,9	1,0

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* Alguna droga ilegal (definición del EMCDDA): no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales; es ilegal la manera de usarlos: cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

** Alguna droga ilegal sin cannabis (definición del EMCDDA): cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.28.

Prevalencia de consumo diario de drogas y otros trastornos comportamentales en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	9,0	8,8	9,2	2,7	2,5	2,9	5,1	4,0	6,2	9,8	10,4	9,2	14,0	14,2	13,9	18,4	16,8	20,2
Alcohol	1,1	1,3	1,0	0,5	0,5	0,4	0,9	0,9	0,9	1,2	1,1	1,3	1,4	1,8	0,9	2,7	3,4	2,0
Borracheras	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,6	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3
Binge drinking	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,2	0,7	0,6	0,8	0,8	1,3	0,3
Hipnosedantes con o sin receta	3,7	2,6	4,7	3,6	2,6	4,5	3,5	2,3	4,6	3,8	2,6	5,0	3,6	2,6	4,7	4,0	3,4	4,7
Hipnosedantes sin receta	1,4	1,1	1,8	1,3	0,7	1,8	1,6	1,0	2,1	1,4	1,0	1,8	1,4	1,3	1,6	1,5	1,6	1,5
Cannabis	1,6	2,1	1,1	0,2	0,2	0,1	0,8	1,1	0,6	1,7	2,4	1,1	2,5	3,1	1,9	4,6	5,8	3,3
Videojuegos	59,7	92,0	21,9	66,0	96,1	27,8	63,0	93,9	24,6	59,0	91,6	20,2	55,0	89,8	18,4	51,3	83,3	18,6
eSports	14,0	30,8	1,8	14,1	30,2	2,2	14,5	32,6	1,9	13,7	29,9	1,9	14,1	31,8	1,5	12,5	27,0	1,6

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.29.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (años). España, 2021.

	Edad media inicio en el consumo de tabaco	Edad media inicio en el consumo de tabaco diario	Edad media inicio en el consumo de alcohol	Edad media inicio en el consumo de cannabis
Andalucía	14,3	14,9	14,2	15,1
Aragón	14,0	14,7	13,7	14,9
Asturias	14,4	15,0	14,1	15,1
Baleares	14,2	14,7	14,0	14,8
Canarias	14,2	14,9	14,1	15,0
Cantabria	14,0	14,6	13,9	14,9
Castilla y León	14,1	14,5	13,9	14,8
Castilla-La Mancha	14,0	14,8	13,9	14,9
Cataluña	13,9	14,7	13,9	14,7
C. Valenciana	14,1	14,7	13,8	14,7
Extremadura	14,1	14,8	13,9	15,0
Galicia	14,1	14,7	14,1	15,0
Madrid	14,1	14,7	14,0	14,8
Murcia	14,1	14,9	14,0	15,1
Navarra	14,3	14,9	13,6	15,0
País Vasco	14,2	14,8	13,7	14,7
La Rioja	14,1	14,6	13,8	14,8
Ceuta	14,3	14,3	14,1	15,1
Melilla	14,7	15,3	14,8	15,4
Total	14,1	14,7	14,0	14,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.30.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021.

	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.659	32,9	31,1	34,7	26,8	25,1	28,5	21,7	20,2	23,3
Aragón	952	41,0	37,9	44,1	31,1	28,1	34,0	23,7	21,0	26,4
Asturias	789	33,2	29,9	36,4	27,9	24,8	31,1	20,9	18,0	23,7
Baleares	864	35,8	32,6	39,0	27,0	24,0	29,9	17,5	15,0	20,1
Canarias	1.150	32,8	30,1	35,5	23,4	20,9	25,8	16,8	14,6	18,9
Cantabria*	609	39,6	35,7	43,5	32,0	28,3	35,7	26,0	22,5	29,4
Castilla y León	1.156	43,4	40,6	46,3	35,6	32,8	38,3	27,8	25,2	30,4
Castilla-La Mancha	1.195	39,7	36,9	42,5	31,6	29,0	34,2	26,2	23,7	28,7
Cataluña	2.493	40,2	38,2	42,1	32,7	30,8	34,5	24,9	23,2	26,6
C. Valenciana	1.891	41,7	39,5	43,9	33,3	31,2	35,4	25,5	23,6	27,5
Extremadura	848	43,2	39,9	46,5	34,5	31,3	37,6	27,7	24,7	30,7
Galicia	1.244	38,1	35,4	40,8	31,2	28,6	33,7	23,2	20,8	25,5
Madrid	2.343	39,5	37,6	41,5	31,6	29,7	33,5	25,9	24,1	27,7
Murcia	1.131	38,1	35,2	40,9	29,3	26,6	31,9	23,2	20,8	25,7
Navarra	824	42,4	39,1	45,8	36,4	33,1	39,7	29,0	25,9	32,1
País Vasco	1.226	40,4	37,6	43,1	33,5	30,9	36,2	25,0	22,5	27,4
La Rioja*	451	35,6	31,1	40,0	29,6	25,4	33,8	22,1	18,3	26,0
Ceuta*	251	22,1	16,9	27,2	15,7	11,2	20,2	10,3	6,5	14,1
Melilla*	245	18,1	13,3	22,9	13,6	9,3	17,9	9,8	6,1	13,5
Total	22.321	38,2	37,6	38,9	30,7	30,1	31,3	23,9	23,4	24,5

* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.31.


Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	29,4	37,0	23,1	30,9	18,9	24,9
Aragón	35,9	45,5	25,5	36,0	18,6	28,1
Asturias	31,7	34,6	27,6	28,2	20,2	21,5
Baleares	33,9	38,0	24,7	29,7	16,9	18,2
Canarias	32,0	33,6	23,3	23,5	16,8	16,7
Cantabria*	37,0	42,1	26,1	37,7	21,0	30,7
Castilla y León	41,9	45,0	34,3	36,9	27,2	28,4
Castilla-La Mancha	36,8	42,7	30,0	33,3	24,3	28,1
Cataluña	38,1	42,2	29,5	35,9	22,6	27,1
C. Valenciana	38,4	45,1	29,6	37,0	22,8	28,3
Extremadura	38,8	47,2	30,1	38,4	24,6	30,5
Galicia	36,6	39,6	30,2	32,1	23,1	23,3
Madrid	33,6	45,0	25,2	37,5	19,4	31,8
Murcia	37,3	39,0	28,5	30,2	22,2	24,4
Navarra	39,8	45,3	33,9	39,1	26,7	31,6
País Vasco	37,0	43,9	29,1	38,2	22,9	27,1
La Rioja*	32,2	38,6	26,7	32,2	19,8	24,3
Ceuta*	23,9	20,7	16,5	15,1	11,1	9,7
Melilla*	19,1	17,2	16,6	11,0	12,0	7,9
Total	35,1	41,5	27,3	34,2	21,2	26,7

CONSUMO DE TABACO A DIARIO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 23,9%

- < media España
- > media España
- = media España



* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.32.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021.

	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.659	73,9	72,3	75,6	71,4	69,7	73,1	57,6	55,7	59,4
Aragón	952	75,7	73,0	78,4	71,9	70,2	74,8	54,0	50,8	57,1
Asturias	789	71,9	68,7	75,0	68,0	66,2	71,3	51,3	47,8	54,8
Baleares	864	78,0	75,2	80,7	73,1	71,4	76,1	50,2	46,9	53,5
Canarias	1.150	72,5	70,0	75,1	68,3	66,6	71,0	50,4	47,5	53,3
Cantabria	609	71,9	68,3	75,5	70,1	68,3	73,7	56,6	52,6	60,5
Castilla y León	1.156	77,6	75,2	80,0	75,2	73,6	77,7	61,5	58,7	64,3
Castilla-La Mancha	1.195	73,2	70,6	75,7	69,8	68,1	72,4	51,9	49,1	54,8
Cataluña	2.493	74,0	72,3	75,7	70,6	68,9	72,4	51,5	49,6	53,5
C. Valenciana	1.891	76,4	74,4	78,3	72,4	70,7	74,5	55,0	52,8	57,3
Extremadura	848	77,1	74,2	79,9	74,3	72,7	77,3	62,5	59,2	65,7
Galicia	1.244	72,6	70,2	75,1	68,3	66,6	70,9	46,5	43,8	49,3
Madrid	2.343	72,0	70,1	73,8	68,4	66,7	70,3	50,5	48,4	52,5
Murcia	1.131	69,8	67,2	72,5	65,7	63,9	68,4	48,5	45,6	51,4
Navarra	824	81,2	78,5	83,8	77,5	75,9	80,3	62,1	58,8	65,4
País Vasco	1.226	74,9	72,5	77,4	70,7	69,0	73,2	55,9	53,2	58,7
La Rioja*	451	73,6	69,5	77,7	69,9	68,2	74,1	56,4	51,8	61,0
Ceuta*	251	39,7	33,7	45,8	37,6	35,8	43,6	25,1	19,8	30,5
Melilla*	245	36,9	30,9	43,0	34,6	32,8	40,6	27,7	22,1	33,3
Total	22.321	73,9	73,4	74,5	70,5	68,8	71,1	53,6	53,0	54,3

* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.33.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	71,5	76,7	68,5	74,6	54,1	61,5
Aragón	76,1	75,3	71,6	72,2	52,4	55,4
Asturias	68,2	75,4	65,6	70,4	53,2	49,5
Baleares	76,6	79,6	70,7	76,0	47,3	53,8
Canarias	67,7	77,4	63,3	73,4	45,9	54,9
Cantabria	64,9	78,7	62,8	77,1	51,8	61,2
Castilla y León	76,7	78,6	73,7	76,8	60,4	62,8
Castilla-La Mancha	70,7	75,8	67,0	72,8	50,6	53,3
Cataluña	71,6	76,4	67,5	73,7	50,7	52,4
C. Valenciana	74,1	78,7	70,2	74,8	51,5	58,6
Extremadura	76,3	77,7	74,7	73,9	61,3	63,5
Galicia	72,5	72,8	67,2	69,5	47,7	45,4
Madrid	67,9	75,7	64,2	72,3	47,6	53,1
Murcia	71,4	68,0	65,5	65,8	47,8	49,3
Navarra	80,4	82,0	76,2	78,9	61,5	62,7
País Vasco	71,7	78,3	67,4	74,2	53,2	58,8
La Rioja*	72,3	74,8	68,6	71,1	58,7	54,3
Ceuta*	40,3	39,2	37,6	37,6	28,1	22,8
Melilla*	42,4	32,1	41,4	28,8	33,6	22,6
Total	71,6	76,3	67,8	73,3	51,5	55,8

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 53,6%

- < media España
- > media España
- = media España



* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.34.

Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021.

	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.659	47,3	45,4	49,2	39,4	37,6	41,3	25,6	23,9	27,2
Aragón	952	51,6	48,4	54,7	41,3	39,5	44,5	23,7	21,0	26,4
Asturias	789	44,8	41,3	48,3	36,4	34,5	39,7	20,2	17,4	23,0
Baleares	864	48,1	44,8	51,5	38,7	36,8	41,9	19,4	16,8	22,1
Canarias	1.150	43,0	40,1	45,9	31,8	30,0	34,5	16,9	14,7	19,0
Cantabria*	609	53,0	49,1	57,0	45,2	43,3	49,2	29,7	26,1	33,3
Castilla y León	1.156	55,0	52,2	57,9	46,6	44,7	49,5	29,2	26,5	31,8
Castilla-La Mancha	1.195	46,7	43,9	49,5	38,6	36,7	41,3	20,9	18,6	23,2
Cataluña	2.493	47,6	45,6	49,5	40,3	38,4	42,2	21,5	19,9	23,1
C. Valenciana	1.891	53,1	50,9	55,4	42,7	40,8	44,9	24,7	22,7	26,6
Extremadura	848	55,0	51,6	58,3	44,5	42,7	47,9	29,6	26,5	32,7
Galicia	1.244	45,2	42,4	48,0	36,1	34,3	38,8	18,0	15,9	20,1
Madrid	2.343	44,9	42,8	46,9	35,9	34,1	37,8	21,0	19,4	22,7
Murcia	1.131	44,9	42,0	47,8	35,7	33,9	38,5	19,4	17,1	21,7
Navarra	824	59,6	56,3	63,0	51,1	49,2	54,6	33,2	30,0	36,4
País Vasco	1.226	48,6	45,8	51,4	41,6	39,7	44,3	29,0	26,5	31,5
La Rioja*	451	53,5	48,9	58,1	46,3	44,4	50,9	25,5	21,5	29,6
Ceuta*	251	19,5	14,6	24,4	15,2	13,8	19,7	7,7	4,4	11,1
Melilla*	245	21,7	16,6	26,9	15,4	14,0	19,9	7,1	3,9	10,3
Total	22.321	48,0	47,4	48,7	39,4	37,6	40,1	23,2	22,6	23,7

* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.35.


Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	42,8	52,5	34,2	45,3	22,2	29,3
Aragón	45,9	56,5	34,9	46,9	20,1	26,9
Asturias*	43,5	46,1	35,6	37,1	19,2	21,2
Baleares	46,1	50,6	36,5	41,3	19,3	19,7
Canarias	37,8	48,3	26,1	37,3	14,5	19,2
Cantabria*	46,6	59,1	39,0	51,1	24,3	34,8
Castilla y León	53,0	57,2	45,1	48,2	26,4	32,0
Castilla-La Mancha	41,9	51,8	34,7	42,6	19,7	22,1
Cataluña	43,8	51,4	36,8	43,7	20,0	23,0
C. Valenciana	49,5	56,8	39,7	45,8	22,6	26,8
Extremadura	52,4	57,4	40,1	48,5	24,7	34,1
Galicia	43,5	47,0	36,2	36,1	18,5	17,5
Madrid	37,6	51,6	29,7	41,6	17,5	24,3
Murcia	43,5	46,5	33,7	38,1	17,4	21,8
Navarra	56,7	62,8	47,3	55,4	28,4	38,3
País Vasco	44,2	53,2	36,9	46,5	26,2	31,9
La Rioja*	47,7	58,8	42,7	49,6	25,0	26,0
Ceuta*	20,0	19,1	13,2	16,7	8,3	7,3
Melilla*	28,3	16,1	19,2	12,3	7,9	6,4
Total	43,8	52,4	35,4	43,6	20,8	25,6

BORRACHERAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 23,2%

- < media España
- > media España
- = media España



* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.36.

Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021.

Últimos 30 días				
	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.659	30,5	28,7	32,2
Aragón	952	28,0	25,1	30,8
Asturias	789	23,8	20,9	26,8
Baleares	864	25,7	22,8	28,6
Canarias	1.150	23,3	20,8	25,7
Cantabria*	609	32,0	28,2	35,7
Castilla y León	1.156	33,3	30,6	36,0
Castilla-La Mancha	1.195	27,9	25,4	30,4
Cataluña	2.493	25,2	23,5	26,9
C. Valenciana	1.891	30,5	28,4	32,5
Extremadura	848	38,0	34,8	41,3
Galicia	1.244	20,3	18,1	22,5
Madrid	2.343	25,1	23,3	26,8
Murcia	1.131	26,2	23,6	28,8
Navarra	824	37,3	34,0	40,6
País Vasco	1.226	33,7	31,1	36,4
La Rioja*	451	30,3	26,0	34,5
Ceuta*	251	10,9	7,0	14,7
Melilla*	245	12,0	7,9	16,0
Total	22.321	27,9	27,3	28,5

* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.37.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021.

Últimos 30 días		
	Hombre	Mujer
Andalucía	28,3	33,0
Aragón	24,7	30,8
Asturias	21,5	26,0
Baleares	26,3	25,0
Canarias	19,0	27,5
Cantabria*	31,3	32,6
Castilla y León	34,5	32,1
Castilla-La Mancha	29,0	26,7
Cataluña	24,8	25,7
C. Valenciana	28,1	32,8
Extremadura	34,6	41,1
Galicia	21,7	18,9
Madrid	21,7	28,1
Murcia	25,1	27,5
Navarra	36,1	38,5
País Vasco	30,7	36,9
La Rioja*	31,2	29,5
Ceuta*	12,5	9,7
Melilla*	12,5	11,5
Total	26,3	29,6

BINGE DRINKING EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 27,9%

- < media España
- > media España
- = media España



* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.38.

Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021.

	Tamaño de muestra	Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.659	40,4	38,5	42,2	21,2	19,7	22,8
Aragón	952	39,5	36,4	42,7	14,4	13,1	16,7
Asturias*	789	35,0	31,7	38,3	15,1	13,7	17,5
Baleares	864	38,2	35,0	41,4	18,1	16,7	20,7
Canarias	1.150	24,2	21,7	26,7	9,6	8,4	11,3
Cantabria*	609	47,3	43,4	51,3	27,9	26,2	31,5
Castilla y León	1.156	50,4	47,6	53,3	26,1	24,4	28,6
Castilla-La Mancha	1.195	42,4	39,6	45,2	20,1	18,5	22,3
Cataluña	2.493	44,8	42,8	46,8	19,2	17,7	20,8
C. Valenciana	1.891	43,6	41,3	45,8	20,1	18,6	21,9
Extremadura	848	49,7	46,3	53,1	24,3	22,7	27,2
Galicia	1.244	35,7	33,0	38,4	15,7	14,3	17,7
Madrid	2.343	38,0	36,0	39,9	17,2	15,8	18,7
Murcia	1.131	38,0	35,2	40,8	19,1	17,6	21,4
Navarra	824	51,1	47,7	54,5	28,7	26,9	31,7
País Vasco	1.226	46,7	43,9	49,5	24,1	22,5	26,5
La Rioja*	451	40,1	35,6	44,7	18,9	17,4	22,5
Ceuta*	251	17,8	13,0	22,5	9,3	8,2	12,9
Melilla*	245	13,9	9,6	18,2	8,9	7,8	12,5
Total	22.321	41,1	40,4	41,7	19,4	17,9	20,0

* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.39.


Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021.

	Últimos 12 meses	
	Hombre	Mujer
Andalucía	38,1	43,0
Aragón	36,9	41,9
Asturias	34,2	35,7
Baleares	34,4	42,9
Canarias	24,3	24,1
Cantabria	44,1	50,4
Castilla y León	48,5	52,4
Castilla-La Mancha	40,3	44,7
Cataluña	41,5	48,1
C. Valenciana	41,5	45,7
Extremadura	47,9	51,3
Galicia	35,8	35,6
Madrid	34,7	41,0
Murcia	37,8	38,2
Navarra	49,1	53,2
País Vasco	41,8	51,9
La Rioja*	36,7	43,3
Ceuta*	17,7	17,8
Melilla*	16,4	11,7
Total	38,7	43,5

BOTELLÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media nacional 41,1%

- < media España
- > media España
- = media España



* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.40.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021.

Últimos 30 días				
	Tamaño de muestra	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.659	18,0	16,5	19,4
Aragón	952	12,6	10,5	14,8
Asturias	789	13,1	10,8	15,5
Baleares	864	19,2	16,6	21,8
Canarias	1.150	14,7	12,7	16,8
Cantabria*	609	15,2	12,3	18,0
Castilla y León	1.156	12,6	10,7	14,5
Castilla-La Mancha	1.195	13,6	11,6	15,5
Cataluña	2.493	18,9	17,4	20,5
C. Valenciana	1.891	19,1	17,3	20,9
Extremadura	848	12,4	10,2	14,6
Galicia	1.244	11,7	9,9	13,4
Madrid	2.343	12,5	11,2	13,8
Murcia	1.131	15,9	13,8	18,1
Navarra	824	14,3	11,9	16,7
País Vasco	1.226	17,7	15,6	19,9
La Rioja*	451	11,2	8,2	14,1
Ceuta*	251	12,2	8,2	16,3
Melilla*	245	18,1	13,3	23,0
Total	22.321	16,1	15,6	16,5

* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.41.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021.

	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.659	19,3	17,8	20,8	12,9	11,6	14,2
Aragón	952	19,3	16,8	21,8	14,9	12,7	17,2
Asturias	789	18,4	15,7	21,1	12,7	10,4	15,1
Baleares	864	17,1	14,6	19,6	11,2	9,1	13,3
Canarias	1.150	22,3	19,9	24,7	14,9	12,9	17,0
Cantabria*	609	16,9	13,9	19,8	12,9	10,2	15,6
Castilla y León	1.156	16,8	14,6	18,9	11,0	9,2	12,8
Castilla-La Mancha	1.195	17,2	15,0	19,3	12,8	10,9	14,7
Cataluña	2.493	20,3	18,7	21,9	13,8	12,5	15,2
C. Valenciana	1.891	22,3	20,4	24,2	15,6	14,0	17,2
Extremadura	848	20,8	18,1	23,5	15,4	13,0	17,8
Galicia	1.244	19,5	17,3	21,7	14,2	12,3	16,2
Madrid	2.343	20,9	19,3	22,6	14,6	13,2	16,1
Murcia	1.131	20,4	18,0	22,7	14,2	12,2	16,3
Navarra	824	17,0	14,5	19,6	12,3	10,1	14,6
País Vasco	1.226	13,9	12,0	15,9	10,0	8,3	11,6
La Rioja*	451	15,3	12,0	18,6	9,7	6,9	12,4
Ceuta*	251	15,0	10,6	19,4	10,2	6,5	14,0
Melilla*	245	13,7	9,4	18,0	8,3	4,8	11,7
Total	22.321	19,6	19,1	20,2	13,6	13,1	14,0

* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.42.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	15,5	23,6	8,9	17,4
Aragón	16,0	22,2	11,1	18,3
Asturias	16,5	20,1	9,1	16,2
Baleares	10,9	24,6	5,8	17,8
Canarias	14,8	30,0	9,5	20,3
Cantabria*	9,3	24,1	7,1	18,4
Castilla y León	13,7	20,0	8,6	13,6
Castilla-La Mancha	12,1	22,6	8,1	17,9
Cataluña	15,8	24,9	10,2	17,4
C. Valenciana	16,8	28,0	11,0	20,3
Extremadura	18,2	23,2	13,9	16,8
Galicia	16,9	22,1	10,9	17,6
Madrid	16,3	25,3	9,8	19,0
Murcia	16,5	24,9	11,7	17,2
Navarra	15,3	19,0	10,8	13,9
País Vasco	11,1	16,8	7,4	12,7
La Rioja*	10,1	20,1	6,4	12,7
Ceuta*	14,6	15,3	8,9	11,3
Melilla*	9,7	17,1	5,2	10,9
Total	15,3	24,1	9,7	17,6

* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.43.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021.

	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.659	21,4	19,8	23,0	16,1	14,7	17,5
Aragón	952	26,6	23,8	29,4	20,4	17,9	23,0
Asturias	789	23,6	20,7	26,6	18,5	15,8	21,2
Baleares	864	31,0	27,9	34,1	24,0	21,1	26,8
Canarias	1.150	28,2	25,6	30,8	21,8	19,4	24,2
Cantabria*	609	27,4	23,8	30,9	23,4	20,1	26,8
Castilla y León	1.156	30,1	27,4	32,7	24,0	21,5	26,4
Castilla-La Mancha	1.195	28,2	25,6	30,7	22,2	19,8	24,5
Cataluña	2.493	32,3	30,5	34,2	25,6	23,9	27,3
C. Valenciana	1.891	36,5	34,4	38,7	27,4	25,4	29,5
Extremadura	848	29,6	26,5	32,6	22,8	20,0	25,6
Galicia	1.244	28,9	26,4	31,4	23,7	21,3	26,1
Madrid	2.343	27,8	26,0	29,6	21,8	20,2	23,5
Murcia	1.131	24,5	22,0	27,0	17,4	15,2	19,6
Navarra	824	33,5	30,3	36,8	27,6	24,5	30,6
País Vasco	1.226	33,5	30,8	36,1	26,6	24,1	29,1
La Rioja*	451	26,7	22,6	30,8	20,5	16,8	24,2
Ceuta*	251	15,4	10,9	19,9	12,2	8,1	16,2
Melilla*	245	11,4	7,4	15,4	7,1	3,9	10,3
Total	22.321	28,6	28,0	29,2	22,2	21,7	22,8

* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.44.


Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	22,6	20,0	17,0	15,1
Aragón	26,4	26,8	21,2	19,8
Asturias	25,2	22,1	19,9	17,3
Baleares	33,0	28,5	26,8	20,6
Canarias	27,7	28,6	22,0	21,6
Cantabria*	28,7	26,1	24,9	22,0
Castilla y León	32,6	27,5	25,7	22,2
Castilla-La Mancha	27,4	29,0	22,9	21,4
Cataluña	31,9	32,8	24,7	26,5
C. Valenciana	38,2	34,9	28,4	26,5
Extremadura	32,9	26,6	25,3	20,6
Galicia	32,3	25,3	27,0	20,4
Madrid	26,1	29,4	20,2	23,4
Murcia	27,4	21,2	19,3	15,2
Navarra	36,8	30,0	31,4	23,5
País Vasco	34,0	33,0	25,9	27,3
La Rioja*	31,9	22,0	24,5	16,8
Ceuta*	18,4	13,1	12,5	11,9
Melilla*	12,4	10,7	9,8	4,9
Total	29,3	28,0	22,6	21,8

CONSUMO DE CANNABIS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media nacional 22,2%

- < media España
- > media España
- = media España



* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.45.

Prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021.

	Tamaño de muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.659	46,9	45,0	48,8	24,7	23,1	26,4
Aragón	952	41,6	38,5	44,7	18,3	15,9	20,8
Asturias	789	34,4	31,1	37,8	16,1	13,5	18,6
Baleares	864	39,3	36,0	42,5	23,7	20,8	26,5
Canarias	1.150	40,6	37,7	43,4	23,3	20,8	25,7
Cantabria*	609	37,8	34,0	41,7	19,4	16,2	22,5
Castilla y León	1.156	43,6	40,7	46,4	20,2	17,9	22,5
Castilla-La Mancha	1.195	44,5	41,7	47,3	20,8	18,5	23,1
Cataluña	2.493	45,7	43,7	47,6	27,0	25,3	28,8
C. Valenciana	1.891	46,3	44,1	48,5	22,5	20,7	24,4
Extremadura	848	50,7	47,4	54,1	24,6	21,7	27,5
Galicia	1.244	38,1	35,4	40,8	19,7	17,4	21,9
Madrid	2.343	45,8	43,7	47,8	21,3	19,7	23,0
Murcia	1.131	47,1	44,2	50,0	26,5	24,0	29,1
Navarra	824	41,9	38,5	45,2	19,5	16,8	22,2
País Vasco	1.226	38,0	35,3	40,8	16,6	14,5	18,6
La Rioja*	451	31,6	27,3	35,8	9,6	6,9	12,3
Ceuta*	251	32,7	26,9	38,5	19,1	14,2	23,9
Melilla*	245	27,0	21,4	32,5	9,1	5,5	12,7
Total	22.321	44,3	43,7	45,0	22,8	22,2	23,3

* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.46.


Prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	48,3	45,4	26,8	22,4
Aragón	42,2	41,1	21,6	15,6
Asturias	38,0	31,1	19,3	13,1
Baleares	44,5	32,8	26,7	20,0
Canarias	40,2	40,9	21,7	24,7
Cantabria*	38,2	37,5	17,9	20,7
Castilla y León	49,7	37,2	24,6	15,5
Castilla-La Mancha	45,7	43,2	24,5	16,8
Cataluña	49,2	42,1	28,9	25,2
C. Valenciana	48,1	44,5	24,4	20,7
Extremadura	56,1	45,9	27,7	21,9
Galicia	42,4	33,7	22,7	16,7
Madrid	46,9	44,7	23,5	19,3
Murcia	52,0	41,3	30,9	21,5
Navarra	47,9	35,3	23,9	14,8
País Vasco	43,0	32,8	20,6	12,3
La Rioja*	37,9	25,8	10,0	9,3
Ceuta*	34,4	31,4	18,7	19,3
Melilla*	33,8	21,1	11,6	7,1
Total	46,9	41,7	25,2	20,4

CONSUMO DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS ALGUNA VEZ EN LA VIDA

Media nacional 22,8%

- < media España
- > media España
- = media España



* Los valores de estas CCAA deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.47.

Evolución de la incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2021.

	2014			2016			2019			2021		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	12,9	11,3	14,5	16,3	15,0	17,7	17,6	15,3	20,0	13,9	11,7	16,2
Alcohol	46,3	42,9	49,6	47,7	47,0	48,4	48,9	46,5	51,3	41,1	38,2	44,3
Cannabis	12,0	12,3	11,7	13,9	14,7	13,1	16,9	17,4	16,4	11,4	10,7	12,1
Cocaína en polvo	1,0	1,1	0,8	1,2	1,5	0,9	1,2	1,6	0,8	1,0	1,2	0,8
Cocaína base	1,1	1,2	1,0	0,7	0,8	0,5	0,5	0,6	0,3	0,5	0,6	0,3
Cocaína polvo y/o base	1,7	1,9	1,5	1,4	1,8	1,0	1,4	1,8	0,9	1,2	1,5	0,9

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Notas:

Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2021. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

En ESTUDES no se dispone de la desagregación poblacional de estudiantes según sexo y edad, por eso la tabla se ha calculado utilizando el factor de expansión.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.48.

Evolución de la incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (números absolutos). España, 2014-2021.

	2014			2016			2019			2021		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	137.183	60.518	76.485	184.607	87.682	96.924	205.578	89.300	116.278	169.568	74.507	95.060
Alcohol	286.034	131.070	154.587	323.876	167.430	156.445	346.595	164.982	181.613	311.232	152.531	158.701
Cannabis	146.271	72.384	73.828	169.967	88.907	81.060	222.195	109.618	112.578	155.842	72.615	83.227
Cocaína en polvo	14.313	8.157	6.166	17.660	11.045	6.615	18.813	12.422	6.391	16.573	10.233	6.341
Cocaína base	16.312	8.580	7.726	10.181	6.107	4.073	7.760	5.050	2.710	7.963	5.455	2.508
Cocaína polvo y/o base	24.671	13.820	10.889	21.472	13.684	7.788	21.816	14.153	7.664	19.940	12.630	7.309

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Notas:

Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2021. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

En ESTUDES no se dispone de la desagregación poblacional de estudiantes según sexo y edad, por eso la tabla se ha calculado utilizando el factor de expansión.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.49.

Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	13,9	11,7	16,2	13,2	10,4	16,1	14,7	12,1	17,4	14,3	12,1	16,6	13,7	12,7	14,9	11,4	10,3	12,7
Alcohol	41,1	38,2	44,3	35,7	31,1	40,3	43,2	38,7	48,1	45,3	43,9	46,9	43,1	43,1	43,1	35,2	35,5	35,0
Cannabis	11,4	10,7	12,1	7,0	5,9	8,0	10,5	9,9	11,1	13,3	13,2	13,4	14,6	13,5	15,7	13,4	11,9	14,9
Cocaína en polvo	1,0	1,2	0,8	0,4	0,7	0,2	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	0,7	1,3	1,6	1,0	2,4	3,2	1,5
Cocaína base	0,5	0,6	0,3	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,6	0,4	0,7	0,1	0,6	0,8	0,3	0,8	1,4	0,2
Cocaína polvo y/o base	1,2	1,5	0,9	0,5	0,8	0,3	1,1	1,0	1,1	1,1	1,4	0,8	1,5	2,0	1,1	2,8	3,9	1,7

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Notas:

Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2021. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

En ESTUDES no se dispone de la desagregación poblacional de estudiantes según sexo y edad, por eso la tabla se ha calculado utilizando el factor de expansión.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.50.

Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos). España, 2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	169.568	74.507	95.060	37.598	15.040	22.558	49.792	20.913	28.879	42.882	18.961	23.921	32.033	16.006	16.026	7.263	3.588	3.676
Alcohol	311.232	152.531	158.701	81.720	36.308	45.412	101.066	47.627	53.439	77.091	40.533	36.558	42.896	23.528	19.368	8.460	4.535	3.925
Cannabis	155.842	72.615	83.227	20.738	8.864	11.875	39.182	18.260	20.922	46.207	22.743	23.464	39.804	18.386	21.418	9.912	4.363	5.549
Cocaína en polvo	16.573	10.233	6.341	1.319	1.047	272	3.421	1.748	1.672	3.727	2.154	1.573	5.161	3.268	1.893	2.945	2.014	931
Cocaína base	7.963	5.455	2.508	757	422	335	2.277	1.110	1.167	1.737	1.441	297	2.188	1.606	581	1.004	876	128
Cocaína polvo y/o base	19.940	12.630	7.309	1.683	1.285	398	4.305	2.094	2.211	4.563	2.953	1.610	5.977	3.886	2.091	3.411	2.413	999

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Notas:

Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2021. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación y Formación Profesional.


Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

En ESTUDES no se dispone de la desagregación poblacional de estudiantes según sexo y edad, por eso la tabla se ha calculado utilizando el factor de expansión.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.51.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) (%), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal (años), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.52.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.53.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.54.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.55.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 1994-2021.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida														
Total	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9	73,9
Sexo														
Hombre	84,3	84,3	85,5	78,2	75,9	81,5	78,4	80,8	74,9	82,9	77,8	75,7	76,3	71,6
Mujer	84,0	84,1	86,4	77,9	77,2	82,5	80,7	81,7	75,2	84,9	80,1	78,2	79,4	76,3
Edad														
14 años	69,6	67,6	71,5	52,4	52,7	59,2	57,1	62,6	49,7	65,9	60,1	57,1	58,3	53,5
15 años	81,8	81,7	82,5	73,4	70,4	76,6	76,1	78,7	71,5	77,7	73,7	75,4	72,5	68,3
16 años	88,0	88,7	89,7	83,1	81,7	86,9	86,0	86,2	81,6	86,2	84,1	83,1	84,3	78,8
17 años	91,9	91,3	92,8	89,6	89,0	91,9	91,2	90,5	87,8	90,8	90,6	89,9	88,5	86,0
18 años	92,5	93,4	96,2	93,8	92,2	93,8	92,3	92,3	88,6	92,6	92,4	91,9	89,0	87,9

1.2.55. (continuación)

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Últimos 12 meses														
Total	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6	75,9	70,5
Sexo														
Hombre	82,8	82,3	83,0	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3	74,3	74,1	67,8
Mujer	82,7	82,5	84,5	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2	76,9	77,5	73,3
Edad														
14 años	67,7	64,3	67,9	51,5	52,0	57,9	50,9	53,1	48,0	63,1	57,4	55,3	56,1	50,6
15 años	80,4	79,7	80,5	72,7	69,7	75,6	70,9	69,6	70,0	75,3	71,2	73,9	70,2	64,5
16 años	86,7	87,4	88,0	82,4	80,9	85,9	82,1	77,6	80,3	84,2	82,2	82,1	82,5	75,3
17 años	90,7	89,9	90,9	88,7	87,6	91,1	87,4	84,1	86,1	89,2	88,7	88,7	86,7	82,6
18 años	91,1	92,4	94,1	93,3	91,2	93,0	88,2	84,2	86,4	91,3	90,7	90,6	86,9	85,2
Últimos 30 días														
Total	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0	58,5	53,6
Sexo														
Hombre	75,3	66,8	67,5	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9	65,9	57,2	51,5
Mujer	74,9	66,7	68,5	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5	68,1	59,8	55,8
Edad														
14 años	56,7	40,1	43,2	32,1	27,7	38,0	31,7	36,2	38,1	53,2	48,4	46,1	36,0	34,1
15 años	71,8	60,1	62,2	51,8	47,7	57,7	50,7	52,9	58,9	66,0	61,3	64,6	49,9	45,9
16 años	80,0	74,1	73,4	65,7	61,6	71,9	65,3	63,8	70,0	75,6	74,0	73,1	65,3	57,1
17 años	85,1	79,4	81,1	73,7	71,5	78,2	74,2	71,9	74,8	82,4	80,8	81,2	72,9	66,9
18 años	86,2	84,1	85,0	82,7	76,8	81,5	76,5	75,1	77,1	86,4	84,8	84,5	74,7	72,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.56.

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en al vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Edad media de inicio del consumo (años)	13,1	13,8	13,4	13,8	13,7	13,8	13,8	13,9	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0	14,1	14,0	14,0
Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años)	-	-	14,8	14,9	15,0	14,9	15,1	15,0	15,1	14,9	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,3
Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida	84,3	84,0	78,2	77,9	78,4	80,7	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2	76,3	79,4	71,6	76,3
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses	82,8	82,7	77,3	77,3	73,4	76,3	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9	74,1	77,5	67,8	73,3
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días	75,3	74,9	60,4	59,9	58,1	58,0	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1	57,2	59,8	51,5	55,8

H = Hombres, M = Mujeres

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.57.

Incidencia del consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (números absolutos*). España, 2014-2021.

	2014			2016			2019			2021		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	286.000	131.100	154.600	323.900	167.400	156.400	346.600	165.000	181.600	311.200	152.500	158.700

T = Total, H = Hombres, M = Mujeres.

* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2021. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Nota: Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.58.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.59.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	73,9	71,6	76,3	53,5	49,9	57,3	68,3	63,9	72,7	78,8	77,0	80,7	86,0	85,0	87,0	87,9	87,8	88,1
Últimos 12 meses	70,5	67,8	73,3	50,6	46,2	55,0	64,5	59,7	69,1	75,3	73,1	77,6	82,6	81,4	83,9	85,2	84,9	85,6
Últimos 30 días	53,6	51,5	55,8	34,1	29,9	38,3	45,9	43,4	48,5	57,1	55,5	58,8	66,9	65,1	68,8	72,8	72,3	73,3
Diario en los últimos 30 días	1,1	1,3	1,0	0,5	0,5	0,4	0,9	0,9	0,9	1,2	1,1	1,3	1,4	1,8	0,9	2,7	3,4	2,0
Nunca	26,1	28,4	23,7	46,5	50,1	42,7	31,7	36,1	27,3	21,2	23,0	19,3	14,0	15,0	13,0	12,1	12,2	11,9

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.60.

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021.



	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Total	30,0	14,7	22,3	32,2	41,5	48,8	28,5
Hombres	28,6	11,8	20,4	31,5	40,3	47,3	27,0
Mujeres	31,4	17,5	24,1	32,8	42,7	50,3	29,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.61.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Combinados/cubatas	26,0	23,9	28,2	14,0	10,3	17,9	20,3	17,4	23,3	28,8	27,2	30,6	35,4	34,2	36,6	37,9	37,2	38,6
Cerveza/sidra	22,8	23,4	22,2	7,3	7,4	7,3	13,9	13,9	13,8	24,9	25,4	24,4	36,5	37,6	35,3	43,8	44,3	43,2
Licores fuertes	14,5	13,8	15,3	8,1	5,8	10,6	12,3	10,7	14,0	16,5	15,9	17,2	18,2	18,8	17,4	20,8	21,6	19,9
Licores de frutas	6,9	6,5	7,4	4,8	3,6	6,1	5,4	4,6	6,2	7,2	7,3	7,1	9,3	9,2	9,4	8,9	8,5	9,3
Vino/champán	8,1	7,6	8,7	3,6	3,4	3,7	5,3	4,9	5,8	8,4	8,4	8,4	11,8	10,3	13,4	17,1	15,6	18,6
Vermú/jerez/fino	2,0	2,3	1,7	1,2	1,2	1,2	1,4	1,6	1,1	2,1	2,4	1,7	2,6	3,2	2,1	3,8	4,1	3,5
Cualquier bebida alcohólica	30,0	28,6	31,4	14,7	11,8	17,5	22,3	20,4	24,1	32,2	31,5	32,8	41,5	40,3	42,7	48,8	47,3	50,3

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.62.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2010-2021.

	Alguna vez en la vida						Últimos 12 meses						Últimos 30 días					
	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Total	58,8	60,7	50,1	48,9	51,1	48,0	52,9	52,0	42,6	42,4	44,5	39,4	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3	23,2
Sexo																		
Hombres	58,0	59,9	48,7	46,4	48,5	43,8	52,2	51,7	41,5	40,1	42,3	35,4	36,4	31,3	22,3	21,2	23,7	20,8
Mujeres	59,5	61,5	51,4	51,4	53,4	52,4	53,5	52,3	43,7	44,8	46,5	43,6	34,8	30,3	22,1	22,3	25,0	25,6
Edad																		
14 años	27,8	31,5	23,2	23,1	25,8	24,7	24,6	26,1	19,0	18,8	22,2	20,8	16,0	12,7	7,6	7,9	9,7	11,7
15 años	52,2	47,4	39,8	42,4	40,9	36,9	47,3	40,2	33,6	36,1	35,6	30,8	32,0	21,3	14,9	15,8	17,5	16,9
16 años	66,2	62,3	56,5	55,9	57,4	53,4	59,8	53,4	48,8	49,3	50,6	44,5	38,8	30,9	26,4	25,6	27,7	25,9
17 años	76,8	73,1	69,1	69,7	68,6	64,7	69,1	62,6	59,0	61,5	59,9	51,9	46,6	38,8	33,1	33,9	35,6	31,9
18 años	77,8	80,4	74,1	74,7	70,9	71,5	69,8	70,5	63,4	65,4	60,3	58,0	52,8	46,5	37,5	40,4	37,6	35,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.63.


Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.

	HOMBRES						MUJERES					
	14	15	16	17	14-17	18	14	15	16	17	14-17	18
Borracheras alguna vez	18,8	30,8	50,0	61,8	41,7	68,3	30,7	43,0	57,0	67,7	50,6	74,9
Borracheras últimos 12 meses	15,0	24,8	41,1	49,2	33,6	56,3	26,8	36,7	47,9	54,7	42,3	59,8
Borracheras últimos 30 días	7,4	13,6	24,0	30,4	19,6	35,0	16,0	20,2	27,9	33,5	24,8	36,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.64.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 1994-2021.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Borracheras últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en últimos 30 días	21,4	23,0	24,2	36,1	36,1	42,7	44,1	49,6	50,3	40,2	33,1	33,4	42,6	44,5
Borracheras últimos 30 días entre total estudiantes 14-18 años	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3	23,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.65.

Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2016-2021.

	2016		2019		2021	
	Más de una vez al mes*	Menos frecuentemente	Más de una vez al mes*	Menos frecuentemente	Más de una vez al mes*	Menos frecuentemente
Total	8,7	91,3	10,0	90,0	8,7	91,3
Sexo						
Hombres	9,6	90,4	10,4	89,6	8,5	91,5
Mujeres	7,9	92,1	9,7	90,3	8,9	91,1
Edad						
14 años	1,3	98,7	2,4	97,6	2,7	97,3
15 años	5,1	94,9	5,4	94,6	4,7	95,3
16 años	9,7	90,3	11,3	88,7	9,6	90,4
17 años	16,4	83,6	16,8	83,2	14,3	85,7
18 años	20,6	79,4	20,0	80,0	16,3	83,7

* Se ha emborrachado 10 días o más al año.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.66.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2014-2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Borracheras 2014	56,0	55,8	56,3	33,6	29,6	36,9	47,8	46,9	48,6	59,8	58,5	61,1	66,8	67,4	66,2	70,1	71,9	67,9
Borracheras 2016	57,0	55,0	58,9	34,9	29,4	40,2	49,8	47,4	52,1	60,8	59,3	62,1	69,8	69,1	70,5	72,7	72,3	73,2
Borracheras 2019	59,3	58,0	60,5	40,3	34,7	45,1	51,5	48,5	54,1	62,0	61,2	62,8	69,5	70,5	68,6	69,8	69,3	70,4
Borracheras 2021	56,8	53,3	60,1	42,2	33,4	49,7	48,6	42,6	53,7	59,8	57,2	62,4	63,6	61,5	65,7	68,8	67,2	70,4

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.67.

Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2014-2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Borracheras 2014	33,1	34,1	32,3	16,2	13,8	18,1	24,8	24,7	24,9	36,2	36,5	36,0	41,3	42,9	39,8	44,6	47,3	41,5
Borracheras 2016	33,4	33,2	33,5	17,8	15,5	20,1	25,3	23,8	26,8	35,8	35,6	35,9	42,3	44,3	40,4	48,4	48,0	48,7
Borracheras 2019	42,6	42,6	42,6	28,1	23,1	32,4	35,9	34,0	37,7	43,4	44,3	42,6	49,6	51,3	48,1	51,0	52,7	49,1
Borracheras 2021	44,5	41,8	47,0	35,8	26,1	43,5	38,3	32,9	42,8	46,5	44,5	48,4	48,7	48,1	49,4	49,6	49,4	49,8

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.68.


Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.69.

Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años y proporción de los que han hecho binge drinking entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2008-2021.




	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Binge drinking últimos 30 días entre los que han consumido alcohol últimos 30 días	64,4	66,5	56,8	47,3	47,6	55,5	52,6
Binge drinking últimos 30 días entre total estudiantes 14-18 años	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7	32,3	27,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.70.

Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2014-2021.




	2014	2016	2019	2021
Hombres	50,1	49,3	56,7	51,9
Mujeres	44,7	45,9	54,3	53,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.71.

Prevalencia de consumo en atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.



	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Hombres						
No	88,9	81,6	70,7	62,6	75,1	56,8
Sí	11,1	18,4	29,3	37,4	24,9	43,2
Mujeres						
No	79,7	76,3	69,7	61,6	71,5	57,8
Sí	20,3	23,7	30,3	38,4	28,5	42,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.72.

Prevalencia de borracheras, binge drinking y botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años, según sexo (%). España, 2021.

	Total	Hombres	Mujeres
Borracheras en los últimos 30 días	19,2	18,0	20,4
Botellón en los últimos 30 días	22,2	19,6	24,8
Binge drinking en los últimos 30 días	26,7	24,9	28,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.73.

Evolución de la prevalencia de borracheras, binge drinking y botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años (%). España, 2016-2021.

	2016	2019	2021
Borracheras en los últimos 30 días	20,4	23,5	19,2
Botellón en los últimos 30 días	23,0	21,9	22,2
Binge drinking en los últimos 30 días	29,8	31,3	26,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.74.

Evolución de la prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) y de botellón (últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Botellón últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	24,1	22,6	19,4
Borracheras últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3	23,2
Binge drinking últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7	32,3	27,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.75.

Evolución de la prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) y de botellón (últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2008-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.76.

Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol en el último mes, según sexo y edad (%). España, 2014-2021.


		Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
		T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Binge drinking	2014	47,3	50,1	44,7	29,4	29,6	29,3	40,3	41,4	39,3	50,3	52,1	48,7	54,9	58,7	51,0	59,8	64,3	54,3
Binge drinking	2016	47,6	49,3	45,9	30,6	30,2	31,0	41,2	41,1	41,3	49,4	51,6	47,3	55,6	59,0	52,3	67,2	69,3	64,8
Binge drinking	2019	55,5	56,7	54,3	42,3	38,0	46,0	50,9	49,4	52,4	56,4	59,8	53,4	60,6	63,6	58,0	63,5	64,6	62,2
Binge drinking	2021	52,6	51,9	53,4	46,8	37,9	53,7	46,6	43,3	49,5	52,6	53,4	51,9	57,0	57,9	56,0	59,1	60,3	57,7

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.77.

Prevalencia de botellón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.



		14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Hombres	No	90,3	85,1	77,3	77,6	82,0	76,7
	Sí	9,7	14,9	22,7	22,4	18,0	23,3
Mujeres	No	84,7	80,7	77,2	76,9	79,6	79,2
	Sí	15,3	19,3	22,8	23,1	20,4	20,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.78.

Evolución de la prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2016-2021.

	2016		2019		2021	
	Botellón últimos 12 meses	Botellón últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Botellón últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Botellón últimos 30 días
Total	52,0	24,1	51,3	22,6	41,1	19,4
Sexo						
Hombre	50,3	23,3	48,6	22,1	38,7	18,4
Mujer	53,8	25,0	53,8	23,0	43,5	20,5
Edad						
14 años	28,0	9,7	28,4	9,8	26,9	12,5
15 años	47,7	20,5	44,1	16,9	36,9	17,1
16 años	61,1	27,9	59,2	26,9	46,6	22,8
17 años	68,9	35,7	64,2	30,8	48,5	22,8
18 años	68,1	39,1	64,1	32,4	47,3	22,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.79.

Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2021.

	Comprado/conseguido			Consumido		
	Total	14-17 años	18 años	Total	14-17 años	18 años
Supermercados	56,3	53,8	76,4	-	-	-
Bares o pubs	48,2	45,8	67,5	47,4	44,6	70,6
Discotecas	12,8	12,0	19,3	10,7	10,1	15,7
Tiendas de barrio, chinos, quioscos, bodegas	53,9	55,0	45,1	-	-	-
Hipermercados	21,2	19,7	33,2	-	-	-
Casa de otras personas	40,0	40,3	37,9	56,2	56,2	56,5
Casa donde vives	28,6	27,9	34,0	36,5	35,1	48,7
Internet	1,4	1,3	2,2	-	-	-
Venta ambulante	3,7	3,7	4,4	-	-	-
En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos	-	-	-	46,2	47,5	35,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.80.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2021.

	Total	Hombres	Mujeres
Supermercados	56,3	56,8	55,8
Bares o pubs	48,2	47,0	49,2
Tiendas de barrio, "chinos", quioscos, bodegas	53,9	54,2	53,6
Discotecas	12,8	14,2	11,6
Casa de otras personas	40,0	35,7	43,8
Hipermercados	21,2	24,5	18,3
Casa donde vives	28,6	28,9	28,3
Venta ambulante	3,7	4,9	2,7
Internet o venta telefónica	1,4	1,8	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.81.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021.

	Comprado/Conseguido		
	2016	2019	2021
Supermercados	58,0	54,0	56,3
Bares o pubs	54,1	54,0	48,2
Discotecas	43,1	43,6	12,8
Tiendas de barrio, chinos, quioscos, bodegas	53,9	49,9	53,9
Hipermercados	27,2	21,9	21,2
Casa de otras personas	29,1	30,4	40,0
Casa donde vives	20,4	22,0	28,6
Internet	1,1	1,2	1,4
Venta ambulante	5,3	4,4	3,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.82.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2021.

	Total			14-17 años
	Total	Hombres	Mujeres	Total
Tú directamente	59,5	63,0	56,3	55,3
A través de otras personas de 18 años o mayores	47,6	41,5	53,0	51,4
A través de otras personas menores de 18 años	18,2	15,8	20,3	20,2
De otra forma	7,7	8,3	7,2	8,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.83.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2021.

	Total	Hombres	Mujeres
Cualquier bebida alcohólica	30,0	28,6	31,4
Combinados/cubatas	26,0	23,9	28,2
Cerveza/sidra	22,8	23,4	22,2
Licores fuertes	14,5	13,8	15,3
Vino/champán	8,1	7,6	8,7
Licores de frutas	6,9	6,5	7,4
Vermú/jerez/fino	2,0	2,3	1,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.84.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según se hayan emborrachado, hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2021.

	Licores fuertes	Vino	Vermú / Jerez	Licores de frutas	Cerveza	Combinados
Borracheras	45,3	20,7	4,5	17,8	60,6	76,3
Binge drinking	44,1	21,5	5,6	19,1	61,9	73,1
Botellón	43,3	18,3	4,7	17,3	53,8	70,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.85.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.

	Botellón en los últimos 12 meses	Botellón en los últimos 30 días
Total	41,1	19,4
Sexo		
Hombre	38,7	18,4
Mujer	43,5	20,5
Edad		
14 años	26,9	12,5
15 años	36,9	17,1
16 años	46,6	22,8
17 años	48,5	22,8
14 - 17 años	40,5	19,2
18 años	47,3	22,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.86.


Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 30 días y según sexo (%). España, 2021.

	Total		Hombres		Mujeres	
	Sí botellón	No botellón	Sí botellón	No botellón	Sí botellón	No botellón
Borracheras	65,8	13,1	64,9	11,0	66,7	15,3
Binge drinking	71,6	17,3	71,9	15,9	71,3	18,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.87.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.



	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Hombres						
No	77,9	67,7	54,7	52,1	62,1	51,9
Sí	22,1	32,3	45,3	47,9	37,9	48,1
Mujeres						
No	68,2	58,6	52,0	50,9	56,8	53,7
Sí	31,8	41,4	48,0	49,1	43,2	46,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.88.

Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 30 días y según edad (%). España, 2021.

Total		14 años		15 años		16 años		17 años		14-17 años		18 años		
¿HA HECHO BOTELLÓN?														
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Se ha emborrachado														
en los últimos 30 días	65,8	13,1	60,7	4,8	59,4	8,4	65,9	14,2	70,0	20,9	65,0	12,2	75,2	24,5
Ha hecho binge drinking														
en los últimos 30 días	71,6	17,3	67,4	8,2	65,5	11,9	69,7	18,0	77,5	26,1	70,8	16,2	79,7	32,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.89.

Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2021.

	Total		Hombres		Mujeres	
¿HA HECHO BOTELLÓN?						
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Tabaco	56,2	12,6	53,3	10,5	58,9	14,9
Hipnosedantes	17,7	10,6	13,7	7,0	21,4	14,7
Cannabis	43,4	7,3	46,8	7,3	40,4	7,4
Cocaína polvo y/o base	4,0	0,7	5,2	0,9	2,9	0,4
Éxtasis	3,8	0,4	4,8	0,3	2,9	0,4
Anfetaminas	1,8	0,2	2,6	0,3	1,2	0,1
Alucinógenos	2,0	0,3	3,1	0,3	1,1	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.90.

Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2021.

	Total		14 años		15 años		16 años		17 años		14-17 años		18 años	
¿HA HECHO BOTELLÓN?														
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Tabaco	56,2	12,6	49,5	6,6	52,3	9,1	56,5	12,6	59,8	19,2	55,6	11,6	63,1	26,4
Hipnosedantes	17,7	10,6	18,1	8,8	16,8	9,7	17,3	11,0	17,7	12,4	17,4	10,4	21,2	14,2
Cannabis	43,4	7,3	26,2	2,4	35,3	4,4	45,1	7,5	51,6	12,8	42,2	6,5	56,5	18,5
Cocaína polvo y/o base	4,0	0,7	2,1	0,2	3,3	0,4	3,3	0,5	4,8	1,2	3,6	0,6	8,4	2,0
Éxtasis	3,8	0,4	1,9	0,1	2,9	0,4	3,9	0,2	4,9	0,9	3,7	0,4	5,4	0,4
Anfetaminas	1,8	0,2	0,7	0,1	1,4	0,2	2,1	0,1	2,2	0,3	1,8	0,2	2,6	0,4
Alucinógenos	2,0	0,3	1,4	0,0	1,3	0,3	2,0	0,2	2,9	0,5	2,0	0,3	2,0	0,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.91.

Motivos principales por los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años beben alcohol, según sexo (%). España, 2021.

	Total		Hombres		Mujeres	
	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre	Raramente o nunca	Siempre o casi siempre
Es saludable	96,9	3,1	95,1	4,9	98,5	1,5
Para encajar en un grupo o para no sentirte excluido	92,6	7,4	92,5	7,5	92,8	7,2
Para emborracharte	87,0	13,0	88,8	11,2	85,6	14,4
Para desinhibirte o ligar más	81,4	18,6	80,6	19,4	82,1	17,9
Te ayuda cuando te sientes deprimido	71,4	28,6	76,2	23,8	67,5	32,5
Te gusta cómo te sientes	60,0	40,0	60,4	39,6	59,7	40,3
Es divertido o anima las fiestas	29,3	70,7	31,7	68,3	27,3	72,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.92.

Prevalencia de consumo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias según el consumo de alcohol que hayan realizado sus padres (%) España, 2021.

	Alcohol alguna vez en la vida	Alcohol últimos 12 meses	Borracheras últimos 12 meses	Botellón últimos 12 meses	Binge últimos 30 días
Padre					
No ha bebido ningún día	69,7	66,5	36,1	37,3	24,9
Ha bebido algún día aislado	76,8	73,2	43,2	43,3	29,8
Ha bebido sólo los fines de semana	78,2	75,0	42,7	47,3	32,0
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	76,6	73,3	41,9	44,7	28,4
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	73,0	73,0	49,6	50,5	39,3
Madre					
No ha bebido ningún día	66,9	63,2	33,9	33,9	22,8
Ha bebido algún día aislado	75,4	72,4	41,7	43,5	29,2
Ha bebido sólo los fines de semana	77,4	74,2	42,3	45,4	30,8
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	77,1	73,5	42,7	45,2	29,0
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	86,8	83,1	50,0	47,4	40,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.93.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking, borracheras y botellón en la población de estudiantes de 14-18 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (%). España, 2008-2021.

	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Binge drinking							
Últimos 30 días	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7	32,3	27,9
Últimos 30 días/alc 30 días*	64,4	66,5	56,8	47,3	47,6	55,5	52,6
Borracheras							
Últimos 30 días	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8	24,3	23,2
Últimos 30 días/alc 30 días*	49,6	50,3	40,2	33,1	33,4	42,6	44,5
Últimos 12 meses	47,1	52,9	52,0	42,6	42,4	44,5	39,4
Botellón							
Últimos 30 días	–	–	–	25,5	24,1	22,6	19,4
Últimos 12 meses	–	–	–	57,6	52,0	51,3	41,1

* Porcentaje entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.94.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking y borracheras en la población de estudiantes de 14-18 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2008-2021.

	2008		2010		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Binge drinking														
Últimos 30 días	44,7	38,3	38,9	34,5	44,1	39,6	33,4	31,0	32,3	31,0	32,2	32,3	26,3	29,6
Últimos 30 días/alc 30 días*	71,8	61,2	70,7	62,6	59,9	52,3	50,1	44,7	49,3	45,9	56,7	54,3	51,9	53,4
Borracheras														
Últimos 30 días	29,4	28,7	36,4	34,8	31,3	30,3	22,3	22,1	21,2	22,3	23,7	25,0	20,8	25,6
Últimos 12 meses	46,5	47,7	52,2	53,5	51,7	52,3	41,5	43,7	40,1	44,8	42,3	46,5	35,4	43,6


H = Hombres; M = Mujeres.

* Porcentaje entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.95.

Evolución de los lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días que han conseguido bebidas alcohólicas por ellos mismos (%). España, 2016-2021.



	2016	2019	2021
Bares o pubs	64,8	65,7	62,3
Tiendas de barrio, "chinos", quioscos, bodegas	63,4	58,5	63,8
Supermercados	58,8	54,6	58,2
Discotecas	50,1	51,3	15,9
Casa de otras personas	27,7	30,1	40,9
Hipermercados	31,4	25,4	25,1
Casa donde vives	21,6	24,1	30,0
Venta ambulante	6,3	5,4	4,1
Internet o venta telefónica	1,2	1,3	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.96.

Evolución de los lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	Total	14-17	18	Total	14-17	18	Total	14-17	18
Supermercados	58,0	56,2	73,7	54,0	52,4	71,4	56,3	53,8	76,4
Bares o pubs	54,1	52,2	70,5	54,0	52,5	70,4	48,2	45,8	67,5
Discotecas	43,1	40,6	65,6	43,6	42,0	61,0	12,8	12,0	19,3
Tiendas de barrio*	53,9	55,1	43,3	49,9	50,8	39,0	53,9	55,0	45,1
Hipermercados	27,2	25,5	41,9	21,9	21,0	32,6	21,2	19,7	33,2
Casa de otras personas	29,1	29,4	26,3	30,4	30,6	28,4	40,0	40,3	37,9
Casa donde vives	20,4	19,7	26,6	22,0	21,4	28,2	28,6	27,9	34,0
Internet	1,1	1,1	0,8	1,2	1,2	1,3	1,4	1,3	2,2
Venta ambulante	5,3	5,5	4,0	4,4	4,4	3,4	3,7	3,7	4,4
Espacios públicos abiertos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Chinos, quioscos, bodegas. ** Calles, plazas, parques, playas...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.97.

Evolución de los modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021.




	2016	2019	2021
Tú directamente	60,1	60,6	59,5
A través de otras personas de 18 años o mayores	51,7	51,0	47,6
A través de otras personas menores de 18 años	16,8	15,7	18,2
De otra forma	7,7	7,1	7,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.98.

Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2021.



	Total	Hombres	Mujeres
Tú directamente	55,3	59,1	52,1
A través de otras personas de 18 años o mayores	51,4	45,1	56,9
A través de otras personas menores de 18 años	20,2	17,7	22,3
De otra forma	8,3	8,9	7,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.99.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2021.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tú directamente	59,5	63,0	56,3	36,4	36,3	36,4	47,4	49,3	46,0	57,2	61,4	53,4	65,3	69,1	61,7	92,8	91,9	93,7
A través de otras personas de 18 años o mayores	47,6	41,5	53,0	47,9	45,7	49,3	47,5	41,5	52,0	53,5	45,6	60,8	53,4	46,5	59,9	16,7	15,2	18,2
A través de otras personas menores de 18 años	18,2	15,8	20,3	28,5	23,3	31,8	27,8	24,2	30,6	19,5	17,3	21,7	13,0	12,8	13,3	2,2	1,5	3,0
De otra forma	7,7	8,3	7,2	13,8	12,2	14,9	10,6	11,8	9,7	7,9	9,2	6,8	5,2	6,2	4,2	3,5	4,2	2,7

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.100.

Evolución de los modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-17 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.101.

Prevalencia de borracheras, binge drinking, botellón y consumo de alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según los motivos por los que beben alcohol (%). España, 2021.


	Alcohol	Borracheras	Binge drinking	Botellón
Es saludable	3,4	3,1	3,6	3,2
Para encajar en un grupo o para no sentirte excluido	6,8	6,4	6,4	5,7
Para emborracharte	14,1	20,7	17,6	19,6
Para desinhibirte o ligar más	20,4	26,4	23,4	23,9
Te ayuda cuando te sientes deprimido	31,3	38,6	37,0	40,1
Te gusta cómo te sientes	43,5	54,8	50,0	52,7
Es divertido o anima las fiestas	73,9	85,1	79,9	83,9

Se lee: Entre los estudiantes que se han emborrachado en los últimos 30 días el X% ha consumido alcohol porque es divertido.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.102.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2021.



* calles, plazas, parques, playas...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.103.

Evolución de los lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021.



* calles, plazas, parques, playas...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.104.


Comportamientos de ocio y académicos de los estudiantes de 14-18 años que han tomado bebidas energéticas (% de fila). España, 2021.

	Total 14-18 años	Consumidores de bebidas energéticas	Consumidores de bebidas energéticas + alcohol
Pellas	21,4	28,2	38,9
Nota media de suspenso	16,8	21,9	23,2
Repetidor	6,6	9,2	12,0
Dinero para salir	13,7	15,1	18,8
Regreso a las 3 de la madrugada o más tarde tras salir	15,2	19,5	29,6
Salida nocturna 2 o + noches a la semana	27,5	35,6	47,2
Leo libros	60,5	39,4	12,0
Otros hobbies (toco un instrumento musical...)	61,7	41,1	12,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.105.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2021.




	2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M
Bebidas energéticas	49,7	31,4	52,6	32,6	49,7	31,1	50,7	39,0
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	16,0	12,6	16,7	13,2	18,2	13,8	17,5	14,6

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.106.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014-2021.



	2014	2016	2019	2021
Bebidas energéticas	40,4	42,7	40,2	45,0
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	14,3	15,0	16,0	16,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.107.

Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido bebidas energéticas o bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2021.

	Alcohol	Tabaco	Hipnosedantes*	Cannabis	Cocaína**	Éxtasis
Bebidas energéticas	69,4	34,9	9,5	23,2	1,0	1,1
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	100,0	53,8	11,7	39,0	2,4	2,4
Total estudiantes	53,6	23,9	7,5	14,9	0,6	0,6

* Con o sin receta.

** Polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.108.


Prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.109.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.110.


Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.111.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2021.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
14 años	18,0	18,5	19,0	17,2	13,4	14,0	13,8	18,2	12,3	15,6	15,0	14,6	14,4	13,0
15 años	28,4	27,7	27,7	28,1	23,6	24,3	24,1	28,8	21,4	23,3	20,5	26,1	21,9	18,2
16 años	33,9	35,9	33,0	32,2	32,0	29,0	30,6	34,1	29,7	29,1	29,4	28,3	30,7	26,6
17 años	37,0	36,4	37,8	38,8	37,6	40,4	35,5	40,7	35,6	34,6	32,7	35,8	33,6	31,4
18 años	44,4	50,3	49,7	51,6	46,4	48,2	42,1	48,3	40,1	43,2	39,1	48,0	38,0	36,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.112.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Hombres	56,6	58,9	57,4	57,1	54,6	56,6	42,0	42,2	35,6	41,6	36,5	36,3	38,2	35,1
Mujeres	65,1	69,4	68,5	66,7	64,7	64,1	49,8	47,0	43,8	46,1	40,3	40,7	44,3	41,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.113.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2021.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Hombres	30,2	36,0	28,1	33,1	29,6	32,6	31,4	27,3
Mujeres	37,5	40,1	36,4	37,5	33,2	36,9	38,5	34,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.114.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021.



	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	21,2	10,0	14,5	24,2	29,6	33,2
Mujeres	26,7	16,0	21,8	29,3	33,3	40,9

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.115.

Media de cigarrillos consumidos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (nº de cigarrillos). España, 1994-2021.

	Hombres	Mujeres
1994	9,1	7,2
1996	8,3	6,9
1998	7,9	7,0
2000	7,6	6,8
2002	7,8	7,3
2004	8,1	7,5
2006	5,8	5,3
2008	5,1	5,0
2010	5,7	4,8
2012	6,4	6,0
2014	5,8	5,4
2016	6,1	5,5
2019	6,5	5,5
2021	6,8	5,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.116.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.117.


Prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.118.

Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.119.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Encuestados (nº)	21.094	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486	35.369	38.010	22.321
Edad media de inicio de consumo (años)*	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1	14,1	14,1
Edad media de inicio de consumo diario (años)*	–	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6	14,7	14,7
Prevalencia (%) alguna vez en vida	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5	41,3	38,2
Prevalencia (%) últimos 30 días	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3	26,7	23,9
Prevalencia (%) de consumo diario	21,6	23,7	23,1	23	21	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8	9,8	9,0
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº)														
1-5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55,9	63,5	60,2	62,3	59,4
6-10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,7	28,5	30,5	27,9	29,6
>10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,5	8,0	9,3	9,8	10,9
Media de cigarrillos al día	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	5,6	5,8	5,9	6,1

* En fumadores actuales y ex-fumadores (años).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.120.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Encuestados (nº)	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Edad media de inicio de consumo (años)*	13,7	14,1	12,9	13,2	13,0	13,1	13,5	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2	14,1	14,1	14,1	14,1
Edad media de inicio de consumo diario (años)*	–	–	14,4	14,3	14,3	14,2	14,6	14,5	14,6	14,5	14,7	14,6	14,7	14,6	14,8	14,7
Prevalencia (%) alguna vez en vida	56,0	65,1	57,1	66,7	42,0	49,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7	38,2	44,3	35,1	41,5
Prevalencia (%) últimos 30 días	26,0	36,3	27,3	37,1	24,8	30,6	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0	23,9	29,3	21,2	26,7
Prevalencia (%) de consumo diario	17,8	25,4	19,3	27,0	12,5	16,9	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0	9,4	10,3	8,8	9,2
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (%)																
1-5	37,7	47,3	44,4	49,0	61,9	63,0	54,7	57,0	60,6	66,1	56,6	63,5	56,6	67,0	55,1	63,4
6-10	33,8	36,8	34,8	35,2	22,7	27,2	32,4	32,9	30,7	26,5	32,9	28,3	30,9	25,5	30,7	28,6
>10	28,5	15,9	20,8	15,8	15,3	9,8	12,9	10,1	8,7	7,4	10,5	8,1	12,5	7,5	14,2	8,0
Media de cigarrillos al día (nº)	9,1	7,2	7,6	6,8	5,8	5,3	6,4	6,0	5,8	5,4	6,1	5,5	6,5	5,5	6,8	5,4

H = Hombres, M = Mujeres

* En fumadores actuales y ex-fumadores (años).

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.121.

Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2021.

		Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos
Total		28,2	22,5	49,2
Sexo	Hombre	26,2	21,8	52,0
	Mujer	29,8	23,2	47,1
Edad	14 años	31,3	21,9	46,8
	15 años	27,8	21,6	50,6
	16 años	26,8	20,8	52,4
	17 años	26,3	25,3	48,4
	18 años	34,6	21,6	43,8
	14-17 años	27,3	22,7	50,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.122.

Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (números absolutos*). España, 2014-2021.

	2014			2016			2019			2021		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco últimos 12 meses	137.200	60.500	76.500	184.600	87.700	96.900	205.600	89.300	116.300	169.600	74.500	95.100

T = Total, H = Hombres, M = Mujeres


* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2021. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Nota: debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.123.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.124.


Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la prevalencia de consumo de tabaco (%). España, 2021.

	Total de estudiantes	Estudiantes que han fumado alguna vez en la vida	Estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses	Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días	Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado	10,9	42,1	41,4	39,8	39,8
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado	7,7	29,8	30,9	32,9	41,8
No se han planteado dejar de fumar	7,2	28,1	27,7	27,3	18,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.125.


Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.126.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y del riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.127.

Evolución de la prevalencia de consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado tabaco en los últimos 30 días y entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016-2021.

2016			2019			2021		
Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos
Estudiantes de 14 a 18 años que han fumado tabaco en los últimos 30 días								
45,6	10,2	44,2	36,9	14,1	49,0	28,2	22,5	49,2
Estudiantes de 14 a 18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días								
36,1	10,8	53,1	28,4	14,7	56,8	19,9	21,6	58,5

Nota: se lee: entre los que han fumado tabaco, han usado cigarrillos de cajetilla o de liar o de los 2 tipos el X%.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.128.

Evolución de la prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos
Total	45,6	10,2	44,2	36,9	14,1	49,0	28,2	22,5	49,2
Hombres	37,7	12,6	49,7	32,4	14,2	53,4	26,2	21,8	52,0
Mujeres	52,5	8,1	39,3	40,4	14,1	45,5	29,8	23,2	47,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.129.

Evolución del porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro (%). España, 2014-2021.

	2014			2016			2019			2021		
	Profesores	Estudiantes	Otras personas*	Profesores	Estudiantes	Otras personas del centro	Profesores	Estudiantes	Otras personas del centro	Profesores	Estudiantes	Otras personas del centro
Total	54,3	73,9	58,4	42,7	65,8	35,7	43,5	64,7	36,2	39,8	60,0	32,9
Centros públicos	59,5	79,4	62,2	46,9	70,2	38,9	46,9	67,5	39,2	42,6	62,0	34,7
Centros privados	43,1	62,0	50,4	33,5	56,1	29,0	36,1	58,6	30,0	34,0	55,6	29,1

* En 2014 no se especificaba que las otras personas fueran del centro.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.130.

Evolución del porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2016-2021.

2016			2019			2021		
T	H	M	T	H	M	T	H	M
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado								
40,2	37,7	42,5	40,6	38,3	42,5	41,4	40,4	42,1
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado								
30,1	29,8	30,4	30,7	31,0	30,4	30,9	28,8	32,6
No se han planteado dejar de fumar								
29,7	32,6	27,1	28,7	30,6	27,1	27,7	30,8	25,3

T = Total, H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.131.

Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia con la que fumen (%). España, 2021.


	Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días			Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado	39,8	38,9	40,6	39,8	38,0	41,5
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado	32,9	30,6	34,7	41,8	39,8	43,7
No se han planteado dejar de fumar	27,3	30,5	24,7	18,4	22,2	14,7

T = Total, H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.132.

Evolución de la prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan fumado tabaco o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2021.




	Consumo de cannabis 2016		Consumo de cannabis 2019		Consumo de cannabis 2021	
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
Consumo de tabaco últimos 12 meses SÍ	62,8	37,2	64,9	35,1	60,4	39,6
Consumo de tabaco últimos 12 meses NO	7,0	93,0	7,4	92,6	5,5	94,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.133.

Evolución de la prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no en los últimos 12 meses (%). España, 2016-2021.




	Consumo de tabaco 2016		Consumo de tabaco 2019		Consumo de tabaco 2021	
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
Consumo de cannabis últimos 12 meses SÍ	82,5	17,5	82,5	17,5	82,8	17,2
Consumo de cannabis últimos 12 meses NO	17,4	82,6	16,9	83,1	15,5	84,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.134.

Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014-2021.




	2014	2016	2019	2021
Hombres	18,8	22,6	52,4	46,9
Mujeres	15,2	17,5	44,5	41,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.135.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Total	32,4	38,9	48,5	51,7	53,9
Hombres	33,1	40,2	51,3	55,9	58,0
Mujeres	31,7	37,5	45,6	47,4	49,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.136.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2019-2021.



T = Total, H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.137.


Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.138.

Evolución de la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2021.




	Consumo de CE 2016		Consumo de CE 2019		Consumo de CE 2021	
	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
Consumo de tabaco alguna vez en la vida SI	40,9	59,1	77,6	22,4	77,6	22,4
Consumo de tabaco alguna vez en la vida NO	7,0	93,0	27,7	72,3	23,6	76,4

CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.139.

Evolución de la prevalencia del consumo de tabaco alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos o no alguna vez en la vida (%). España, 2016-2021.



CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.140.

Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2021.

	Consumo de cannabis alguna vez en la vida		Consumo de cannabis en los últimos 12 meses		Consumo de cannabis en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido CE alguna vez en la vida	78,7	30,4	81,6	33,2	84,1	37,1
Nunca ha consumido CE	21,3	69,6	18,4	66,8	15,9	62,9

CE = Cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.141.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos según el tipo de cartuchos utilizados, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cigarrillos electrónicos y según sexo y edad (%). España, 2021.

	Total	Sexo		Edad				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Cartuchos con nicotina	14,9	12,7	17,5	9,7	11,2	15,2	17,7	22,4
Cartuchos sin nicotina	60,7	65,3	55,4	70,4	67,1	59,7	54,6	52,0
De los 2 tipos	24,4	22,0	27,2	20,0	21,7	25,1	27,7	25,6

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.142.

Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2021.

	Consumo de tabaco alguna vez en la vida		Consumo de tabaco en los últimos 12 meses		Consumo de tabaco en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido CE con nicotina	37,3	4,1	40,5	6,2	44,5	8,0
Ha consumido CE sin nicotina	61,4	20,4	61,5	24,6	61,8	27,7

CE = Cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.143.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años, según sexo (%). España, 2019-2021.

	2019			2021		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar	4,4	5,0	3,8	3,5	4,0	2,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.144.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de estudiantes de 14-18 años que ha fumado cigarrillos electrónicos, según sexo (%). España, 2019-2021.

	2019			2021		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar entre los que fuman cigarrillos electrónicos	9,7	10,2	9,1	8,5	9,3	7,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.145.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de cigarrillos electrónicos y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2021.

		Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
		Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	Muchos/bastantes problemas	91,8	95,6
Fumar hachís/marihuana (cannabis) alguna vez (una vez al mes o menos)	Muchos/bastantes problemas	44,1	59,3
Fumar hachís/marihuana (cannabis) habitualmente	Muchos/bastantes problemas	84,4	92,3
Fumar cigarrillos electrónicos alguna vez (una vez al mes o menos)	Muchos/bastantes problemas	16,2	28,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.146.

Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2021.

		Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
		Sí	No
Disponibilidad percibida del tabaco	Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	95,5	88,2
Disponibilidad percibida del cannabis	Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	76,0	46,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.147.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.148.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.

Total				14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
T	H	M		T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	19,6	15,3	24,1	15,9	11,6	20,3	17,6	13,5	21,6	20,3	15,9	24,8	22,0	17,2	26,9	19,1	14,8	23,6	26,0	21,7	30,7
Últimos 12 meses	13,6	9,7	17,6	11,4	7,6	15,2	12,4	8,9	15,8	14,0	9,8	18,3	15,0	10,4	19,8	13,3	9,3	17,4	17,4	14,0	21,0
Últimos 30 días	7,5	5,0	10,0	6,6	4,4	8,8	6,8	4,6	9,0	7,4	4,7	10,3	8,2	5,4	11,1	7,3	4,8	9,9	9,4	7,1	11,9

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.149.

Prevalencia del consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.




H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.150.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.151.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

1.2.152.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	10,3	7,8	12,9	7,6	4,9	10,3	8,9	6,4	11,3	10,9	7,9	14,0	12,1	9,7	14,5	10,0	7,4	12,7	13,7	12,1	15,4
Último año	7,2	5,1	9,4	5,8	3,5	8,2	6,3	4,2	8,4	7,6	5,1	10,2	8,3	6,1	10,5	7,1	4,8	9,4	9,3	8,5	10,2
Último mes	3,6	2,6	4,7	3,0	1,7	4,2	3,5	2,3	4,6	3,4	2,3	4,6	4,1	3,0	5,3	3,5	2,4	4,7	4,6	4,8	4,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.


FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.153.

Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,6	14,4	14,3	14,7	13,8	14,4	14,3	14,8	13,8	14,5	13,5	14,2	14,1	14,3	14,3	14,4
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	4,8	7,4	5,2	8,6	5,8	9,2	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8	6,8	10,3	7,8	12,9
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	3,2	5,6	3,5	6,6	3,7	5,8	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7	4,7	7,4	5,1	9,4
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	1,9	3,3	1,7	3,4	2,0	2,8	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3	2,2	3,5	2,6	4,7

PREVALENCIA ALGUNA VEZ EN LA VIDA




H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.154.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.155.

Características del consumo de hipnosedantes sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Encuestados (nº)	21.094	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486	35.369	38.010	22.321
Edad media de inicio en consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	14,6	14,2	14,0	14,3	14,4
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta														
Alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0	8,6	10,3
Últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4	6,1	7,2
Últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6	2,9	3,6

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.156.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.157.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2019-2021.

	2019	2021
Alguna vez en la vida	2,2	1,7
Últimos 12 meses	1,5	0,9
Últimos 30 días	0,5	0,3
Edad media de inicio en el consumo	15,2	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.158.


Prevalencia de consumo de analgésicos opioides entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021.

	Total	Hombres	Mujeres
Alguna vez en la vida	1,7	2,2	1,2
Últimos 12 meses	0,9	1,2	0,6
Últimos 30 días	0,3	0,4	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.159.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%) y edad media de inicio del consumo (años). España, 1994-2021.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alguna vez en la vida	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1	33,0	28,6
Últimos 12 meses	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3	27,5	22,2
Últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3	19,3	14,9
Edad media de inicio del consumo	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8	14,9	14,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.160.


Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016-2021.

	2016	2019	2021	
	Total	Total	Total	Hombres Mujeres
Tipo de consumo de cannabis				
Principalmente marihuana (hierba)	51,1	43,8	49,8	47,7 52,2
Principalmente hachís (resina, chocolate)	12,2	19,3	16,7	15,3 18,4
De los 2 tipos	36,7	37,0	33,5	37,1 29,4
Mezcla de cannabis con tabaco				
Sí	82,4	87,1	87,7	86,4 89,2
No	17,6	12,9	12,3	13,6 10,8
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis	3,4	3,4	3,3	3,7 2,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.161.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.



		14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Alguna vez en la vida	Hombre	11,0	19,4	32,6	42,3	51,5	27,4
	Mujer	12,4	19,7	29,4	41,2	48,5	26,3
Últimos 12 meses	Hombre	7,9	15,5	26,2	32,0	39,3	21,3
	Mujer	9,9	16,3	23,9	31,2	33,7	20,8
Últimos 30 días	Hombre	6,0	10,1	18,2	22,3	28,2	14,7
	Mujer	6,5	10,2	15,6	20,2	22,0	13,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES).

1.2.162.

Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (números absolutos*). España, 2014-2021.

	2014			2016			2019			2021		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	146.300	72.400	73.800	170.000	88.900	81.100	222.200	109.600	112.600	155.800	72.600	83.200

T = Total, H = Hombres, M = Mujeres.

* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2021. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Nota: debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.


FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.163.

Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Edad media inicio consumo (años)	15,1	15,2	14,8	15,0	14,5	14,6	14,8	15,0	14,8	14,9	14,8	14,9	14,9	15,0	14,8	14,9
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	23,8	18,0	36,2	30,1	38,0	34,6	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9	34,5	31,5	29,2	27,9
Prevalencia (%) últimos 12 meses	21,2	15,2	32,2	25,2	31,6	28,2	29,7	23,3	28	23,0	28,1	24,4	29,2	25,9	22,6	21,8
Prevalencia (%) últimos 30 días	15,1	9,8	24,5	16,9	22,3	18,0	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9	21,5	17,3	15,7	14,1
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																
Nunca	84,9	90,2	75,5	83,1	77,7	82,0	81,1	86,7	83,1	87,9	84,2	88,2	82,3	86,6	87,6	89,1
1 a 2 días	6,9	5,1	8,6	8,8	7,4	7,4	7,1	6,2	6,5	6,0	5,7	5,5	7,0	6,5	5,1	5,4
3 a 5 días	3,0	2,1	4,7	3,5	5,3	4,8	3,9	3,0	3,9	2,8	3,6	2,7	3,8	3,1	2,6	2,2
6 a 9 días	2,1	1,4	3,1	1,9	2,5	1,8	2,1	1,3	2,0	1,1	1,8	1,3	1,5	1,2	1,2	1,0
10 a 19 días	1,5	0,6	3,5	1,3	2,9	1,8	2,0	1,3	1,9	1,2	1,9	1,1	2,1	1,2	1,3	1,2
20 a 29 días	1,5	0,6	4,7	1,4	4,2	2,2	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3	3,3	1,4	2,1	1,1

PREVALENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS ALGUNA VEZ EN LA VIDA (%)



H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.164.


Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016-2021.

	2016	2019	2021	
	Total	Total	Total	Hombres Mujeres
En forma de porro o canuto	97,7	98,9	91,4	90,8 91,9
Usando pipas de agua, bongos, cachimbas, shishas	17,9	11,9	10,3	14,3 5,8
Por vía oral: pasteles, galletas...	5,7	2,0	1,4	2,0 0,7
Usando cigarrillos electrónicos	1,8	5,4	5,3	6,7 3,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).).

1.2.165.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días y según sexo (%). España, 2021.



	Hombre	Mujer
No han consumido cannabis nunca	1,4	1,4
Consumo cannabis últimos 12 meses	30,9	32,7
Consumo cannabis últimos 30 días	36,4	40,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).).

1.2.166.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES).

1.2.167.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal, entre los estudiantes de 14 a 18 años que no lo han probado nunca, según sexo (%). España, 2016-2021.

	2016	2019	2021	
	Total	Total	Total	Hombres Mujeres
Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías?				
Sí	12,5	15,4	18,2	16,8 19,6
No	87,5	84,6	81,8	83,2 80,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.168.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.169.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.170.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.171.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis a diario en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.172.

Número medio de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y edad (número de porros). España, 2016-2021.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
2016	3,4	3,8	3,0	3,5	3,8	3,3	3,6	4,0	3,1	3,4	3,7	3,0	3,4	3,7	2,9	3,4	3,8	3,0	3,3	3,8	2,7
2019	3,4	3,8	2,9	3,1	3,8	2,5	3,5	4,1	2,7	3,6	4,1	3,0	3,5	3,6	3,2	3,5	3,9	3,0	2,9	3,2	2,3
2021	3,3	3,7	2,7	3,0	3,5	2,6	3,1	3,8	2,5	3,1	3,3	2,8	3,3	3,9	2,6	4,0	4,5	3,5	3,2	3,6	2,7

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.173.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que han consumido una cantidad media de porros al día por término medio en los últimos 30 días y número de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (% y número de porros). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
De 1 a 2 porros	58,0	54,2	63,0	62,6	57,1	69,2	62,4	56,6	69,1
De 3 a 4 porros	21,2	21,7	20,6	18,7	20,1	17,1	19,6	21,8	17,0
5 porros o más	20,8	24,2	16,4	18,7	22,8	13,7	18,0	21,6	13,9
Número medio de porros	3,4	3,8	3,0	3,4	3,8	2,9	3,3	3,7	2,7

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.174.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis (%). España, 2016-2021.


	Total población	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en los últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4)
2016	8,8	1,0	29,7	35,4	67,4
2019	9,8	1,4	30,3	35,2	66,5
2021	9,0	1,4	31,8	38,2	65,7

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.175.

Evolución de la distribución en el orden de las edades de inicio en el consumo de cannabis y tabaco* (%). España, 2002-2021.



	2002	2006	2010	2014	2016	2019	2021
Se inician antes en el consumo de cannabis	4,6	3,8	3,8	7,4	9,4	6,7	7,5
Se inician en el mismo año las dos sustancias	20,0	24,1	25,7	35,0	39,6	38,0	37,5
Se inician antes en el consumo de tabaco	75,4	72,1	70,4	57,6	51,0	55,3	55,0


* Se debe clasificar a cada una de las personas que han iniciado el consumo de tabaco y cannabis, en función de que:

- Hayan iniciado primero el cannabis (edad más temprana).
- Hayan iniciado primero el tabaco (edad más temprana).
- Hayan iniciado con la misma edad las dos sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.176.

Consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la posible legalidad del consumo de hachís o marihuana (%). España, 2021.




	No probaría el cannabis si fuera legal	Sí probaría el cannabis si fuera legal
Nunca ha consumido tabaco	85,2	62,8
Ha consumido tabaco alguna vez en la vida	14,8	37,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.177.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que afirman que probarían o no hachís o marihuana si fuese legal. España, 2016-2021.



	2016	2019	2021
Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías?			
No	60,1	56,5	58,2
Sí	8,6	10,3	13,0
Ya lo he probado	31,3	33,2	28,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.178.

Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y botellón en los últimos 12 meses y número de drogas consumidas en los últimos 30 días entre la población de estudiantes de 14 a 18 años y entre los consumidores de cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2021.


	Total población 14-18 años			Consumidores de cannabis últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M
4 drogas o más	10,3	9,6	11,1	15,3	13,2	17,7
2 drogas	18,2	16,0	20,5	20,1	21,0	19,1
3 drogas	17,8	17,0	18,7	60,7	61,2	60,2
Borracheras	23,2	20,8	25,6	63,3	62,0	64,7
Binge drinking	27,9	26,3	29,6	67,3	68,3	66,1
Botellón	41,1	38,7	43,5	81,8	82,8	80,7

T = Total, H = Hombres, M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.179.

Evolución del % de THC (tetrahidrocannabinol) presente en cannabis según el tipo de presentación analizada; THC contenido en la resina de cannabis y THC contenido en la hierba de cannabis o marihuana. España, 2002-2021.



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
%THC contenido en la resina	12,4	11,9	13,1	11,8	9,8	11,3	11,1	12,8	14,1	15,3
%THC contenido en la hierba	4,5	5,3	7,9	7,3	7,9	7,9	7,8	7,7	9,4	11,2
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
%THC contenido en la resina	14,9	14,5	14,8	17,1	17,7	17,8	22,4	26,4	28,9	29,9
%THC contenido en la hierba	11,0	10,8	10,7	11,6	10,2	10,1	10,7	13,6	12,0	13,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.180.

Porcentaje y estimación de consumidores problemáticos de cannabis (según escala CAST) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2021.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Población de estudiantes de 14 a 18 años (en miles) con puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático)	52.468	55.025	78.572	65.239	37.238	43.844	55.387	51.788
Porcentaje entre la totalidad de estudiantes de 14 a 18 años	3,3	3,7	4,6	3,8	2,5	2,8	3,4	3,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.181.

Categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2021.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Puntuación CAST 0-1	66,0	67,1	64,8	65,2	69,5	69,5	65,4	63,2
Puntuación CAST 2-3	20,7	18,6	19,9	18,7	16,7	17,2	19,2	19,0
Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático)	13,3	14,3	15,3	16,1	13,8	13,3	15,4	17,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.182.

Características de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST≥4) en la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2021.


		Total	Hombres	Mujeres
Consumo cannabis últimos 30 días	Principalmente marihuana	29,3	29,7	28,8
	Principalmente hachís	20,1	20,1	20,1
	De los 2 tipos	50,6	50,3	51,1
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días	Sí	87,0	85,6	89,1
	No	13,0	14,4	10,9
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis (nº)		5,1	5,3	4,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.183.

Categorización de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST, según sexo y edad (%). España, 2021.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.184.

Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días entre el total de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y según la clasificación de los estudiantes en la escala CAST (%). España, 2021.

	Total estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años	Clasificación CAST de los consumidores de cannabis en los últimos 12 meses	
		Consumidores problemáticos	Puntuación CAST <4
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	23,2	75,6	56,1
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	27,9	75,2	60,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.185.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2021.

	Total estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años	Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)	Consumo de cannabis últimos 12 meses con una puntuación en la escala CAST<4
Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días			
Sí	9,0	65,7	29,0
No	91,0	34,3	71,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.186.

Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2021.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.187.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2006-2021.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.188.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad (%). España, 2012-2021.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
2012	1,1	1,9	3,6	5,2	6,4
2014	0,6	1,8	3,1	3,6	4,9
2016	0,9	2,3	3,1	4,4	6,3
2019	0,9	2,5	3,9	4,9	6,0
2021	0,8	1,8	2,9	4,9	6,9

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.189.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) (%) España, 2016-2021.

		2016	2019	2021
Tipo de consumo de cannabis	Principalmente marihuana (hierba)	30,7	23,2	29,3
	Principalmente hachís (resina, chocolate)	11,2	19,7	20,1
	De los 2 tipos	52,9	57,1	50,6
Mezcla de cannabis con tabaco	Sí	90,6	87,1	87,0
	No	9,4	12,9	13,0
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis		5,4	5,8	5,1

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.190.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4), según sexo y edad (%). España, 2016-2021.

Total			Total		14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
2016	2019	2021	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
En forma de porro o canuto																			
93,8	92,2	99,2	99,0	99,4	96,9	93,7	100,0	99,5	99,0	100,0	98,9	99,8	97,3	99,1	98,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas																			
25,4	21,2	17,4	21,5	11,2	30,8	38,5	23,1	16,9	24,0	9,2	16,2	18,4	12,4	17,0	21,9	9,9	16,7	20,1	10,3
Por vía oral: pasteles, galletas...																			
9,5	8,8	7,0	8,6	4,5	10,7	21,5	0,0	9,7	12,1	7,1	5,2	4,8	5,8	6,9	10,1	2,1	6,7	6,1	7,8
Usando cigarrillos electrónicos																			
4,1	3,5	2,2	3,2	0,7	2,7	0,0	5,5	2,9	3,7	2,0	2,1	3,2	0,0	2,3	3,8	0,0	1,5	2,2	0,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test. T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.191.

Características de la forma de consumo de cannabis entre los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) y entre la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2021.

	Consumidores de cannabis últimos 12 meses			Consumidores problemáticos cannabis (CAST ≥ 4)		
	T	H	M	T	H	M
De los 2 tipos	33,5	37,1	29,4	50,6	50,3	51,1
Marihuana	49,8	47,7	52,2	29,3	29,7	28,8
Hachís	16,7	15,3	18,4	20,1	20,1	20,1
Porro	97,6	96,9	98,5	89,1	88,1	90,7
Cachimbos	11,0	15,2	6,2	15,7	19,1	10,2
Vía oral	5,7	7,1	4,0	6,3	7,6	4,1
Cigarrillos electrónicos	1,4	2,1	0,7	2,0	2,8	0,6

CAST = Cannabis Abuse Screening Test. T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.192.

Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y botellón en los últimos 12 meses y número de drogas consumidas entre la población de estudiantes de 14 a 18 años y entre los consumidores problemáticos de cannabis (CAST ≥ 4) (%). España, 2021.

	Total población 14-18 años			Consumidores problemáticos de cannabis (CAST ≥ 4)		
	T	H	M	T	H	M
Borracheras últimos 30 días	23,2	20,8	25,6	75,6	76,1	74,8
Binge drinking últimos 30 días	27,9	26,3	29,6	75,2	78,5	70,0
Botellón últimos 12 meses	41,1	38,7	43,5	86,7	87,3	85,8
2 drogas	18,2	16,0	20,5	0,5	0,5	0,5
3 drogas	17,8	17,0	18,7	30,6	32,2	28,2
4 o más drogas	10,3	9,6	11,1	68,8	67,3	71,3

CAST = Cannabis Abuse Screening Test. T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.193.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2021.

	Total población 14-18 años	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en los últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)
Alcohol	70,5	60,4	97,9	97,8	99,1
Tabaco	30,7	13,0	82,8	85,4	94,3
Hipnosedantes*	13,6	10,0	23,8	25,9	37,5
Analgésicos opioides	0,9	0,1	3,5	4,8	12,2
Otras drogas ilegales**	3,5	0,3	14,0	18,3	42,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Otras drogas ilegales: Cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.194.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.195.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.196.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.197.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.198.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la forma de presentación (%). España, 2021.

	Cocaína polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base
Alguna vez en la vida	2,3	1,2	2,7
Últimos 12 meses	1,9	0,8	2,1
Últimos 30 días	0,5	0,2	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.199.

Incidencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (números absolutos*). España, 2014-2021.

	2014			2016			2019			2021		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	24.700	13.800	10.900	21.500	13.700	7.800	21.800	14.200	7.700	19.900	12.600	7.300

T = Total, H = Hombres, M = Mujeres.

* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2021. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Nota: debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.200.

Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Edad media inicio consumo (años)	15,7	15,5	16,0	15,6	15,4	15,4	15,5	15,5	14,9	15,1	15,1	15,0	15,2	15,3	15,3	15,4
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	3,1	1,9	8,4	4,5	6,8	4,7	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2	3,9	1,9	3,4	1,9
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,3	1,2	6,4	3,1	5,2	3,1	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6	3,2	1,7	2,7	1,5
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,4	0,7	3,4	1,5	3,1	1,6	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5	1,3	0,6	0,9	0,3

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.201.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante el consumo de cocaína en polvo habitual y de la disponibilidad de cocaína en polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.202.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.203.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2006-2021.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alguna vez en la vida	2,6	2,4	2,0	2,2	2,7	1,7	1,2	1,2
Últimos 12 meses	1,9	1,8	1,3	1,6	2,1	1,2	1,0	0,8
Últimos 30 días	1,1	1,0	0,9	1,1	1,4	0,5	0,4	0,2
Edad media de inicio del consumo	15,0	15,0	14,6	15,2	14,8	14,6	15,1	14,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.204.

Prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alguna vez en la vida	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3	2,6	3,1
Últimos 12 meses	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9	1,8
Últimos 30 días	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6	0,7	0,6
Edad media de inicio del consumo	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2	15,4	15,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.205.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021.




	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	3,1	1,8	0,6
Hombres	3,4	2,1	0,8
Mujeres	2,8	1,5	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.206.

Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021.




	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Total	3,1	1,0	2,0	3,1	4,9	6,3
Hombres	3,4	0,9	1,8	4,0	4,8	8,3
Mujeres	2,8	1,0	2,2	2,2	4,9	4,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.207.

Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Edad media inicio consumo (años)	15,7	15,5	15,9	15,4	15,4	15,5	15,9	15,6	15,3	15	15,3	15,1	15,6	15,3	15,5	15,3
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,7	2,5	7,6	4,8	4,2	2,5	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9	3,1	2,1	3,4	2,8
Prevalencia (%) últimos 12 meses	4,2	2,2	6,4	3,9	3,2	1,7	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1	2,4	1,4	2,1	1,5
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,4	3,8	1,7	2,1	0,7	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3	0,9	0,4	0,8	0,4



H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.208.


Prevalencia del consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.209.

Prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alguna vez en la vida	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5	1,4
Últimos 12 meses	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1	0,9
Últimos 30 días	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,4
Edad media de inicio del consumo	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1	15,4	15,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.210.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	1,4	0,9	0,4
Hombres	1,9	1,2	0,6
Mujeres	1,0	0,6	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.211.

Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2021.




FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.212.

Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Edad media inicio consumo (años)	15,5	15,4	15,7	15,3	15,6	15,5	15,6	15,2	15,1	15,4	15,1	15,0	15,4	15,4	15,4	15,2
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	5,3	3,1	5,7	3,3	4,2	2,7	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2	2,0	1,1	1,9	1,0
Prevalencia (%), últimos 12 meses	4,4	2,5	4,6	2,4	3,3	2,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,2	0,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,6	2,5	1,4	2,0	1,0	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,6	0,1



H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.213.


Prevalencia del consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.214.


Prevalencia del consumo de alucinógenos (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.215.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.216.

Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.217.

Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Edad media inicio consumo (años)	15,4	15,4	15,6	15,3	15,5	15,5	15,5	15,2	14,1	13,8	15	15,4	15,2	15,2	15,6	15,5
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	6,7	3,6	7,2	4,4	5,7	2,7	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1	2,7	1,2	2,3	1,1
Prevalencia (%) últimos 12 meses	5,7	3,1	5,5	2,9	4,1	1,6	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6	2	0,8	1,4	0,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	3,6	1,7	2,6	1,3	2	0,7	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,1


H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.218.

Prevalencia de consumo de setas mágicas (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2010-2021.



	2010	2012	2014	2016	2018	2021
Alguna vez en la vida	2,1	2,2	1,3	1,4	1,7	1,3
Últimos 12 meses	1,6	1,4	0,8	0,9	1,1	0,8
Últimos 30 días	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4	0,2
Edad media de inicio del consumo	-	-	-	15,0	15,2	15,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.219.


Prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.220.

Prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.221.

Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Edad media inicio consumo (años)	14,4	14,1	15,5	15,1	14,5	14,7	14,7	13,8	14,1	13,8	13,7	14,6	14,4	14,7	14,6	15,0
Prevalencia(%) alguna vez en la vida	0,7	0,3	0,8	0,3	1,5	0,5	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5	1,0	0,4	0,8	0,2
Prevalencia (%) últimos 12 meses	0,5	0,2	0,7	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,5	0,2
Prevalencia (%) últimos 30 días	0,4	0,1	0,5	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,5	0,2	0,6	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0


H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.222.

Percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2021.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2021
Riesgo percibido	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4	97,3	97,0
Disponibilidad	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4	21,2	20,2	16,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.223.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 1994-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.224.

Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Edad media inicio consumo (años)	13,8	12,4	14,0	13,7	13,8	13,4	13,8	12,6	13,9	14,0	13,9	13,7	14,7	14,3	15,0	14,7
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,1	2,1	5,7	3,0	4,2	2,0	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9	1,9	1,5	1,9	1,7
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,5	1,3	3,3	1,8	2,7	1,1	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4	1,3	0,8	1,2	0,9
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,5	0,8	1,8	1,1	1,7	0,6	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2	0,6	0,4	0,6	0,3


H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.225.

Prevalencia de consumo de GHB (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2021.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alguna vez en la vida	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	0,6	0,4
Últimos 12 meses	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3
Últimos 30 días	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2
Edad media de inicio consumo	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2	14,4	15,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.226.

Evolución de la prevalencia de consumo de GHB alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2021.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Hombres	1,8	1,6	1,5	1,9	1,3	0,8	0,7	0,6
Mujeres	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.227.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. España, 2010-2021.




	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alguna vez en la vida	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6	1,5
Últimos 12 meses	0,6	0,7	0,5	1,0	1,2	0,9
Últimos 30 días	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3
Edad media de inicio del consumo	-	-	-	15,1	15,2	15,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.228.

Prevalencia del consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2021.




	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Hombres	1,2	1,3	1,1	1,7	1,9	1,8
Mujeres	0,5	0,6	0,4	1,0	1,3	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.229.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2012-2021.




	2012	2014	2016	2019	2021
Alguna vez en la vida	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
Últimos 12 meses	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Edad media inicio consumo	-	-	14,3	14,5	14,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.230

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.231.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad. (%). España, 2021.


Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
6,5	6,2	6,9	4,7	4,0	5,4	5,9	5,4	6,3	6,5	6,2	6,8	7,5	7,0	8,0	10,2	11,3	9,1	6,2	5,8	6,7

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.232.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2019-2021.



Nota: Las sustancias estimulantes utilizadas con el fin de mejorar el rendimiento en los estudios no incluyen: refrescos de cola, café, té, complejos vitamínicos, bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...), productos que contienen: Ginkgo Biloba, Guaraná, Ácidos grasos Omega 3, Jalea real, Acetil L-carnitina (ALC), fosfatidilserina...).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.233.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido este tipo de sustancias estimulantes alguna vez en la vida (%). España, 2016-2021.

	2016	2019	2021
Cocaína	24,4	25,0	22,2
Metilfenidato (Concerta®, Rubifen®, Medikinet®, Equasym®, Medicebran®, Ritalín®)	18,0	20,7	17,2
Anfetaminas o speed (anfetás, metanfetamina, ice)	15,6	16,6	17,8
Piracetam (Nootropil®, Ciclofalina®, Anacervix®), Aniracetam	11,3	10,6	13,6
Lisdexanfetamina dimesilato (Elvanse®), dextroanfetamina (Adderall®)	7,8	9,5	8,1
Donepezilo (Aricept®, Donebrain®)	6,9	6,2	7,3
Cafeína (Durvitan®)	8,4	5,9	7,5
Modafinilo (Modiodal®, Provigil®)	7,6	5,5	6,2

* Calculado sobre los estudiantes que han consumido alguna vez en la vida sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.234.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales*, borracheras, tabaco y consumo problemático de cannabis en los últimos 12 meses y binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida y entre el total de los estudiantes de 14 a 18 años (%). España, 2021.

	Sust. psicoactivas legales últimos 12 meses	Borracheras últimos 12 meses	Binge drinking últimos 30 días	Tabaco últimos 12 meses	Sust. psicoactivas ilegales últimos 12 meses	Consumo problemático cannabis (CAST $\geq$ 4)
Total estudiantes 14-18 años	74,0	39,4	27,9	30,7	29,5	3,0
Estudiantes que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio	92,6	60,7	51,6	57,7	60,2	13,9

* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes. Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.235.

Modo de obtención de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 que han consumido sustancias estimulantes (%). España, 2016-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.236.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2014-2021.



	2014	2016	2019	2021
Hombres	4,8	4,7	2,9	2,3
Mujeres	3,3	4,3	1,9	1,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.237.

Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo (%). España, 2021.

	Total	Hombres	Mujeres
Nuevas sustancias	2,0	2,3	1,6
Ketamina	0,7	0,9	0,4
Spice	0,6	0,8	0,5
Mefedrona	0,3	0,4	0,2
Salvia divinorum	0,3	0,4	0,1
Ayahuasca	0,4	0,6	0,1


Nuevas sustancias psicoactivas: Son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.238.

Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2021.

	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida						Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses					
	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Ketamina	1,1	1,1	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,7	0,5	0,3	0,4	0,4
Spice	1,1	1,4	0,8	0,9	0,8	0,6	0,8	1,0	0,6	0,7	0,5	0,5
Mefedrona	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2
Salvia	-	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	-	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Ayahuasca	-	-	-	-	0,4	0,4	-	-	-	-	0,3	0,3



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.239.

Forma de obtención de nuevas sustancias psicoactivas entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2021.

	2014	2016	2018	2021
Me la ofreció un amigo	55,0	53,7	54,8	43,0
A través de un vendedor (camello)	45,0	34,5	46,7	44,6
Me la ofrecieron en una fiesta, en un pub, en un bar	23,1	27,3	29,4	23,3
A través de internet	6,2	5,3	12,1	11,9
Las compré en una tienda especializada (smart shop o head shop)	8,0	6,4	9,1	12,8
Otros sitios	15,9	5,8	5,9	6,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.240.

Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo. España, 2014-2021.

	2014			2016			2019			2021		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
NUNCA han oído hablar de nuevas sustancias	53,7	55,8	51,8	46,3	46,9	45,8	54,4	53,6	55,0	53,7	54,1	53,3

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.241.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2012-2021.

	2012	2014	2016	2019	2021
Ketamina	68,2	82,2	77,2	74,5	76,3
Spice	72,4	82,7	77,7	74,8	75,0
Mefedrona	74,8	83,0	75,9	72,9	73,5
Salvia divinorum	71,2	78,8	71,5	69,8	70,0
Ayahuasca	-	-	-	69,0	67,0

* Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.242.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido o no la sustancia alguna vez en la vida (%). España, 2016-2021.

	2016		2019		2021	
	Riesgo percibido		Riesgo percibido		Riesgo percibido	
	Sí consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia	Sí consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia	Sí consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia
Consumir ketamina alguna vez	46,3	77,7	48,0	75,2	41,5	77,2
Consumir spice alguna vez	46,0	78,7	47,9	75,8	50,4	75,8
Consumir mefedrona alguna vez	55,3	76,3	56,7	73,3	48,3	74,0
Consumir salvia divinorum alguna vez	54,8	76,2	56,2	70,2	12,8	70,6
Consumir ayahuasca alguna vez	-	-	42,8	69,6	27,0	67,6

* Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.243.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias psicoactivas, según hayan consumido o no la sustancia alguna vez en la vida (%). España, 2016-2021.

	2016		2019		2021	
	SÍ consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia	SÍ consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia	SÍ consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia
Consumir ketamina alguna vez	32,5	16,3	42,2	14,9	46,4	13,5
Consumir spice alguna vez	30,4	16,0	41,4	14,3	38,5	13,5
Consumir mefedrona alguna vez	41,8	15,4	31,5	14,8	34,4	13,6
Consumir salvia divinorum alguna vez	23,9	15,9	36,2	16,4	54,0	15,2
Consumir ayahuasca alguna vez	-	-	40,3	17,2	52,0	18,0


* Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.244.

Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga). España, 2010-2021.



	2010	2012	2014	2016	2018	2021
Ketamina	40,2	41,9	38,8	51,5	54,8	52,3
Spice	39,8	42,6	41,4	53,7	55,3	51,5
Mefedrona	30,9	33,9	35,4	46,0	47,4	41,3
Salvia divinorum	-	37,5	37,7	48,5	45,2	38,5
Ayahuasca	-	-	-	-	45,2	39,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.245.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2021.

	Sí consumen esa sustancia						NO consumen esa sustancia					
	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Ketamina	83,6	74,4	76,8	75,0	72,0	74,5	39,4	41,0	38,2	51,0	54,4	51,8
Spice	79,1	73,4	78,9	86,5	85,6	83,0	39	41,4	40,6	52,6	54,3	50,9
Mefedrona	78,2	66,2	69,7	73,7	75,2	80,4	30,5	33,8	35,0	45,6	47,0	41,0
Salvia divinorum	-	75,4	78,4	86,4	76,6	67,3	-	36,4	36,9	47,6	44,7	38,4
Ayahuasca	-	-	-	-	78,6	74,5	-	-	-	-	44,7	39,0

Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miao miao, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.246.

Evolución del desconocimiento de la existencia de determinadas nuevas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2012-2021.

	Nunca he oído hablar de esta droga				
	2012	2014	2016	2019	2021
Ketamina	42,3	42,7	58,1	63,8	61,5
Spice	44,7	42,3	58,3	64,2	63,2
Mefedrona	51,6	44,0	62,2	68,0	67,4
Salvia divinorum	51,4	43,6	62,3	69,3	69,0
Ayahuasca	-	-	-	68,4	66,8

Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miao miao, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.247.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2021.

NPS alguna vez en la vida
Antes de las 12 de la noche
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada
Entre la 1 y las 2 de la madrugada
Entre las 2 y las 3 de la madrugada
Entre las 3 y las 4 de la madrugada
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana
Después de las 8 de la mañana

Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miao miao, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.248.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas* alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.


	Han consumido NPS	No han consumido NPS
Nunca	0,3	99,7
Menos de una noche al mes	0,6	99,4
De 1 a 3 noches al mes	1,4	98,6
1 noche a la semana	1,7	98,3
2 noches a la semana	2,1	97,9
3-4 noches a la semana	2,5	97,5
Más de 4 noches a la semana	4,0	96,0

Nuevas sustancias psicoactivas: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.249.

Evolución del consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB y heroína alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2021.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3	2,6	3,1
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9	1,7
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0	1,7	1,8
Setas mágicas	–	–	–	–	–	–	–	–	2,1	2,2	1,3	1,4	1,7	1,3
Metanfetamina	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6	1,5
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5	1,4
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8	0,7	0,5
GHB	–	–	–	–	–	–	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6	0,6	0,4
Esteroides anabolizantes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.250.

Evolución del consumo de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, GHB y heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 1994-2021.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6	1,9	1,8
Metanfetamina	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	0,7	0,5	1,0	1,4	1,0
Setas mágicas	–	–	–	–	–	–	–	–	1,6	1,4	0,8	0,9	1,2	1,1
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2	1,1	0,8
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0	1,1	0,9
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0	0,9
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4
GHB	–	–	–	–	–	–	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3
Esteroides anabolizantes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.251.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas* entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2021.

	2016	2019	2021
Ninguna sustancia	3,6	3,9	1,7
Una sola sustancia	8,5	5,0	3,7
Dos sustancias	8,5	5,4	6,7
Tres sustancias	32,6	22,4	18,2
Cuatro o más sustancias	46,9	63,4	69,7

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.252.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0	21,6	26,3	41,6
Una sola sustancia	32,9	36,7	39,2	31,5	35,7	32,5	32,0	36,1	31,5
Dos sustancias	19,4	18,1	16,3	18,8	17,7	15,5	18,2	16,8	14,6
Tres sustancias	19,5	17,5	12,3	20,9	18,2	12,6	17,8	14,5	10,0
Cuatro o más sustancias	9,3	6,0	2,2	10,5	6,9	2,4	10,3	6,4	2,3

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.253.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales* alguna vez en la vida en función de haber consumido o no nuevas sustancias psicoactivas (NSP) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2021.

	Sustancias psicoactivas legales	Sustancias psicoactivas ilegales	Ninguna sustancia psicoactiva legal e ilegal
Ha consumido NSP alguna vez en la vida	97,6	90,5	1,6
No ha consumido NSP alguna vez en la vida	77,5	27,9	21,5

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.254.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	21,6	26,3	41,6
Una sola sustancia	32,0	36,1	31,5
Dos sustancias	18,2	16,8	14,6
Tres sustancias	17,8	14,5	10,0
Cuatro o más sustancias	10,3	6,4	2,3

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.255.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2021.

	2012	2014	2016	2019	2021
Ninguna sustancia	16,8	21,0	21,7	21,5	26,3
Una sola sustancia	38,9	39,1	36,7	35,7	36,1
Dos sustancias	20,1	17,7	18,1	17,7	16,8
Tres sustancias	17,5	16,7	17,5	18,2	14,5
Cuatro o más sustancias	6,7	5,5	6,1	6,9	6,4

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.256.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la edad (%). España, 2021.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Ninguna sustancia	45,2	31,7	21,9	14,8	27,4	12,5
Una sola sustancia	32,6	37,4	37,5	36,6	36,2	34,4
Dos sustancias	12,9	15,1	17,7	19,6	16,5	19,5
Tres sustancias	6,6	11,3	16,1	20,1	13,9	21,1
Cuatro o más sustancias	2,7	4,5	6,9	8,8	5,9	12,5

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.257.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Ninguna sustancia	24,3	18,9	29,8	22,8	45,1	38,2
Una sola sustancia	33,2	30,7	37,1	35,2	31,0	32,0
Dos sustancias	16,0	20,5	13,6	19,9	12,0	17,2
Tres sustancias	17,0	18,7	13,8	15,2	9,9	10,1
Cuatro o más sustancias	9,6	11,1	5,8	7,0	2,1	2,5

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.258.


Prevalencias del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según edad y sexo (%). España, 2021.

		0 drogas	1 droga	2 drogas	3 drogas	4 y más drogas
14 años	Hombre	50,3	33,0	9,4	5,3	1,9
	Mujer	40,2	32,2	16,3	7,9	3,4
15 años	Hombre	37,3	37,2	11,5	10,6	3,5
	Mujer	26,4	37,6	18,6	12,0	5,5
16 años	Hombre	24,9	38,4	14,6	15,9	6,3
	Mujer	18,8	36,6	20,8	16,3	7,5
17 años	Hombre	16,8	38,6	17,3	18,9	8,4
	Mujer	12,8	34,6	21,9	21,4	9,3
18 años	Hombre	13,5	37,4	14,9	20,9	13,3
	Mujer	11,4	31,4	24,2	21,3	11,7

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB
FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.259.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo (%). España, 2021.



		0 drogas	1 droga	2 drogas	3 drogas	4 y más drogas
14 años	Hombre	67,1	22,4	6,1	3,7	0,7
	Mujer	56,1	27,0	10,5	4,9	1,5
15 años	Hombre	53,4	30,0	9,1	6,1	1,4
	Mujer	44,8	31,5	14,3	7,4	2,0
16 años	Hombre	41,0	32,2	13,5	11,2	2,1
	Mujer	35,4	32,2	18,1	12,0	2,3
17 años	Hombre	30,8	35,7	16,6	14,1	2,8
	Mujer	25,0	36,4	21,4	13,7	3,5
18 años	Hombre	25,0	35,7	15,6	18,3	5,4
	Mujer	21,5	31,9	27,5	14,9	4,2

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB
FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.260

Evolución de la prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2016-2021.

	2016	2019	2021
Ninguna sustancia	30,0	37,0	41,6
Una sola sustancia	39,2	32,5	31,5
Dos sustancias	16,3	15,5	14,6
Tres sustancias	12,3	12,6	10,0
Cuatro o más sustancias	2,2	2,4	2,3

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.261.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* sin incluir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Sólo alcohol	29,3	34,1	36,3	28,3	33,3	28,8	28,2	33,1	27,1
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0	21,6	26,2	41,6
Una sola sustancia	22,5	20,4	18,8	21,5	19,8	18,2	21,5	19,4	18,2
Dos sustancias	19,9	17,8	12,8	21,4	18,5	13,5	18,2	14,8	10,7
Tres sustancias	6,4	4,2	1,6	7,3	4,7	1,8	6,9	4,2	1,7
Cuatro o más sustancias	3,0	1,9	0,6	3,2	2,2	0,7	3,6	2,2	0,6

* Drogas legales e ilegales: tabaco, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.262.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* sin incluir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Sólo tabaco	0,7	0,7	1,2	0,6	0,5	1,4	0,7	0,5	1,5
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0	21,6	26,2	41,5
Una sola sustancia	42,2	46,7	49,2	41,1	45,3	41,5	41,3	45,4	40,2
Dos sustancias	27,8	24,3	17,2	28,5	25,0	17,3	25,4	20,9	14,2
Tres sustancias	7,4	4,7	1,8	8,2	5,3	2,2	7,4	4,7	1,9
Cuatro o más sustancias	3,0	1,9	0,7	3,3	2,4	0,7	3,7	2,3	0,7

* Drogas legales e ilegales: alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.263.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* sin incluir ni alcohol ni tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Sólo alcohol y/o tabaco	39,6	45,2	48,3	38,7	43,6	39,5	38,6	43,1	38,2
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0	18,3	21,5	37,0	21,6	26,2	41,5
Una sola sustancia	30,8	26,3	19,2	31,4	27,1	20,5	28,5	23,6	17,6
Dos sustancias	7,6	4,8	1,9	8,4	5,4	2,3	7,6	4,8	2,0
Tres sustancias	1,5	0,8	0,3	1,5	1,1	0,3	1,6	1,1	0,4
Cuatro o más sustancias	1,6	1,1	0,4	1,8	1,3	0,4	2,1	1,2	0,3

* Drogas legales e ilegales: hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.264

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	71,2	77,7	85,3
Una sola sustancia	24,2	19,3	13,8
Dos sustancias	2,2	1,5	0,5
Tres sustancias	1,0	0,7	0,2
Cuatro o más sustancias	1,4	0,8	0,2

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.265.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2021.

	2012	2014	2016	2019	2021
Ninguna sustancia	73,2	74,1	73,8	72,3	77,7
Una sola sustancia	22,7	22,9	23,2	24,2	19,3
Dos sustancias	1,6	1,5	1,4	1,8	1,5
Tres sustancias	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7
Cuatro o más sustancias	1,7	0,8	1,0	0,9	0,8

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.266.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2021.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Ninguna sustancia	70,6	71,9	77,4	78,1	84,6	86,0
Una sola sustancia	24,0	24,5	19,0	19,6	14,1	13,4
Dos sustancias	2,4	1,9	1,7	1,2	0,6	0,4
Tres sustancias	1,1	0,9	0,8	0,7	0,3	0,1
Cuatro o más sustancias	1,9	0,9	1,1	0,5	0,4	0,1

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.267.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	68,3	73,8	82,2	66,7	72,3	80,8	71,2	77,7	85,3
Una sola sustancia	27,4	23,2	16,8	28,6	24,2	18,0	24,2	19,3	13,8
Dos sustancias	2,2	1,4	0,4	2,6	1,8	0,6	2,2	1,5	0,5
Tres sustancias	0,8	0,6	0,3	0,9	0,7	0,2	1,0	0,7	0,2
Cuatro o más sustancias	1,3	1,0	0,3	1,3	0,9	0,3	1,4	0,8	0,2

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.268.

Prevalencia de consumo de una, dos, tres o cuatro o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2021.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Alcohol	36,8	24,1	24,6	14,5
Tabaco	1,0	23,4	46,2	29,4
Cannabis	0,5	7,2	53,2	39,1
Hipnosedantes sin receta	9,8	24,6	17,2	48,4
Hipnosedantes con o sin receta	13,0	25,6	17,4	44,0
Cocaína en polvo	0,0	0,9	0,9	98,2
Cocaína base	0,2	2,0	2,8	95,0
Cocaína polvo y/o base	0,1	1,6	1,9	96,5
Éxtasis	0,0	2,0	2,4	95,6
Anfetaminas	0,0	1,5	0,7	97,8
Alucinógenos	0,8	0,4	1,2	97,6
Heroína	0,0	1,5	1,2	97,3
Inhalables volátiles	1,8	7,8	7,1	83,4
GHB	1,1	4,0	2,7	92,2

* Drogas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.269.

Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos, cannabis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, éxtasis, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2021.

	Alcohol	Tabaco	Cigarrillos electrónicos	Cannabis	Hipnosedantes sin receta	Hipnosedantes con o sin receta	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	42,4	30,6	31,0	8,8	15,8	2,6	1,1	2,9	1,2	1,4	2,5	0,5	1,4	0,4
Tabaco	97,1	100,0	45,7	60,4	12,7	22,0	5,5	2,3	6,1	2,6	2,8	5,4	1,0	2,5	0,8
Cigarrillos electrónicos	95,2	63,1	100,0	48,3	12,3	20,9	5,0	2,3	5,6	2,6	2,7	5,1	1,0	2,7	0,8
Cannabis	97,9	82,8	47,6	100,0	14,3	23,8	7,6	3,3	8,5	3,8	4,3	7,8	1,5	3,6	1,2
Hipnosedantes sin receta	85,7	53,9	38,1	43,9	100,0	100,0	9,0	4,9	9,9	5,6	6,1	9,3	2,6	5,4	2,4
Hipnosedantes con o sin receta	81,9	49,6	34,6	39,1	54,0	100,0	6,1	3,4	7,0	4,0	4,3	6,9	1,8	3,9	1,5
Cocaína en polvo	97,1	89,4	59,9	91,3	35,0	44,6	100,0	31,5	100,0	30,9	26,4	48,2	12,2	17,1	11,2
Cocaína base	96,9	84,7	62,3	90,1	42,9	55,3	71,5	100,0	100,0	36,9	36,4	47,7	26,2	25,1	19,0
Cocaína polvo y/o base	96,5	88,3	58,8	89,9	33,9	44,9	89,0	39,9	100,0	30,1	25,4	45,3	13,4	16,4	11,2
Anfetaminas/speed	97,6	89,0	65,6	94,6	45,8	61,4	65,9	34,6	71,1	100,0	46,1	76,9	23,9	31,9	21,6
Alucinógenos	97,4	84,1	58,4	93,8	43,1	57,6	47,9	29,6	51,6	40,6	100,0	60,0	19,7	26,6	19,0
Éxtasis	96,4	88,8	61,3	93,8	36,8	51,2	47,8	21,3	50,6	37,0	33,7	100,0	13,0	19,3	11,3
Heroína	95,6	86,1	66,8	93,5	52,1	70,6	69,8	62,7	80,7	60,6	58,3	70,5	100,0	45,3	43,6
Inhalables volátiles	90,8	71,7	55,0	76,4	37,0	50,0	29,7	19,3	32,2	26,4	25,8	33,3	14,4	100,0	16,5
GHB	91,7	81,8	59,9	87,6	58,1	70,0	74,3	52,4	79,2	65,9	64,1	73,1	48,9	58,9	100,0

Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.270.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según han realizado o no consumos intensivos de alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2021.

	Ha hecho binge drinking	No ha hecho binge drinking	Se ha emborrachado	No se ha emborrachado
Consumo de cannabis	35,8	6,7	39,6	6,9
Consumo de cocaína polvo y/o base	1,8	0,1	1,7	0,2
Consumo de éxtasis	1,8	0,1	1,9	0,2
Consumo de anfetaminas o speed	1,0	0,1	1,1	0,1
Consumo de alucinógenos	0,9	0,1	0,8	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.271.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2021.

	Se han emborrachado últimos 30 días	No se han emborrachado últimos 30 días
Consumo de cannabis	39,6	6,9
Consumo de cocaína polvo y/o base	1,7	0,2
Consumo de éxtasis	1,9	0,2
Consumo de anfetaminas o speed	1,1	0,1
Consumo de alucinógenos	0,8	0,1
Consumo de heroína	0,5	0,1
Consumo de inhalables volátiles	1,0	0,2
Consumo de GHB	0,4	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.272.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2008-2021.

		2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Total		24,9	22,9	19,6	17,3	15,2	17,5	13,7
Sexo	Hombres	28,0	24,8	22,7	19,5	16,5	18,8	14,4
	Mujeres	21,8	21	16,5	15,2	13,9	16,3	13,0
Edad	14 años	11,4	9,1	6,8	6,3	5,0	6,5	4,4
	15 años	21,0	17,3	12,9	12,5	12,4	13,8	9,3
	16 años	27,3	26,2	19,6	20,7	17,1	20,1	16,1
	17 años	33,2	33,4	25,8	25,5	24,1	24,7	20,1
	18 años	38,1	35,9	29,7	25,8	27,9	25,9	23,4

* Consumo de alcohol y cannabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.273.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2008-2021.

		2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Total		4,1	3,0	1,6	1,2	1,2	1,2	0,9
Sexo	Hombres	5,1	3,7	2,2	1,5	1,6	1,5	1,2
	Mujeres	3,1	2,3	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6
Edad	14 años	2,6	1,8	0,5	0,7	0,5	0,4	0,3
	15 años	3,4	2	0,8	1,0	0,9	0,8	0,6
	16 años	4,0	2,7	1,4	1,1	1,1	1,1	1,0
	17 años	4,9	4,4	1,9	1,4	1,5	1,7	1,1
	18 años	8,1	6,1	3,5	2,1	4,2	2,6	2,4

* Consumo de alcohol y cocaína sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.274.

Prevalencia de consumo conjunto* de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad (%). España, 2012-2021.

	2012	2014	2016	2019	2021
Total	20,9	19,7	21,5	22,5	18,1
Sexo					
Hombres	22,2	20,7	22,1	22,3	17,7
Mujeres	19,5	18,7	20,9	22,6	18,6
Edad					
14 años	8,1	8,5	8,8	10,4	7,6
15 años	15,4	14,9	19,1	18,2	13,3
16 años	20,6	23,1	23,8	25,8	20,5
17 años	26,5	27,4	30,7	30,2	25,1
14-17 años	-	-	20,2	21,9	17,2
18 años	30,7	29,9	39,1	31,7	29,9

* Se obtiene de cruzar a las personas que han consumido ambas sustancias en el mismo periodo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.275.

Prevalencia de consumo conjunto* de tabaco diario y cannabis en los últimos 30 días según sexo y edad (%). España, 2012-2021.

	2012	2014	2016	2019	2021
Total	6,8	5,9	6,1	6,6	5,5
Sexo					
Hombres	7,1	6,3	6,5	6,7	5,5
Mujeres	6,4	5,4	5,7	6,5	5,5
Edad					
14 años	1,5	1,5	1,7	1,9	1,5
15 años	4,0	3,7	5,0	4,4	3,1
16 años	6,2	7,2	6,9	7,9	6,0
17 años	9,1	8,6	9,2	9,8	8,7
14-17 años	-	-	5,6	6,3	5,0
18 años	12,0	11,6	13,3	11,1	11,6


* Se obtiene de cruzar a las personas que han consumido ambas sustancias en el mismo periodo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.276.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2021.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Heroína	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4	97,3	97,0
Cocaína en polvo	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6	96,9	96,4	97,1	96,8
Éxtasis	97,2	97,1	97,0	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5	96,9	96,2	96,9	96,7
Tabaco														
(un paquete diario)	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7	91,8	93,8	93,9
Hipnosedantes	90,6	88,6	88,5	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5	88,6	87,7	90,7	88,6
Cannabis	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7	87,5	88,7
Tomar 5 o 6 cañas/copas														
en fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3	56,1	76,8	75,7
Tomar 1 o 2 cañas/copas														
diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8	52,9	56,4	56,5



■ Heroína
 ■ Cocaína en polvo
 ■ Éxtasis
 ■ Hipnosedantes
 ■ Cannabis
 ■ Tabaco (un paquete diario)

■ Tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana
 ■ Tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.277.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad. España, 2021.


	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Fumar un paquete de tabaco diario	93,9	92,6	95,1	93,7	93,3	93,9	94,3	94,5
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	75,7	74,7	76,6	77,5	75,9	76,3	74,7	72,1
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	56,5	53,5	59,4	55,2	55,9	56,4	57,5	58,4
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	75,7	73,6	77,6	77,4	75,6	75,1	74,8	77,2
Tomar hipnosedantes habitualmente	88,6	87,8	89,4	86,6	86,5	89,2	90,7	91,3
Fumar cannabis habitualmente	88,7	85,4	91,9	92,9	90,0	87,8	86,6	84,8
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,8	95,9	97,7	96,5	96,2	97,2	97,4	96,9
Consumir éxtasis habitualmente	96,7	95,5	97,8	96,1	96,2	96,9	97,3	96,5
Consumir heroína habitualmente	97,0	95,9	98,0	96,6	96,5	97,3	97,4	96,9

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.278.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2008-2021.




* 5 o 6 cañas/copas en fin de semana. ** 1 o 2 cañas/copas cada día. *** Paquete tabaco/día.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.279.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de cannabis y tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2021.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Cannabis habitualmente	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7	87,5	88,7
Tabaco (un paquete diario)	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7	91,8	93,8	93,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.280.

Evolución del riesgo percibido del consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2021.

	1994		2000		2006		2012		2014		2016		2019		2021	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	10.147	9.777	12.598	13.856	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720	18.489	19.521	11.116	11.205
Fumar un paquete de tabaco diario	74,7	79,1	75,1	79,5	84,9	89,3	89,6	93,1	88,1	91,1	91,0	92,7	93,1	94,4	92,6	95,1
Tomarse 5 o 6 cañas de bebidas alcohólicas en fin de semana	39,8	47,7	41,5	48,3	48,7	53,6	44,7	50,3	52,6	57,7	55,7	56,5	73,8	79,4	73,6	77,6
Tomarse 1 o 2 cañas de bebidas alcohólicas a diario	46,3	54,6	39,4	48,4	52,3	61,9	55,1	64,1	53,3	62,0	48,7	56,9	52,6	59,8	53,5	59,4
Fumar cannabis habitualmente	89,8	93,9	79,4	86,1	85,7	91,7	84,3	91,7	85,4	91,9	88,0	93,2	83,7	90,9	85,4	91,9
Tomar hipnosedantes habitualmente	89,9	91,3	86,9	87,9	86,1	88,6	88,7	90,3	88,3	89,0	87,2	88,1	89,7	91,6	87,8	89,4
Consumir éxtasis habitualmente	96,6	97,9	95,0	95,9	95,8	98,0	95,2	97,8	95,9	97,8	95,5	97,0	95,8	97,9	95,5	97,8
Consumir cocaína en polvo habitualmente	98,1	99,0	96,3	97,5	95,6	97,9	95,4	97,9	96,0	97,7	95,7	97,1	96,3	97,8	95,9	97,7
Consumir heroína habitualmente	98,4	99,3	97,6	98,8	95,8	98,1	95,7	98,0	96,4	98,4	95,6	97,1	96,3	98,1	95,9	98,0

H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: en esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.281.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal* (%). España, 2021.

	Han consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses	No han consumido ninguna droga ilegal en los últimos 12 meses
Fumar un paquete de tabaco diario	90,6	94,9
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	63,5	79,6
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	71,9	76,9
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	54,2	57,2
Tomar hipnosedantes habitualmente	89,9	88,4
Fumar cannabis habitualmente	75,7	92,9
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,2	97,1
Consumir éxtasis habitualmente	96,0	97,0
Consumir heroína habitualmente	96,5	97,2

* alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con receta, ni inhalables volátiles. Incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.282.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2021.


	Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días		Consumo de alcohol en los últimos 30 días	
	SÍ	NO	SÍ	NO
Fumar un paquete de tabaco diario	87,0	94,6	-	-
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	45,6	78,9	-	-
Fumar cigarrillos electrónicos	21,8	22,6	-	-
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	-	-	59,1	76,1
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	-	-	38,4	57,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.283.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2006-2021.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Fumar cannabis alguna vez	70,2	54,8	50,4	52,6	54,9	54,1	51,9	52,2
Fumar cigarrillos electrónicos	-	-	-	-	-	34,2	18,3	22,4
Consumir cocaína en polvo alguna vez	90,8	81,4	79,6	81,4	86,1	78,1	81,3	79,2
Consumir cocaína base alguna vez	90,5	86,0	82,3	83,3	85,6	82,8	84,8	83,0
Consumir éxtasis alguna vez	91,3	85,0	82,6	84,9	87,1	80,3	83,7	81,0
Consumir anfetaminas alguna vez	91,0	85,1	82,6	84,9	87,3	80,4	84,7	82,4
Consumir alucinógenos alguna vez	90,3	84,8	80,5	82,6	86,5	80,3	82,1	79,4
Consumir heroína alguna vez	92,0	86,8	84,9	87,2	88,7	82,3	86,8	85,0
Injectarse drogas alguna vez	92,9	88,9	87,7	90,7	94,0	88,7	89,6	88,5
Consumir GHB alguna vez	91,9	86,1	83,7	85,8	87,8	88,1	88,1	85,9
Consumir metanfetamina alguna vez	-	-	-	-	-	85,9	87,0	84,8



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.284.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2021.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Fumar cannabis alguna vez	52,2	51,6	52,8	64,7	56,2	48,6	45,5	45,9
Fumar cigarrillos electrónicos	22,4	21,3	23,5	23,2	20,9	20,5	23,8	27,7
Consumir cocaína en polvo alguna vez	79,2	80,0	78,4	78,6	76,7	78,9	81,2	82,9
Consumir cocaína base alguna vez	83,0	83,6	82,4	80,9	80,3	83,0	85,6	87,1
Consumir éxtasis alguna vez	81,0	80,7	81,3	80,6	79,0	80,2	82,6	85,2
Consumir anfetaminas alguna vez	82,4	82,2	82,5	80,8	80,9	81,9	83,8	86,7
Consumir alucinógenos alguna vez	79,4	78,3	80,6	80,4	78,4	78,8	79,8	81,6
Consumir heroína alguna vez	85,0	85,1	85,0	82,9	83,2	84,6	87,4	89,2
Injectarse drogas alguna vez	88,5	88,3	88,7	87,4	87,2	88,1	90,3	91,4
Consumir GHB alguna vez	85,9	85,6	86,2	83,5	84,0	85,8	88,2	90,4
Consumir metanfetamina alguna vez	84,8	84,6	85,0	82,7	83,1	84,5	86,7	89,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.285.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal* (%). España, 2021.

	Han consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses	No han consumido ninguna droga ilegal en los últimos 12 meses
Fumar cannabis alguna vez	26,8	60,9
Fumar cigarrillos electrónicos	18,5	23,8
Consumir cocaína en polvo alguna vez	77,4	79,8
Consumir cocaína base alguna vez	83,0	83,0
Consumir éxtasis alguna vez	78,1	81,9
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	80,8	82,8
Consumir alucinógenos alguna vez	74,1	81,3
Consumir heroína alguna vez	86,2	84,7
Injectarse drogas alguna vez	88,8	88,5
Consumir GHB alguna vez	86,3	85,8
Consumir metanfetamina alguna vez	83,9	85,1


* alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con receta, ni inhalables volátiles. Incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.286.

Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2021.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Alcohol	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4	93,0	94,9	93,9
Tabaco	-	-	-	-	-	-	91,7	90,9	93,6	92,8	90,8	91,4	93,1	91,6
Cannabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3	65,9	68,1	61,1
Hipnosedantes	55,9	65,9	65,9	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3	49,1	47,5	47,4	46,7
Cocaína polvo	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8	28,9	32,3	32,8	26,8
Cocaína base	-	-	-	-	-	-	36,1	31,8	37,0	33,4	29,5	22,9	21,8	17,4
Anfetaminas	43,9	40,1	39,7	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7	24,2	23,4	22,8	19,1
Alucinógenos	26,2	40,1	39,2	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9	26,2	22,8	24,1	19,9
Éxtasis	46,3	42,6	39,8	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2	21,8	21,8	21,0	19,6
Heroína	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4	21,2	20,2	16,3
GHB	-	-	-	-	-	-	25,5	22,4	25,8	22,3	18,7	14,2	12,6	10,5
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	18,5	15,9



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.287.

Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según edad y sexo (%). España, 2021.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Bebidas alcohólicas	93,9	93,3	94,4	89,2	91,9	94,5	96,9	97,7
Tabaco	91,6	91,1	92,1	85,7	89,4	92,8	95,0	96,2
Cannabis	61,1	63,1	59,3	38,7	51,4	65,0	75,0	78,9
Hipnosedantes	46,7	44,3	48,8	35,4	40,5	47,3	55,2	63,1
Cocaína en polvo	26,8	28,1	25,7	15,6	20,5	27,2	35,9	44,2
Alucinógenos	19,9	22,4	17,4	11,0	15,5	20,5	26,3	33,3
Anfetaminas	19,1	21,3	16,9	10,8	14,6	19,4	25,6	32,8
Cocaína base	17,4	18,8	16,1	10,5	14,1	17,4	22,7	29,5
Éxtasis	19,6	21,4	17,9	11,2	15,1	20,2	26,0	32,3
Heroína	16,3	17,6	15,0	11,9	14,2	15,5	19,6	25,8
Metanfetamina	15,9	17,7	14,2	10,6	13,5	15,2	20,1	26,8
GHB	10,5	11,9	9,1	6,7	8,7	9,9	13,3	18,8

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.288.


Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan realizado o no consumos intensivos de alcohol en los últimos 30 días (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 2021.

	Ha hecho binge drinking	No ha hecho binge drinking	Se ha emborrachado	No se ha emborrachado
Disponibilidad percibida de cannabis	78,9	52,7	82,2	52,8
Disponibilidad percibida de cocaína polvo	40,5	20,8	42,8	20,9
Disponibilidad percibida de éxtasis	30,1	15,0	32,2	14,9
Disponibilidad percibida de anfetaminas	29,7	14,4	30,9	14,6
Disponibilidad percibida de alucinógenos	29,0	15,8	30,3	15,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.289.

Evolución de la disponibilidad de cocaína polvo y/o base percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2021.



* Desde 1994 hasta 2010 los datos de disponibilidad se refieren sólo a cocaína polvo.

** En 2020 y 2021 el dato es del 2º semestre.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.290.


Evolución de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 2000-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.291.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2021.



	2008	2021
GHB	22,4	10,5
Heroína	23,2	16,3
Éxtasis	26,6	19,6
Anfetaminas	28,1	19,1
Alucinógenos	28,6	19,9
Cocaína base	31,8	17,4
Cocaína polvo	32,7	26,8
Hipnosedantes	55,6	46,7
Cannabis	63,6	61,1
Alcohol	90,8	93,9
Tabaco	90,9	91,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.292.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil*) y % de respuesta Ns/Nc entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2014-2021.

	2014		2016		2019		2021	
	Fácil/muy fácil	Ns/Nc	Fácil/muy fácil	Ns/Nc	Fácil/muy fácil	Ns/Nc	Fácil/muy fácil	Ns/Nc
Bebidas alcohólicas	79,3	13,3	74,6	19,8	81,6	13,9	79,8	15,0
Tabaco	78,3	13,7	72,0	21,3	79,0	15,1	76,5	16,5
Cannabis	46,0	30,6	40,6	38,3	47,0	31,0	41,5	32,1
Hipnosedantes	27,7	43,5	21,2	55,3	23,9	49,7	24,7	47,1
Cocaína en polvo	15,8	45,2	15,5	52,0	17,8	45,7	15,2	43,3
Cocaína base	16,6	43,8	10,2	55,7	10,8	50,5	9,2	47,0
Anfetaminas o speed	12,5	48,1	10,0	57,1	11,0	51,8	9,8	48,5
Setas mágicas	-	-	9,8	57,9	-	-	-	-
Alucinógenos	13,7	47,6	9,8	57,3	11,7	51,6	10,3	48,0
Éxtasis	11,3	48,2	9,4	56,7	10,2	51,5	10,3	47,6
Heroína	11,2	47,8	9,2	56,7	9,9	51,2	8,5	47,6
Esteroides anabolizantes	-	-	9,1	59,3	-	-	-	-
Metanfetamina	-	-	7,6	58,8	8,6	53,3	8,0	49,5
GHB	9,6	49,0	5,7	60,0	5,6	55,4	5,0	52,0

* Datos de percepción de disponibilidad teniendo en cuenta todas las respuestas, incluidos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.293.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna droga ilegal*, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo y edad (%). España, 2021.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Te han ofrecido alguna droga ilegal	35,4	35,0	35,9	19,0	28,5	38,4	47,0	51,8	34,1
Te han ofrecido alguna droga ilegal que no sea cannabis	9,9	10,7	9,1	5,2	8,2	10,2	13,5	14,9	9,5

H = Hombres; M = Mujeres.

* alguna droga ilegal: cannabis, cocaína en polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína y metanfetaminas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.294.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2021.

	Tamaño muestra	Tabaco	Bebidas alcohólicas	Hipnosedantes	Cannabis	Cocaína en polvo	Cocaína base	Éxtasis	Anfetaminas o speed	Alucinógenos	Heroína	GHB	Metanfetamina
Andalucía	2.659	89,8	93,1	40,3	52,5	22,2	13,5	13,8	13,5	15,2	13,2	8,2	12,4
Aragón	952	94,6	96,5	45,1	63,3	29,3	20,6	20,7	27,5	21,2	16,2	10,4	16,6
Asturias	789	91,5	93,9	44,5	59,7	30,7	19,3	21,8	20,7	20,5	18,2	13,1	18,2
Baleares	864	89,2	91,8	38,1	59,7	24,2	15,1	15,2	13,7	15,0	11,6	5,7	11,1
Canarias	1.150	86,8	91,2	45,0	61,4	27,7	18,7	20,9	18,4	20,2	21,3	11,9	18,7
Cantabria	609	89,6	94,0	48,0	64,2	36,1	23,3	27,0	29,4	24,9	21,0	15,7	22,8
Castilla y León	1.156	94,1	96,7	46,3	67,0	31,5	19,2	22,2	25,8	23,1	16,0	9,5	18,7
Castilla-La Mancha	1.195	93,7	95,0	46,9	64,3	31,6	18,7	20,8	20,3	20,8	18,6	10,7	18,7
Cataluña	2.493	91,4	93,0	50,0	61,5	23,8	15,2	19,0	17,3	19,2	14,2	9,6	15,0
Comunidad Valenciana	1.891	91,3	93,5	50,2	66,1	29,1	21,4	23,0	21,6	22,2	18,8	13,6	17,8
Extremadura	848	93,5	94,9	44,8	62,2	32,3	19,2	21,1	19,0	18,4	19,2	11,8	16,7
Galicia	1.244	92,9	94,3	46,7	64,9	26,9	18,4	22,1	19,6	24,7	17,6	10,4	17,3
Madrid	2.343	93,1	94,8	47,9	60,5	27,7	19,1	21,8	19,8	22,2	17,8	12,0	16,5
Murcia	1.131	92,8	94,2	46,3	58,1	28,0	17,1	18,9	16,1	16,8	15,6	9,4	15,7
Navarra	824	94,7	95,7	51,5	71,1	31,3	19,4	23,6	31,7	21,0	19,1	12,1	19,6
País Vasco	1.226	92,3	94,8	57,7	70,1	32,4	19,3	21,8	26,9	23,5	16,8	11,5	17,3
La Rioja	451	94,4	95,3	39,6	70,3	23,3	12,4	17,8	27,8	18,5	15,2	7,8	15,1
Ceuta	251	85,6	83,9	37,1	50,3	22,0	15,4	16,1	14,7	16,8	16,1	9,8	15,3
Melilla	245	83,3	77,7	31,7	39,7	23,2	14,3	15,5	13,8	13,6	14,9	6,5	16,2
Total	22.321	91,6	93,9	46,7	61,1	26,8	17,4	19,6	19,1	19,9	16,3	10,5	15,9

Se excluyen de la base los casos que no contestan o no saben.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.295.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2021.

	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas
A través de un familiar/amigo/conocido	45,1	30,5	22,9	25,2	44,0
A través de un vendedor (camello)	35,7	35,1	31,6	27,7	35,2
En una zona de ocio (festival, concierto...)	9,1	14,1	11,2	10,5	13,7
A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)	5,6	3,7	3,6	3,0	7,4
A través de internet	2,1	4,3	8,4	3,7	9,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.296.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna de las siguientes drogas, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo (%). España, 2021.

	Total	Hombres	Mujeres
Cannabis	34,7	34,2	35,3
Cocaína en polvo	6,6	7,6	5,5
Alucinógenos	3,9	4,3	3,6
Anfetaminas o speed	3,3	4,2	2,5
Éxtasis	4,1	4,6	3,6
Cocaína base	2,6	3,3	1,9
Heroína	2,3	2,6	2,1
Metanfetamina	2,3	2,9	1,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.297.


Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo (%). España, 2014-2021.

	2014		2016		2019		2021	
	Perfectamente informado	Mal informado	Perfectamente informado	Mal informado	Perfectamente informado	Mal informado	Perfectamente informado	Mal informado
Total	29,7	6,0	31,3	7,5	26,0	7,1	22,5	9,3
Hombres	36,0	5,9	37,1	7,3	32,0	7,1	26,9	9,5
Mujeres	23,6	6,1	25,5	7,6	20,4	7,2	18,0	9,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.298.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según sexo y edad (%). España, 2021.



		Sí, perfectamente	Sí, lo suficiente	Sólo a medias	No, estoy mal informado
14 años	Hombres	24,5	36,4	26,1	13,0
	Mujeres	17,7	39,8	32,8	9,7
15 años	Hombres	25,6	39,7	24,0	10,8
	Mujeres	17,5	38,1	35,2	9,3
16 años	Hombres	26,0	42,3	23,2	8,6
	Mujeres	17,8	38,5	35,3	8,5
17 años	Hombres	30,2	40,6	21,0	8,1
	Mujeres	18,2	37,7	34,6	9,5
18 años	Hombres	29,5	45,8	19,5	5,2
	Mujeres	20,2	41,3	30,2	8,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.299.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* y según sexo (%). España, 2021.




* alguna droga ilegal: No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.300.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga legal* y según sexo (%). España, 2021.



	Han consumido alguna droga legal en los últimos 12 meses	No han consumido ninguna droga legal en los últimos 12 meses
Perfectamente informado		
Total	77,4	22,6
Hombre	75,9	24,1
Mujer	79,6	20,4
Mal informado		
Total	65,4	34,6
Hombre	57,4	42,6
Mujer	73,8	26,2

* Alguna droga legal: tabaco, alcohol, hipnosedantes con y sin receta e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.301.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según sexo y edad. (%). España, 2021.

TOTAL	SEXO		EDAD					
	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
He recibido información en el centro educativo								
75,6	72,9	78,4	73,4	73,0	76,8	77,9	75,4	78,1
He recibido información en mi familia								
66,9	66,1	67,6	63,8	65,0	68,7	69,7	67,0	65,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.302.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones, según sexo. (%) España, 2021.

	Total	Hombre	Mujer
Efectos y problemas asociados a drogas legales	70,3	67,3	73,4
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales	62,1	62,2	62,1
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías	73,3	68,2	78,7
Efectos y problemas asociados al juego on line, apuestas	44,4	45,5	43,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.303.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones, según sexo. (%). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Efectos y problemas asociados a drogas legales	71,1	69,8	72,4	76,9	74,7	79,0	70,3	67,3	73,4
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales	65,7	65,8	65,6	69,4	69,8	69,2	62,1	62,2	62,1
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías	68,9	66,5	71,4	74,8	71,6	78,0	73,3	68,2	78,7
Efectos y problemas asociados al juego on line, apuestas	26,9	29,4	24,4	38,8	42,3	35,5	44,4	45,5	43,3

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.304.

Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por comunidad/ciudad autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2021.

	Tamaño muestra	Información con respecto al tema de las drogas	
		Perfectamente informado	Mal informado
Andalucía	2.659	23,0	27,4
Aragón	952	21,5	31,1
Asturias	789	27,4	21,6
Baleares	864	24,4	25,6
Canarias	1.150	26,7	27,3
Cantabria	609	25,6	28,3
Castilla y León	1.156	25,0	25,9
Castilla-La Mancha	1.195	25,7	28,7
Cataluña	2.493	17,3	32,9
Comunidad Valenciana	1.891	22,0	29,4
Extremadura	848	23,6	31,5
Galicia	1.244	25,7	26,2
Madrid	2.343	23,8	27,0
Murcia	1.131	28,5	23,1
Navarra	824	18,3	31,5
País Vasco	1.226	15,1	33,5
La Rioja	451	23,4	22,9
Ceuta	251	26,8	22,6
Melilla	245	34,2	24,9
Total	22.321	22,5	28,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.305.

Evolución de la prevalencia de consumo de sustancias legales* e ilegales** alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y los problemas asociados y otras adicciones (%). España, 2016-2021.


	2016			2019			2021		
	Total 14-18	Consumo legales	Consumo ilegales	Total 14-18	Consumo legales	Consumo ilegales	Total 14-18	Consumo legales	Consumo ilegales
Efectos y problemas asociados a...									
Drogas legales	71,1	80,2	30,9	76,9	81,6	34,2	70,3	78,1	29,0
Drogas ilegales	65,7	80,7	31,2	69,4	81,9	34,9	62,1	78,9	30,4
Mal uso de las nuevas tecnologías	68,9	79,0	28,7	74,8	80,7	32,4	73,3	77,3	27,6
Juego online, apuestas	26,9	79,3	29,8	38,8	81,3	33,2	44,4	77,7	27,8

* Drogas legales: tabaco, alcohol e hipnosedantes con/sin receta. ** Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.306.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2021.



	2012	2014	2016	2019	2021
Educación en las escuelas	95,7	96,8	96,4	96,2	96,3
Tratamiento voluntario a consumidores	94,2	96,0	95,2	95,0	94,9
Control policial y aduanero	91,2	93,1	93,2	92,6	92,4
Campañas publicitarias	90,9	92,5	91,3	90,1	90,3
Tratamiento obligatorio a consumidores	90,3	93,0	91,6	91,0	90,1
Leyes estrictas contra las drogas	86,2	88,4	88,9	87,5	87,7
Administración médica de metadona	88,0	91,2	89,3	89,0	88,4
Administración médica de heroína	79,3	84,1	82,5	81,7	81,5
Legalización del cannabis	58,3	59,9	55,1	54,3	50,0
Legalización de todas las drogas	39,6	40,6	38,0	31,9	27,6

* Algo importante o muy importante.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.307.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo y edad (%). España, 2012-2021.

		2012	2014	2016	2019	2021
Legalización del cannabis						
Total		37,7	40,3	36,4	34,2	28,4
Sexo	Hombre	39,3	40,9	36,7	35,7	29,1
	Mujer	35,9	39,8	36,1	32,8	27,6
Edad	14 años	35,8	40,2	35,7	31,1	23,8
	15 años	36,3	39,2	35,5	32,1	26,0
	16 años	36,9	41,4	35,5	34,1	28,8
	17 años	38,4	39,7	36,8	36,7	31,5
	14-17 años	37,0	40,1	35,9	33,8	27,8
	18 años	41,1	42,7	43,1	40,4	34,8
Legalización de todas las drogas						
Total		27,0	29,6	26,8	20,8	17,3
Sexo	Hombre	25,7	27,5	25,3	20,4	17,3
	Mujer	28,4	31,8	28,4	21,3	17,2
Edad	14 años	32,7	36,8	32,7	24,9	19,0
	15 años	28,9	31,5	28,7	21,2	18,3
	16 años	26,0	28,8	24,3	20,4	16,8
	17 años	24,4	24,1	22,1	18,2	15,9
	14-17 años	27,2	29,8	26,9	20,9	17,4
	18 años	25,7	27,0	26,1	20,0	16,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.308.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%) España, 2014-2021.


	2014	2016	2019	2021
No han consumido cannabis en el último año	22,6	19,5	18,0	22,7
Han consumido cannabis en el último año (CAST<4)	45,4	34,9	39,8	45,2
Han consumido cannabis en el último año (CAST ≥4 Consumo problemático)	58,2	48,2	51,8	63,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.309.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que valoran como “algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2021.



	2014	2016	2019	2021
No han consumido alguna droga ilegal en el último año	26,6	23,2	20,3	25,4
Han consumido alguna droga ilegal en el último año	29,7	28,6	27,5	33,9

* Alguna droga ilegal: No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.310.


Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2021.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína en polvo	Hipnosedantes
2006	54,9	33,2	14,7	1,6	0,7
2008	58,8	35,5	14,4	1,6	1,0
2010	58,5	34,6	12,2	1,6	1,5
2012	58,0	30,6	11,9	1,8	1,7
2014	48,8	24,8	9,4	0,9	1,0
2016	43,6	20,4	7,3	1,0	1,0
2019	46,5	24,2	8,1	1,1	1,1
2021	37,6	20,4	5,9	0,7	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.311.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2021.




	Todos/mayoría de mis amigos consumen alcohol	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen alcohol
No consumen alcohol	18,7	63,1
Sí consumen alcohol	81,3	36,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.312.

Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales hacen botellón (últimos 30 días) (%). España, 2021.




	Todos/mayoría de mis amigos hacen botellón	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos hacen botellón
No hacen botellón	48,3	90,2
Sí hacen botellón	51,7	9,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.313.


Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.314.


Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o solo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.315.


Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o solo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.316.


Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.317.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen este tipo de sustancias (alguna vez en la vida) (%). España, 2021.



	Todos/mayoría de mis amigos consumen sustancias estimulantes para mejorar rendimiento en el estudio	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen sustancias estimulantes para mejorar rendimiento en el estudio
No consumen sustancias estimulantes para mejorar rendimiento en el estudio	53,9	93,8
Sí consumen sustancias estimulantes para mejorar rendimiento en el estudio	46,1	6,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.318.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de alcohol según el consumo de alcohol que los estudiantes tengan. España, 2021.

		MADRE permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas	PADRE permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas
Total alumnos		31,7	28,7
Bebidas alcohólicas últimos 30 días	Sí	44,7	39,9
	No	16,9	16,1
Borracheras últimos 30 días	Sí	51,7	45,0
	No	25,3	23,5
Botellón últimos 12 meses	Sí	44,6	39,1
	No	22,7	21,5
Binge drinking últimos 30 días	Sí	51,0	44,7
	No	24,2	22,5
Bebidas energéticas + alcohol últimos 30 días	Sí	46,3	39,6
	No	28,9	26,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.319.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas, según sexo y según edad (%). España, 2016-2021.

Total 2016			Total 2019			Total 2021		
MADRE								
Permisiva frente al consumo de tabaco	10,8		10,5			10,7		
Permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas	37,3		34,0			31,7		
Permisiva frente al consumo de cannabis	1,6		6,2			11,4		
PADRE								
Permisivo frente al consumo de tabaco	10,1		13,2			17,5		
Permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas	36,5		31,8			28,7		
Permisivo frente al consumo de cannabis	1,8		2,0			2,1		
2021			2021					
Sexo			Edad					
	Hombre	Mujer	14	15	16	17	18	14-17
MADRE								
Permisiva frente al consumo de tabaco	10,6	10,8	3,7	5,9	10,9	16,2	26,0	9,5
Permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas	30,3	33,0	13,8	19,9	32,8	47,8	59,5	29,4
Permisiva frente al consumo de cannabis	10,7	12,2	5,8	8,5	12,3	15,6	18,9	10,8
PADRE								
Permisivo frente al consumo de tabaco	17,2	17,8	8,3	12,2	17,8	25,4	31,9	16,3
Permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas	28,8	28,6	13,1	19,0	29,3	43,1	52,8	26,8
Permisivo frente al consumo de cannabis	2,4	1,7	0,4	1,0	2,0	3,3	6,2	1,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.320.

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años cuyos padres son permisivos frente al consumo de cannabis según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan. España, 2021.

	Total alumnos	Cannabis últimos 12 meses	Cannabis últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4)
MADRE				
Permisiva frente al consumo de cannabis	12,2	56,6	43,3	15,2
No permisiva frente al consumo de cannabis	87,8	16,4	10,2	1,4
PADRE				
Permisivo frente al consumo de cannabis	17,5	41,8	30,1	8,2
No permisivo frente al consumo de cannabis	67,3	16,0	10,1	1,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.321.

Frecuencia de actividades de ocio realizadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo (%). España, 2021.

		Total	Hombres	Mujeres
Practicar algún deporte	Nunca	9,9	6,8	13,1
	Anualmente	5,2	3,3	7,1
	Mensualmente	15,6	11,8	19,5
	Semanalmente	69,3	78,1	60,3
Leer libros por diversión	Nunca	39,5	49,7	29,1
	Anualmente	20,5	20,9	20,2
	Mensualmente	19,2	17,2	21,3
	Semanalmente	20,7	12,2	29,5
Salir con amigos por las noches	Nunca	34,4	35,4	33,3
	Anualmente	15,2	13,6	16,9
	Mensualmente	27,5	27,8	27,3
	Semanalmente	22,9	23,2	22,5
Salir con amigos por las tardes	Nunca	4,6	5,8	3,3
	Anualmente	5,3	5,8	4,8
	Mensualmente	26,8	26,2	27,4
	Semanalmente	63,3	62,2	64,4
Tener otros hobbies	Nunca	38,3	43,7	32,8
	Anualmente	9,2	8,8	9,5
	Mensualmente	16,8	14,8	18,9
	Semanalmente	35,7	32,7	38,8
Usar internet por diversión	Nunca	0,6	0,7	0,5
	Anualmente	0,7	0,7	0,6
	Mensualmente	1,7	1,9	1,5
	Semanalmente	97,0	96,6	97,4
Visitar páginas para adultos en internet	Nunca	47,0	25,2	69,3
	Anualmente	8,6	6,4	10,8
	Mensualmente	15,0	18,0	12,0
	Semanalmente	29,4	50,4	7,9
Realizar compras a través de internet	Nunca	9,9	13,8	5,8
	Anualmente	23,3	25,0	21,5
	Mensualmente	56,1	52,4	59,9
	Semanalmente	10,7	8,7	12,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.322.

Prevalencia de consumo de sustancias de en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas (%). España, 2021.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
Ha practicado algún deporte	71,1	30,4	22,1	1,9
No ha practicado ningún deporte	66,4	34,7	23,9	4,0
Ha leído libros para divertirse	66,1	25,9	18,2	1,4
No ha leído libros para divertirse	77,5	38,2	28,6	3,1
Ha salido con amigos por las noches	83,3	39,6	29,7	2,9
No ha salido con amigos por las noches	46,6	13,8	8,4	0,7
Ha salido con amigos por las tardes	72,1	31,6	23,0	2,1
No ha salido con amigos por las tardes	41,1	13,2	7,5	2,3
Tiene otros hobbies	68,1	28,0	20,5	1,6
No tiene otros hobbies	74,6	35,1	25,2	2,9
Ha usado Internet para divertirse	70,7	30,8	22,3	2,1
No ha usado Internet para divertirse	61,5	29,4	24,8	9,4
Ha visitado páginas sólo para adultos	77,5	36,3	29,0	3,0
No ha visitado páginas sólo para adultos	62,7	24,5	14,9	1,1
Realiza compras en internet	73,2	32,3	23,4	2,1
No realiza compras en internet	47,6	16,6	12,0	1,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.323.

Prevalencia de consumo de sustancias de en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según las actividades de ocio realizadas, según sexo (%). España, 2021.

	Alcohol		Tabaco		Cannabis		Cocaína polvo y/o base	
	H	M	H	M	H	M	H	M
Ha practicado algún deporte	68,4	74,1	27,3	33,8	22,7	21,5	2,5	1,2
No ha practicado ningún deporte	61,4	69,1	29,4	37,6	23,4	24,2	4,8	3,5
Ha leído libros para divertirse	61,6	69,3	21,6	29,0	18,0	18,3	1,9	1,1
No ha leído libros para divertirse	74,3	83,1	33,2	46,7	27,6	30,2	3,4	2,6
Ha salido con amigos por las noches	81,6	85,0	36,1	43,1	31,1	28,3	3,7	2,1
No ha salido con amigos por las noches	43,3	50,1	11,4	16,4	7,8	9,0	0,9	0,5
Ha salido con amigos por las tardes	69,7	74,4	28,3	34,9	23,8	22,3	2,7	1,5
No ha salido con amigos por las tardes	40,3	42,5	11,4	16,3	7,2	8,0	1,9	3,0
Tiene otros hobbies	66,0	69,9	26,1	29,6	22,1	19,1	2,2	1,1
No tiene otros hobbies	70,4	80,4	28,9	43,5	23,6	27,3	3,1	2,6
Ha usado Internet para divertirse	68,1	73,5	27,3	34,2	22,8	21,8	2,6	1,5
No ha usado Internet para divertirse	59,3	64,4	29,2	29,6	19,5	31,5	9,1	9,8
Ha visitado paginas solo para adultos	75,3	83,0	32,1	46,4	27,3	33,1	3,2	2,6
No ha visitado páginas solo para adultos	45,7	69,0	13,2	28,7	9,5	16,8	1,1	1,1
Realiza compras en internet	71,5	74,7	29,2	35,1	24,5	22,4	2,8	1,5
No realiza compras en internet	45,7	52,1	15,5	19,2	11,9	12,3	1,5	2,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.324.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.

	TOTAL	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Nunca	25,3	25,6	24,9	35,8	29,6	22,2	18,7	18,2
Menos de una noche al mes	17,5	16,9	18,1	16,2	17,7	16,7	18,3	19,8
De 1 a 3 noches al mes	18,3	17,9	18,7	14,7	16,2	19,8	21,3	18,9
1 noche a la semana	11,5	11,0	11,9	8,7	10,0	12,0	13,8	13,2
2 noches a la semana	16,2	16,6	15,8	14,0	14,9	17,9	16,7	18,2
3-4 noches a la semana	6,5	6,9	6,0	6,3	6,6	6,8	5,9	6,7
Más de 4 noches a la semana	4,8	4,9	4,6	4,1	4,9	4,6	5,2	5,1


H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.325.

Frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2021.

	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021
Nunca	11,8	10,7	11,8	7,2	8,7	8,7	10,1	25,3
Menos de una noche al mes	11,7	11,0	12,7	15,1	17,7	17,6	19,6	17,5
De 1 a 3 noches al mes	23,6	22,1	26,2	28,8	30,1	28,7	30,3	18,3
1 noche a la semana	18,5	17,3	18,4	17,9	17,0	17,2	16,1	11,5
2 noches a la semana	24,5	26,7	22,1	19,9	18,6	19,3	16,8	16,2
3-4 noches a la semana	5,9	6,8	4,7	4,8	4,7	5,2	4,2	6,5
Más de 4 noches a la semana	3,9	5,3	3,6	3,2	3,3	3,3	2,9	4,8



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.326.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
Nunca	41,8	11,6	6,3	0,5
Menos de una noche al mes	71,1	25,1	18,3	1,6
De 1 a 3 noches al mes	79,4	34,5	26,8	1,8
1 noche a la semana	83,0	38,5	27,9	3,2
2 noches a la semana	87,7	46,2	34,2	3,6
3-4 noches a la semana	90,9	52,2	41,2	5,0
Más de 4 noches a la semana	89,2	56,1	44,3	6,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.327.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2021.

	Alcohol		Tabaco		Cannabis		Cocaína polvo y/o base	
	H	M	H	M	H	M	H	M
Nunca	38,8	45,1	9,6	13,8	5,8	6,8	0,5	0,5
Menos de una noche al mes	67,2	74,9	21,0	29,2	17,7	18,8	2,1	1,1
De 1 a 3 noches al mes	76,6	82,2	29,1	39,9	26,2	27,3	2,3	1,3
1 noche a la semana	79,6	86,3	34,3	42,7	28,3	27,6	3,7	2,8
2 noches a la semana	86,4	89,2	43,0	49,6	36,2	32,1	4,9	2,2
3-4 noches a la semana	91,6	90,0	52,1	52,3	46,1	35,3	5,8	4,0
Más de 4 noches a la semana	87,5	91,0	53,9	58,5	49,1	39,0	8,7	4,0

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.328.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.



* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.329.

Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.

	Binge drinking	Borracheras últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Consumo problemático cannabis (CAST ≥ 4)
Nunca	7,8	4,7	11,1	0,4
Menos de una noche al mes	18,4	14,3	36,4	2,2
De 1 a 3 noches al mes	33,9	28,9	49,7	2,8
1 noche a la semana	40,6	35,1	55,0	3,7
2 noches a la semana	46,9	41,8	64,0	5,4
3-4 noches a la semana	50,5	43,5	69,1	7,5
Más de 4 noches a la semana	53,7	43,3	67,8	8,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.330.

Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según sexo (%). España, 2021.

	Binge drinking		Borracheras últimos 30 días		Botellón últimos 12 meses		Consumo problemático cannabis (CAST ≥ 4)	
	H	M	H	M	H	M	H	M
Nunca	5,9	9,9	3,6	5,9	9,1	13,2	0,6	0,3
Menos de una noche al mes	17,6	19,3	11,9	16,7	32,5	40,2	2,3	2,1
De 1 a 3 noches al mes	30,7	37,0	25,9	32,0	45,6	53,8	2,6	3,1
1 noche a la semana	39,3	41,9	32,1	38,0	52,0	57,9	4,7	2,7
2 noches a la semana	44,3	49,7	37,6	46,4	63,9	64,1	7,1	3,5
3-4 noches a la semana	50,0	51,1	42,1	45,2	68,9	69,4	9,5	5,0
Más de 4 noches a la semana	53,4	54,1	41,0	45,8	65,3	70,7	10,3	5,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.331.

Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.


	Una	Dos	Tres	Cuatro o más
Nunca	32,3	9,8	4,4	1,4
Menos de una noche al mes	41,4	16,1	11,8	4,9
De 1 a 3 noches al mes	38,9	18,8	17,0	7,5
1 noche a la semana	38,7	18,5	19,2	8,3
2 noches a la semana	34,2	22,2	22,3	10,6
3-4 noches a la semana	31,3	22,2	26,7	11,9
Más de 4 noches a la semana	28,5	22,4	23,7	17,4

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.332.


Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.333.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.334.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.335.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.336.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.337.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.338.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.



Han tenido un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	0,4	2,2	2,8	3,7	5,4	7,5	8,2
No han tenido un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	99,6	97,8	97,2	96,3	94,6	92,5	91,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.
FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.339.

Prevalencia de consumo de drogas legales* e ilegales** entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2021.

	Han consumido drogas legales	Han consumido drogas ilegales	No han consumido drogas legales
Nunca	48,6	6,6	51,4
Menos de una noche al mes	74,4	18,9	25,6
De 1 a 3 noches al mes	82,5	27,4	17,5
1 noche a la semana	85,0	29,2	15,0
2 noches a la semana	89,2	35,2	10,8
3-4 noches a la semana	92,2	42,2	7,8
Más de 4 noches a la semana	91,9	45,2	8,1

* Drogas legales: tabaco, alcohol e hipnosedantes con/sin receta.
** Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.340.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y edad (%). España, 2021.


14-18 años			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Antes de las 12 de la noche																	
54,2	50,7	57,8	66,8	64,6	69,0	59,8	58,2	61,3	51,5	48,0	55,2	46,8	43,3	50,6	44,4	36,0	54,0
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada																	
12,7	13,4	12,0	14,6	16,0	13,2	14,8	13,9	15,6	13,6	14,7	12,4	10,6	12,0	9,2	7,0	7,5	6,3
Entre la 1 y las 2 de la madrugada																	
7,1	7,6	6,6	6,4	7,1	5,9	7,5	7,8	7,2	7,9	8,4	7,4	6,5	6,7	6,1	7,3	8,7	5,6
Entre las 2 y las 3 de la madrugada																	
5,9	6,2	5,5	3,9	3,6	4,2	5,6	6,3	5,0	6,9	7,3	6,5	6,1	6,5	5,8	6,2	6,7	5,6
Entre las 3 y las 4 de la madrugada																	
5,4	5,8	5,1	3,6	3,7	3,5	3,9	4,4	3,4	5,8	6,6	5,0	7,2	6,8	7,6	6,9	7,6	6,1
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana																	
7,3	7,9	6,6	2,2	2,5	2,0	4,1	4,7	3,6	6,4	6,3	6,6	12,0	12,9	10,9	15,0	16,8	12,8
Después de las 8 de la mañana																	
7,3	8,3	6,3	2,5	2,6	2,3	4,3	4,7	3,9	7,9	8,7	7,0	10,8	11,7	9,8	13,4	16,7	9,6

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.341.

Hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2006-2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.342.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2021.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
No ha salido	43,4	12,2	6,9	0,6
Antes de las 12 de la noche	71,1	27,6	18,1	1,3
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	77,8	31,0	21,7	1,3
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	86,4	36,9	27,0	3,2
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	88,4	44,6	32,2	2,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	93,7	52,8	43,1	4,2
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	96,1	60,3	52,1	6,4
Después de las 8 de la mañana	95,3	66,1	60,6	9,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.343.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según sexo (%). España, 2021.


	Alcohol		Tabaco		Cannabis		Cocaína polvo y/o base	
	H	M	H	M	H	M	H	M
No ha salido	40,6	46,4	9,9	14,7	6,3	7,7	0,7	0,5
Antes de las 12 de la noche	67,2	74,7	22,8	31,8	18,3	18,0	1,5	1,0
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	72,8	83,4	26,2	36,3	20,6	22,9	1,4	1,3
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	84,5	88,5	32,9	41,5	26,9	27,2	3,6	2,7
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	85,6	91,7	42,2	47,4	33,2	31,2	3,1	1,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	93,2	94,2	47,1	59,4	42,9	43,3	5,7	2,5
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	95,7	96,6	55,2	66,5	52,7	51,4	7,8	4,7
Después de las 8 de la mañana	95,4	95,2	63,9	69,1	61,9	58,9	11,0	7,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.344.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales* e ilegales**) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2021.



* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes.

** Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.345.


Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa y según sexo (última salida en fin de semana) (%). España, 2021.

	Legales		Ilegales	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Antes de las 12 de la noche	70,3	78,3	19,2	18,6
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	75,7	86,1	21,2	23,7
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	85,5	90,1	27,5	27,6
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	86,6	92,1	34,0	31,6
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	95,1	96,1	43,7	43,9
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	96,1	98,1	54,2	51,9
Después de las 8 de la mañana	96,3	96,1	63,2	59,2

* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes. Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.346.

Número de sustancias psicoactivas legales e ilegales* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2021.



	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Antes de las 12 de la noche	39,0	18,3	12,7	4,4
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	41,5	18,9	14,3	5,8
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	41,9	19,8	18,2	7,1
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	36,7	20,0	23,3	9,4
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	35,5	20,3	26,2	13,4
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	27,4	21,4	32,3	15,9
Después de las 8 de la mañana	22,1	18,1	32,3	24,0

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables, GHB.
FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.347.

Prevalencia de binge drinking, borracheras (últimos 30 días), hacer botellón (últimos 12 meses) y consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2021.

	Total estudiantes 14-18 años	Binge drinking últimos 30 días	Borrachera últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)
Antes de las 12 de la noche	54,2	26,3	22,2	38,5	13,2
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	12,7	29,0	21,7	47,9	18,6
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	7,1	32,4	27,0	56,1	15,7
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	5,9	41,7	36,3	63,4	17,5
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	5,4	47,6	39,0	73,0	17,1
Entre las 4 y las 8 de la mañana	7,3	56,4	51,4	78,4	20,0
Después de las 8 de la mañana	7,3	62,0	56,5	77,8	27,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.348.

Prevalencia de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días, botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según sexo (%). España, 2021.

	Total estudiantes 14-18 años		Binge drinking últimos 30 días		Borrachera últimos 30 días		Botellón últimos 12 meses		Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Antes de las 12 de la noche	50,7	57,8	23,3	28,9	18,8	25,2	34,8	41,8	2,1	1,4
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	13,4	12,0	24,8	33,8	16,9	27,0	43,0	53,5	3,0	3,0
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	7,6	6,6	30,7	34,5	22,9	31,6	52,6	60,1	3,9	2,4
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	6,2	5,5	40,7	42,8	31,8	41,3	61,4	65,7	5,1	3,4
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	5,8	5,1	46,0	49,4	36,1	42,2	69,2	77,3	6,5	4,3
Entre las 4 y las 8 de la mañana	7,9	6,6	56,5	56,2	48,9	54,4	78,7	78,0	10,2	5,3
Después de las 8 de la mañana	8,3	6,3	66,2	56,4	59,1	53,2	78,0	77,5	14,7	13,6

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.349.

Dinero gastado a la semana (euros) para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de tipo de estudios, titularidad del centro y notas que sacan habitualmente. España, 2021.

	Total estudiantes 14-18 años	Titularidad centro		Tipo de estudios					Notas que sacan	
		Público	Privado	ESO	Bach	FPB	FPGM	Sobr-notable	Bien-aprobado	Suspenso
Dinero gastado para salir	13,74	13,46	14,32	12,23	14,27	17,42	19,18	12,82	14,27	16,01

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.350.


Dinero gastado a la semana (euros) para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de si han faltado a clase y si han repetido curso. España, 2021.

	Total estudiantes	Faltar a clase (hacer pellas)		Repetir curso	
		Sí	No	Sí	No
Dinero gastado para salir	13,74	17,20	12,70	17,07	12,88

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.351.


Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad. España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.352.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2021.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.353.

Situación económica de la familia entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias en los últimos 30 días. España, 2021.

	Total estudiantes 14-18 años	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína
Por encima de la media	12,7	13,7	13,7	13,5	21,7
Más o menos como la media	82,8	81,7	80,7	79,7	64,5
Por debajo de la media	4,5	4,5	5,6	6,8	13,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.354.

Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2021.

	Notas saca habitualmente			Repetido curso alguna vez	
	Sobresaliente/notable	Aprobado/bien	Suspenso	Sí	No
Total alumnos	50,1	43,3	6,6	20,9	79,1
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	45,8	46,3	7,9	25,0	75,0
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	55,0	39,9	5,1	15,8	84,2
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	45,3	46,2	8,5	25,1	74,9
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	52,1	42,1	5,8	18,9	81,1
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	42,7	48,5	8,8	27,5	72,5
No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	53,1	41,2	5,7	18,1	81,9
Ha hecho botellón en el último año	47,2	45,0	7,7	21,4	78,6
No ha hecho botellón en el último año	52,3	42,1	5,7	20,2	79,8
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	28,4	56,7	14,9	45,7	54,3
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	52,4	41,9	5,7	18,3	81,7
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	35,2	53,5	11,3	33,8	66,2
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	52,9	41,3	5,7	18,3	81,7
Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	22,5	62,7	14,8	51,0	49,0
Consumo de cannabis (CAST < 4)	50,9	42,8	6,3	19,9	80,1

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.355.

Dinero gastado a la semana (euros) para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los hobbies que practican. España, 2021.

		Dinero gastado para salir
Total alumnos		13,74
Practico algún deporte	Poco	15,26
	Mucho	13,50
Leo libros	Poco	14,61
	Mucho	12,28
Salgo con amigos por las noches	Poco	10,93
	Mucho	15,86
Salgo con amigos por las tardes	Poco	15,19
	Mucho	13,67
Otros hobbies (toco un instrumento...)	Poco	14,87
	Mucho	12,60
Uso internet para divertirme	Poco	19,38
	Mucho	13,67
Visito páginas sólo para adultos	Poco	13,19
	Mucho	14,39
Voy de compras o compro a través de internet	Poco	11,09
	Mucho	14,79

Poco: (de 1 a 3 días al año o nunca).

Mucho: (diariamente o casi diariamente).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.356.

Dinero gastado a la semana (euros) para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses. España, 2021.

	Dinero gastado para salir
Nunca	10,6
Menos de una noche al mes	11,4
De 1 a 3 noches al mes	13,3
1 noche a la semana	14,9
2 noches a la semana	16,5
3-4 noches a la semana	17,1
Más de 4 noches a la semana	21,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.357.

Dinero gastado a la semana (euros) para salir con los amigos, ir al cine, ir a tomar algo... entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). España, 2021.

	Dinero gastado para salir
Antes de las 12 de la noche	12,9
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	13,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	13,8
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	14,8
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	16,5
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	19,1
Después de las 8 de la mañana	20,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.358.

Prevalencia de comportamientos relacionados con el rendimiento escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2021.

	Últimos 30 días ha hecho pellas	Últimos 12 meses no ha podido concentrarse en el colegio al día siguiente de salir	Últimos 12 meses ha sido expulsado del centro educativo
Total alumnos	21,4	17,2	5,9
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	30,5	25,6	7,9
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	10,9	7,6	3,5
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	39,3	34,5	9,3
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	15,6	11,7	4,5
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	37,5	32,7	9,7
No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	15,0	11,2	4,4
Ha hecho botellón en los últimos 30 días	32,0	27,9	8,2
No ha hecho botellón en los últimos 30 días	14,0	9,6	4,2
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	53,2	38,2	18,4
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	18,2	15,1	4,6
Ha consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	33,8	30,5	8,7
No han consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	20,3	16,1	5,6
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	46,7	36,0	15,0
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	16,9	13,9	4,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.359.

Evolución de la prevalencia de bullying (acoso) a través de internet o por otros medios (acoso directo o indirecto físico, verbal, psicológico, sexual o social) en los últimos 12 meses, según sexo (%). España, 2016-2021.

	Total	Hombres	Mujeres
2016	7,2	5,3	9,1
2019	9,4	7,5	11,3
2021	10,7	7,9	13,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.360.

Evolución de la prevalencia de bullying (acoso) exclusivamente a través de internet, según sexo (%). España, 2014-2021.

	Total	Hombres	Mujeres
2014	9,7	10,3	9,2
2016	6,7	5,0	8,5
2019	8,7	7,7	9,6
2021	8,7	13,0	10,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.361.

Conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y viajar como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2021.

	Total	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol	2,6	3,5	1,6	0,5	1,4	3,0	3,9	6,0	2,3
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de hachís o marihuana	1,5	2,2	0,8	0,3	1,1	1,7	2,0	4,1	1,3
He conducido un vehículo de moto bajo los efectos de cocaína	0,3	0,5	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol	15,0	13,7	16,3	9,0	10,9	15,4	20,7	23,7	14,3
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de hachís o marihuana	6,9	7,4	6,4	1,9	4,2	7,1	10,7	15,1	6,2
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de cocaína	1,6	1,8	1,4	0,5	1,3	1,7	2,2	3,4	1,5

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.362.

Prevalencia de experimentar ciertas situaciones en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (%). España, 2021.

	Discusión familiar	No recordar noche anterior	Tener resaca	Rel. sexuales sin preservativo	Sufrir bullying
TOTAL ALUMNOS	40,6	17,9	31,4	16,3	10,7
Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	47,0	29,5	52,2	25,2	11,0
No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	33,2	4,9	8,0	6,2	10,4
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	51,8	46,5	74,0	33,6	9,6
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	36,9	8,9	17,9	10,7	10,9
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	50,3	41,7	67,6	32,8	10,8
No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	36,8	8,7	17,4	9,9	10,6
Ha hecho botellón en los últimos 30 días	50,1	35,0	61,1	26,9	9,7
No ha hecho botellón en los últimos 30 días	33,8	6,0	10,7	8,9	11,3
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	58,3	41,1	66,5	49,0	13,2
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	38,8	15,5	27,8	13,1	10,3
Ha consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	61,8	28,1	41,6	26,0	22,7
No han consumido hipnosedantes en los últimos 30 días	38,9	17,1	30,7	15,6	9,7
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	55,6	42,9	66,9	42,7	12,9
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	38,0	13,7	25,3	11,8	10,3
Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4)	65,4	56,4	74,5	58,4	13,4
Consumo de cannabis (CAST<4)	39,8	16,8	30,1	15,0	10,6
Ha consumido cocaína en los últimos 12 meses	57,1	50,4	65,4	57,7	15,9
No ha consumido cocaína en los últimos 12 meses	40,1	17,2	30,7	15,4	10,5

Las definiciones completas son las siguientes: Ha tenido un conflicto o discusión importante con padres o hermanos. No ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior después de haber salido. Ha tenido resaca. Ha tenido relaciones sexuales sin preservativo. Ha sufrido bullying (acoso) a través de internet o por otros medios.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.363.

Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Alcohol	2,5	3,9	1,1	2,7	4,0	1,5	2,6	3,5	1,6
Cannabis	1,8	2,9	0,8	1,9	3,0	0,9	1,5	2,2	0,8
Cocaína	0,3	0,6	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.364.


Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016-2021.

	2016			2019			2021		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Alcohol	17,2	16,4	17,9	18,9	17,2	20,5	15,0	13,7	16,3
Cannabis	9,1	9,4	8,8	9,4	9,8	9,0	6,9	7,4	6,4
Cocaína	1,8	2,1	1,4	1,9	2,1	1,7	1,6	1,8	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.365.

Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor que conducía bajo los efectos del alcohol o alguna droga ilegal entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2019-2021.




T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.366.

Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido alcohol o alguna droga ilegal, según sexo (%). España, 2019-2021.



	2019			2021		
	T	H	M	T	H	M
Pela bajo los efectos del alcohol u otra droga	6,3	8,0	4,6	4,8	6,2	3,3

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).



Problemas relacionados con las drogas

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2020

2.1.1.


Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2020.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1996-2020.



	Heroina	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Anfetaminas	Éxtasis	Alucinógenos	Otras sustancias*
1996	46.635	2.980	1.613	168	319	226	74	875
1997	44.089	4.647	2.214	263	323	237	85	582
1998	43.598	6.154	2.879	346	347	154	62	798
1999	37.417	8.978	2.826	331	339	135	50	1.406
2000	34.563	8.272	2.895	381	288	240	64	2.784
2001	32.305	9.023	3.506	469	255	335	83	3.400
2002	26.213	11.904	4.772	592	342	452	68	2.401
2003	23.225	18.359	5.711	607	266	254	63	1.618
2004	20.532	21.646	6.500	693	330	236	44	1.955
2005	18.653	23.746	5.524	618	386	229	39	1.435
2006	18.803	22.242	5.304	717	426	165	37	1.589
2007	18.904	23.037	5.936	795	415	172	43	1.253
2008	17.456	24.680	7.419	845	400	155	43	2.157
2009	16.989	23.132	9.503	963	461	127	69	1.305
2010	17.325	22.087	11.192	944	501	93	66	1.226
2011	13.898	20.335	12.873	1.143	595	102	83	1.252
2012	12.238	19.497	14.869	1.083	512	134	107	1.238
2013	11.756	19.848	16.848	1.175	671	201	120	1.327
2014	10.911	17.864	16.478	1.192	635	133	82	1.631
2015	10.978	17.327	15.676	1.068	636	157	77	1.389
2016	10.807	17.889	13.304	1.105	699	89	82	1.662
2017	10.384	20.168	12.932	1.032	608	68	73	1.534
2018	10.086	20.981	13.459	1.050	662	72	76	1.586
2019	9.904	22.345	14.202	992	720	96	127	1.649
2020	7.652	17.490	10.587	824	580	72	112	1.227


* Otras sustancias incluye: metadona, otros opiáceos y otras sustancias sin especificar.

Datos anteriores a 2004 (hemos cogido los más consistentes) pero en algunos documentos aparecen otros.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales y por alcohol. España, 1998-2020.




	Drogas ilegales	Alcohol
1998	54.338	-
2002	46.744	-
2004	52.128	-
2005	50.630	18.950
2006	49.283	19.454
2007	50.555	19.224
2008	53.155	26.318
2009	52.549	27.958
2010	53.434	28.111
2011	50.281	29.014
2012	49.678	28.234
2013	51.946	28.652
2014	48.926	27.658
2015	47.308	27.469
2016	45.637	26.655
2017	46.799	25.753
2018	47.972	25.796
2019	50.035	27.209
2020	38.544	20.017

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2020.




	Total admisiones	Primeras admisiones	Con tratamiento previo
1998	54.338	-	-
1999	51.482	19.757	-
2000	49.487	17.135	-
2001	49.376	17.591	-
2002	46.744	22.064	-
2003	50.103	22.066	-
2004	52.128	25.064	-
2005	50.630	24.553	23.714
2006	49.283	22.333	24.814
2007	50.555	23.034	25.392
2008	53.155	22.944	27.769
2009	52.549	24.605	25.098
2010	53.434	26.805	24.611
2011	50.281	24.999	23.232
2012	49.678	25.209	23.024
2013	51.946	28.239	22.577
2014	48.926	23.656	18.786
2015	47.308	23.777	19.519
2016	45.637	22.816	20.124
2017	46.799	23.738	21.353
2018	47.972	24.663	21.382
2019	50.035	27.492	20.689
2020	38.544	20.006	17.154

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2020.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	30.146	2006	3.318	14.502	18.803
1992	20.017	15.956	37.239	2007	3.672	14.331	18.904
1993	18.977	16.703	37.188	2008	3.840	13.616	17.456
1994	18.770	17.526	37.225	2009	3.412	12.750	16.989
1995	17.878	20.369	40.007	2010	4.526	12.166	17.325
1996	16.647	28.382	46.635	2011	2.951	10.391	13.898
1997	12.993	30.173	44.089	2012	2.555	9.302	12.238
1998	11.867	30.756	43.598	2013	2.572	8.940	11.756
1999	10.473	26.031	37.417	2014*	2.356	8.555	10.911
2000	8.151	26.412	34.563	2015	2.202	7.713	10.978
2001	7.461	24.844	32.305	2016	2.353	7.907	10.807
2002	5.051	21.162	26.213	2017	2.259	7.775	10.384
2003	4.337	17.867	23.225	2018	2.223	7.530	10.086
2004	3.836	15.617	20.532	2019	2.384	7.177	9.904
2005	3.604	14.005	18.653	2020	1.771	5.594	7.652


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2020.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	–	2006	13.463	8.036	22.242
1992	932	367	–	2007	13.429	8.753	23.037
1993	1.146	431	–	2008	12.847	10.786	24.680
1994	1.265	491	–	2009	12.142	9.107	23.132
1995	1.415	516	–	2010	12.130	9.095	22.087
1996	1.892	932	–	2011	10.637	8.889	20.335
1997	3.129	1.402	–	2012	10.142	8.855	19.497
1998	4.174	1.838	–	2013	10.734	8.726	19.848
1999	6.126	2.576	–	2014*	9.683	8.182	17.864
2000	5.499	2.773	–	2015	8.445	7.248	17.327
2001	5.977	3.046	–	2016	9.052	7.678	17.889
2002	7.125	3.893	11.904	2017	10.393	9.025	20.168
2003	11.851	5.893	18.359	2018	10.871	9.226	20.981
2004	14.126	6.747	21.646	2019	12.491	8.989	22.345
2005	15.258	7.562	23.746	2020	9.092	7.744	17.490


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2020.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	1.300	230	–	2008	5.058	2.055	7.419
1997	1.768	387	–	2009	7.273	1.705	9.503
1998	2.412	407	–	2010	8.639	2.101	11.192
1999	2.335	418	–	2011	9.736	2.603	12.873
2000	2.487	408	–	2012	10.982	3.402	14.869
2001	2.966	540	–	2013	12.912	3.585	16.914
2002	3.972	665	4.772	2014*	12.968	3.510	16.478
2003	4.613	871	5.711	2015	11.185	3.448	15.676
2004	5.319	928	6.500	2016	9.278	3.208	13.304
2005	4.426	844	5.524	2017	9.122	3.314	12.932
2006	4.125	941	5.304	2018	9.485	3.386	13.459
2007	4.619	1.114	5.936	2019	10.378	3.306	14.202
				2020	7.334	2.893	10.587

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2020.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	–	2008	463	352	845
1997	144	111	–	2009	598	312	963
1998	197	143	–	2010	580	323	944
1999	165	147	–	2011	709	386	1.143
2000	214	154	–	2012	648	421	1.083
2001	299	170	–	2013	787	374	1.175
2002	350	242	–	2014*	871	321	1.192
2003	382	225	–	2015	742	256	1.068
2004	441	224	693	2016	772	282	1.105
2005	383	209	618	2017	721	269	1.032
2006	466	223	717	2018	744	261	1.050
2007	503	261	795	2019	715	242	992
				2020	595	201	824


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de estimulantes distintos de la cocaína: anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis. España, 1996-2020.




	Anfetaminas	Metanfetaminas	Éxtasis		Anfetaminas	Metanfetaminas	Éxtasis
1996	319	-	226	2008	400	-	155
1997	323	-	237	2009	461	-	127
1998	347	-	154	2010	501	-	93
1999	339	-	135	2011	595	-	102
2000	288	-	240	2012	512	-	134
2001	255	-	335	2013	671	-	201
2002	342	-	452	2014	635	20	133
2003	266	-	254	2015	636	38	157
2004	330	-	236	2016	699	55	89
2005	386	-	229	2017	608	81	68
2006	426	-	165	2018	662	93	72
2007	415	-	172	2019	716	119	96
				2020	580	129	72

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alucinógenos (ketamina u otros alucinógenos). España, 2005-2020.




	Alucinógenos*	Ketamina	Otros alucinógenos
2005	39	8	31
2006	37	10	27
2007	43	22	21
2008	43	20	23
2009	69	43	26
2010	66	46	20
2011	83	54	29
2012	107	66	41
2013	120	70	50
2014	82	49	33
2015	77	42	35
2016	82	54	28
2017	73	52	21
2018	76	53	23
2019	127	91	36
2020	112	83	29

* Alucinógenos incluye ketamina y otros alucinógenos.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2020.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950
2006	10.172	8.611	19.454
2007	9.898	8.587	19.224
2008	9.395	9.753	26.318
2009	10.924	11.288	27.958
2010	15.126	11.764	28.111
2011	11.612	10.350	29.014
2012	14.816	12.714	28.234
2013	15.121	12.978	28.652
2014*	15.240	12.418	27.658
2015	13.457	11.254	27.469
2016	13.319	11.323	26.655
2017	13.060	11.556	25.753
2018	13.243	11.224	25.796
2019	14.907	11.215	27.209
2020	10.501	8.705	20.017


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de diferentes sustancias como droga principal. España, 2014-2020.




	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fentanilo	28	44	70	66	100	103	79
Catinona	1	5	1	2	5	10	2
Mefedrona	0	8	0	35	38	74	102
Spice	2	3	5	1	5	14	25
Legal high	1	1	0	0	1	0	0
Tramadol	27	24	28	24	33	37	31

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13

Número* de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento) que utilizan la vía intravenosa. España, 1996-2020.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237
2014**	6.360	1.664
2015	5.904	2.413
2016	6.117	2.621
2017	5.946	2.691
2018	5.223	2.161
2019	4.877	1.977
2020	3.692	1.545


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Número* de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez) que utilizan la vía intravenosa. España, 1996-2020.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530
2014**	1.065	261
2015	1.038	367
2016	1.141	416
2017	1.150	471
2018	1.039	392
2019	1.034	428
2020	752	335


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2020.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7	2004	35,4	20,8
1988	25,4	19,8	2005	35,6	20,6
1989	25,7	19,8	2006	36,4	20,3
1990	26,2	20,0	2007	36,8	21,0
1991	26,4	20,3	2008	37,5	21,1
1992	26,6	20,3	2009	37,9	20,9
1993	27,2	20,3	2010	38,4	21,4
1994	27,8	20,6	2011	39,3	20,8
1995	28,5	20,6	2012	40,4	20,7
1996	29,3	20,6	2013	40,8	20,9
1997	30,0	20,7	2014	40,9	21,1
1998	30,7	20,6	2015	41,3	21,5
1999	31,3	20,8	2016	41,6	21,1
2000	32,0	20,6	2017	42,6	21,5
2001	32,0	20,8	2018	43,0	21,7
2002	33,6	20,9	2019	43,2	22,0
2003	33,9	20,7	2020	43,8	22,1

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2020.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6	2006	33,0	21,5
1992	26,0	20,6	2007	34,1	23,3
1993	26,4	20,7	2008	35,0	22,9
1994	27,3	21,0	2009	34,5	22,8
1995	27,9	21,2	2010	35,0	23,5
1996	28,6	21,3	2011	36,7	22,6
1997	29,2	21,4	2012	38,1	22,4
1998	29,9	21,2	2013	38,2	22,3
1999	30,3	21,8	2014	37,9	23,5
2000	30,9	22,1	2015	38,0	23,8
2001	31,4	22,3	2016	38,2	23,5
2002	31,8	22,6	2017	39,9	24,1
2003	31,9	22,3	2018	40,1	24,6
2004	33,0	22,8	2019	40,1	25,3
2005	33,0	22,0	2020	40,1	25,5

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2020.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9	2003	29,8	21,3
1988	26,1	21,3	2004	30,0	21,3
1989	26,2	21,2	2005	30,5	21,0
1990	26,5	21,4	2006	31,2	20,8
1991	27,0	21,9	2007	31,7	21,2
1992	27,6	22,1	2008	32,1	21,0
1993	27,9	22,0	2009	32,5	20,7
1994	28,5	22,0	2010	33,3	20,9
1995	29,1	22,5	2011	33,9	20,7
1996	29,3	22,3	2012	34,5	20,7
1997	29,1	22,2	2013	35,0	20,6
1998	29,1	22,1	2014	35,3	20,6
1999	28,6	21,7	2015	36,0	20,7
2000	29,1	21,5	2016	36,0	20,4
2001	29,8	21,6	2017	36,6	20,6
2002	29,8	21,9	2018	36,6	20,7
			2019	36,9	20,9
			2020	37,5	21,0

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2020.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9	2006	30,4	20,9
1992	27,2	22,3	2007	30,8	21,5
1993	27,6	22,3	2008	31,2	21,1
1994	28,2	22,2	2009	31,6	20,9
1995	28,6	22,6	2010	32,4	21,2
1996	28,8	22,4	2011	33,0	21,1
1997	28,6	22,4	2012	33,4	21,1
1998	28,4	22,2	2013	33,9	21,0
1999	27,8	21,9	2014	34,1	20,8
2000	28,2	21,6	2015	34,8	21,1
2001	29,0	21,8	2016	34,8	21,1
2002	28,8	21,7	2017	35,4	21,2
2003	28,8	21,5	2018	35,3	21,4
2004	29,1	21,4	2019	35,7	21,5
2005	30,0	21,1	2020	36,3	21,8

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.19.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2020.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada		Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6.188	7.164	822	2006	2.320	486	303
1992	9.585	8.232	1.219	2007	2.842	470	327
1993	10.493	7.129	995	2008	2.891	455	285
1994	10.873	6.435	978	2009	2.719	386	256
1995	11.161	5.033	1.028	2010	3.589	465	258
1996	10.934	4.488	696	2011	2.211	365	201
1997	8.487	3.011	887	2012	1.870	276	159
1998	7.884	2.518	910	2013	2.047	283	175
1999	7.033	1.969	968	2014	1.670	154	125
2000	5.917	1.414	532	2015	1.831	167	145
2001	5.461	1.276	471	2016	1.982	186	146
2002	3.540	894	399	2017	1.870	209	147
2003	2.805	748	386	2018	1.892	141	128
2004	2.690	648	358	2019	2.039	147	150
2005	2.487	544	350	2020	1.524	104	99

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.
FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.20.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2020.




	Pulmonar	Intravenosa	Esnifada		Pulmonar	Intravenosa	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8	2006	73,8	15,5	9,6
1992	50,0	42,9	6,4	2007	77,4	12,8	8,9
1993	56,1	38,1	5,3	2008	78,5	12,4	7,7
1994	59,2	35,0	5,3	2009	79,7	11,3	7,5
1995	64,5	29,1	5,9	2010	82,0	10,6	5,9
1996	67,0	27,5	4,3	2011	77,7	12,8	7,1
1997	67,2	23,8	7,0	2012	78,3	11,6	6,7
1998	68,3	21,8	7,9	2013	79,6	11,0	6,8
1999	69,3	19,4	9,5	2014	80,6	7,4	6,0
2000	74,1	17,7	6,7	2015	83,7	7,6	6,6
2001	74,9	17,5	6,5	2016	84,7	7,9	6,2
2002	71,8	18,1	8,1	2017	83,0	9,3	6,5
2003	69,3	18,5	9,5	2018	85,8	6,4	5,8
2004	68,0	16,4	9,0	2019	86,1	6,2	6,3
2005	69,0	15,1	9,7	2020	86,1	5,9	5,6

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general) , según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2020.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada		Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	315	139	109	2006	11.155	1.617	103
1992	547	196	121	2007	11.393	1.295	130
1993	611	278	108	2008	10.391	1.276	117
1994	714	238	97	2009	10.272	1.139	136
1995	739	287	74	2010	9.952	1.203	166
1996	1.307	413	82	2011	8.787	1.205	97
1997	2.172	741	100	2012	8.346	781	95
1998	3.073	856	128	2013	8.995	1.320	129
1999	4.777	1.048	128	2014	6.798	986	56
2000	4.067	1.172	105	2015	7.005	1.078	30
2001	4.413	1.284	91	2016	7.564	1.107	33
2002	5.613	1.403	156	2017	8.730	1.304	36
2003	9.228	1.242	485	2018	9.030	1.435	41
2004	11.140	1.837	693	2019	10.464	1.482	35
2005	12.298	1.755	793	2020	7.626	1.087	26

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.
FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2020.




	Esnifada	Pulmonar	Intravenosa		Esnifada	Pulmonar	Intravenosa
1991	55,4	24,4	19,2	2006	86,0	12,5	0,8
1992	62,7	22,5	13,9	2007	88,0	10,0	1,0
1993	60,8	27,7	10,7	2008	86,9	10,7	1,0
1994	67,4	22,5	9,2	2009	87,7	9,7	1,2
1995	66,5	25,8	6,7	2010	86,8	10,5	1,4
1996	71,7	22,6	4,5	2011	85,5	11,7	0,9
1997	71,0	24,2	3,3	2012	88,3	8,3	1,0
1998	74,8	20,8	3,3	2013	83,8	12,3	1,2
1999	79,5	17,4	2,1	2014	82,6	12,0	0,7
2000	75,2	21,7	1,9	2015	83,5	12,9	0,4
2001	75,2	21,9	1,6	2016	83,9	12,3	0,4
2002	77,0	19,2	2,1	2017	84,3	12,6	0,3
2003	83,0	11,2	4,4	2018	83,6	13,3	0,4
2004	80,9	13,3	4,8	2019	84,2	11,9	0,3
2005	80,6	11,5	5,2	2020	84,4	12,0	0,3

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.23.

Proporción de tratados por primera vez por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parenteral, según CCAA. España, 1991-2020.



2.1.24.

Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2020.



	Opioides	Cocaína	Estimulantes sin cocaína	Cannabis	Hipnosedantes
2005	5,7	57,4	5,9	42,7	8,9
2006	6,1	58,7	5,2	44,1	9,0
2007	6,4	58,0	4,6	43,3	8,5
2008	6,1	66,1	4,3	49,1	10,6
2009	5,9	61,5	3,9	50,9	9,8
2010	6,6	63,4	4,3	52,0	9,9
2011	6,5	63,7	4,9	51,6	9,3
2012	7,1	62,1	4,6	52,9	10,1
2013	6,7	60,8	4,8	53,5	9,1
2014	4,5	56,7	2,8	48,3	8,1
2015	5,3	60,3	4,4	51,4	8,2
2016	4,4	62,3	4,1	51,1	7,3
2017	4,5	64	4	49,5	8
2018	4,1	64,5	3,9	50	6,3
2019	3,8	65,5	4,6	48,8	6,2
2020	3,6	65,9	4,1	50,3	6,2

EL 72,6% de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo han consumido alcohol (30 días previos a admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 27,4% restante (n = 7.467).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.


Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2014-2020.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Sólo alcohol	21.264	76,9	21.041	76,6	20.251	76,0	19.361	75,2	19.211	74,5	19.742	72,6	14.705	73,5
Alcohol y otras drogas	6.394	23,1	6.428	23,4	6.404	24,0	6.392	24,8	6.585	25,5	7.467	27,4	5.312	26,5
Una droga más	4.725	17,1	4.729	17,2	4.733	17,8	4.695	18,2	4.870	18,9	5.597	20,6	3.857	19,3
Dos drogas más	1.379	5,0	1.424	5,2	1.411	5,3	1.403	5,4	1.452	5,6	1.569	5,8	1.238	6,2
Tres o más drogas	290	1,0	275	1,0	260	0,9	294	1,1	263	1,0	301	1,1	217	1,0

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1996-2020.




	Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total
1996	35,9	43,4	37,1	2008	26,7	33,3	27,6
1997	32,4	41,0	33,7	2009	26,0	32,2	26,9
1998	32,4	39,7	33,6	2010	29,8	31,7	30,2
1999	31,9	40,2	33,0	2011	28,5	30,0	28,7
2000	32,7	37,9	33,5	2012	28,2	30,0	28,4
2001	32,7	40,2	33,7	2013	24,2	26,1	24,4
2002	30,9	38,9	32,0	2014	26,3	24,4	26,0
2003	31,5	39,3	32,6	2015	33,4	35,4	33,7
2004	27,7	38,3	29,3	2016	33,9	39,0	34,6
2005	31,5	39,5	32,7	2017	31,3	37,6	32,0
2006	32,7	37,4	33,4	2018	28,7	40,4	30,1
2007	30,0	36,2	30,9	2019	29,3	36,3	30,1
				2020	36,6	35,4	35,6

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015, 30% en 2016, 26,4% en 2017, 24,6% en 2018, 28,7% en 2019 y 29,2% en 2020.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.27.

Prevalencia (%) de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2020.



	<25 años	25-34 años	>34 años		<25 años	25-34 años	>34 años
1996	20,3	39,3	48,9	2008	3,2	16,9	35,6
1997	17,5	34	46,4	2009	2,2	15,2	34,7
1998	15,1	33,4	45,8	2010	8,1	14,8	38
1999	15,2	32	44	2011	9,9	14,5	35,6
2000	13,1	30,5	45,5	2012	8,6	11,7	35,4
2001	14	29,1	44,4	2013	4,7	8,9	30,4
2002	12,1	26,7	42,8	2014	5,9	12,0	31,2
2003	9,2	25,5	43,8	2015	11,5	12,1	38,4
2004	7,1	20,9	39,4	2016	3,1	16,0	39,3
2005	9,7	23,1	41,9	2017	4,2	19,7	35,1
2006	7,2	21,4	42,2	2018	0,0	19,7	31,3
2007	3,2	18,7	40,3	2019	7,3	18,4	33,3
				2020	16,0	23,1	38,9

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015, 30% en 2016, 26,4% en 2017, 24,6% en 2018, 28,7% en 2019 y 29,2% en 2020.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (%). España, 2019-2020.

	2019		2020	
	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	22.345	28,9	17.490	29,9
Cocaína polvo	19.627	25,4	15.357	26,2
Cocaína base	2.710	3,5	2.122	3,6
Opioides	11.170	14,5	8.502	14,5
Heroína	9.904	12,8	7.652	13,1
Metadona (mal uso)	461	0,6	289	0,5
Otros opioides	805	1,0	560	1,0
Cannabis	14.202	18,4	10.587	18,1
Hipnosedantes	992	1,3	824	1,4
Estimulantes	1.086	1,4	950	1,6
Anfetaminas/metanfetamina	839	1,1	709	1,2
Éxtasis y derivados	96	0,1	72	0,1
Otros estimulantes	151	0,2	166	0,3
Alucinógenos	127	0,2	112	0,2
Inhalantes volátiles	35	0,0	20	0,0
Otras drogas ilegales	78	0,1	59	0,1
Alcohol	27.209	35,2	20.017	34,2
Total drogas ilegales	50.035	–	38.544	–
Total drogas ilegales y alcohol	77.244	–	58.561	–

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.29.


Número y proporción de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal por sexo (%). España, 2020.

	Hombres		Mujeres	
	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	14.800	31,9	2.677	22,2
Cocaína polvo	13.046	28,1	2.302	19,1
Cocaína base	1.747	3,8	371	3,1
Opioides	7.180	15,5	1.317	10,9
Heroína	6.573	14,2	1.075	8,9
Metadona (mal uso)	235	0,5	54	0,4
Otros opioides	371	0,8	188	1,6
Cannabis	8.237	17,7	2.345	19,4
Hipnosedantes	443	1,0	381	3,2
Estimulantes	783	1,7	166	1,4
Anfetaminas/metanfetamina	568	1,2	140	1,1
Éxtasis y derivados	60	0,1	12	0,1
Otros estimulantes	152	0,3	14	0,1
Alucinógenos	96	0,2	16	0,1
Inhalantes volátiles	18	0,0	2	0,0
Otras drogas ilegales	45	0,1	14	0,1
Alcohol	14.854	32,0	5.149	42,7
Total drogas ilegales	31.602	—	6.918	—
Total drogas ilegales y alcohol	46.456	—	12.067	—

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2020.




* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede o no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.31.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2020.




* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede o no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.32.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol, en función del sexo (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2020.



	Todas las admisiones		Admitidos primera vez en la vida		Admitidos menores 18 años*		Nacidos fuera de España	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Opioides	22,7	19,0	11,3	11,2	0,1	0,6	24,3	21,3
Cocaína	46,8	38,7	47,8	36,3	1,8	2,9	36,0	36,9
Cannabis	26,1	33,9	35,2	42,5	96,1	92,3	32,5	34,6
Otros estimulantes	2,5	2,4	3,1	2,6	0,5	2,4	4,3	3,3
Hipnosedantes	1,4	5,5	2,0	7,0	1,3	1,6	2,1	3,3
Otras sustancias	0,5	0,5	0,6	0,4	0,2	0,2	0,8	0,6
Número de admisiones	31.602	6.918	15.950	4.043	1.481	491	3.959	878


* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable sexo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.33.

Número de casos y tasas por 100.000 habitantes de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según comunidad/ciudad autónoma. España, 2020.



2.1.34.

Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2020.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Total	38.544	17.154	20.006	31.602	6.918
Tratamiento previo					
Sí	46,2			47,6	39,4
No	53,8			52,4	60,6
Edad media (años)	36,3	39,5	33,4		
Sexo (%)					
Hombre	82,0	84,7	79,8		
Mujer	18,0	15,3	20,2		
Máximo nivel de estudios (%)					
Sin estudios	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
Primaria	52,5	55,8	50,0	53,8	46,7
Secundaria	41,3	38,9	43,1	40,5	45,0
Estudios superiores	5,3	4,5	6,1	4,9	7,5

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Situación laboral (%)					
Trabajando	33,6	30,4	36,2	35,5	24,6
Parado no habiendo trabajado antes	6,3	6,1	6,3	6,0	7,4
Parado habiendo trabajado antes	40,9	45,7	37,1	40,0	44,8
Otras	19,3	17,8	20,4	18,4	23,2
Fuente de referencia principal (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	5,0	8,9	1,8	4,9	5,4
Médico general, Atención Primaria de Salud	11,7	8,0	14,8	11,3	13,5
Hospitales u otros servicios de salud	6,8	5,4	7,8	6,0	10,4
Servicios Sociales	3,7	2,8	4,5	2,6	9,0
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	6,3	8,4	4,2	7,1	2,6
Servicios legales o policiales	6,3	5,4	7,0	6,6	4,6
Empresas o empleador	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Familiares y amigos	11,7	7,3	15,5	12,2	9,3
Iniciativa propia	44,9	51,4	39,4	45,8	40,6
Servicios de educación	0,4	0,2	0,5	0,3	0,6
Otra	3,3	2,1	4,3	3,1	4,0
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	15,5	18,2	13,2	15,8	14,1
Únicamente con pareja	12,3	12,4	12,2	11,3	16,7
Únicamente con hijos/as	2,3	2,0	2,7	1,1	8,1
Con la pareja e hijos/as	16,7	15,4	18,0	17,1	14,9
Con padres o familia de origen	38,5	35,0	41,6	39,5	33,5
Con amigos/as	3,6	3,8	3,4	3,5	4,2
Detenido (ej. centro penitenciario, centro de inserción social)	5,4	7,2	3,7	6,2	1,9
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,5	2,8	2,2	2,4	2,9
Otros	3,1	3,1	3,1	2,9	3,6
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	86,9	83,0	90,7	86,2	89,9
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	5,8	7,9	3,8	6,6	2,1
Otras instituciones	2,3	2,5	2,0	2,1	2,9
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,7	0,3	0,5	0,5
Alojamiento inestable/ precario	3,3	4,5	2,1	3,3	3,4
Otros lugares	1,3	1,4	1,1	1,3	1,3
Español o extranjero (%)					
Español	87,2	90,0	85,0	87,3	87,1
Extranjero	12,8	10,0	15,0	12,7	12,9
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	22,1	34,7	11,2	22,7	19,0
Heroína	19,9	32,6	8,9	20,8	15,5
Metadona	0,7	0,9	0,7	0,7	0,8
Otros opioides	1,5	1,2	1,7	1,2	2,7

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Cocaína	45,4	45,1	45,4	46,8	38,7
CLH Cocaína	39,8	38,6	40,8	41,3	33,3
Cocaína base	5,5	6,5	4,7	5,5	5,4
Cocaína otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Estimulantes distintos de cocaína	2,5	1,8	3,0	2,5	2,4
Anfetaminas	1,5	1,4	1,6	1,4	1,8
Metanfetaminas	0,3	0,2	0,5	0,4	0,2
MDMA y derivados	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
Otros estimulantes	0,4	0,2	0,6	0,5	0,2
Hipnosedantes	2,1	1,2	3,0	1,4	5,5
Alucinógenos	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Cannabis	27,5	16,9	36,7	26,1	33,9
Otras sustancias	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	20,2	19,8	20,6	19,9	21,9
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	46,1	42,9	48,9	45,5	49,2
4-6 días/semana	8,5	7,6	9,3	8,8	7,2
2-3 días/semana	14,2	12,7	15,6	14,7	12,1
1 día/semana	5,2	5	5,4	5,3	4,9
Menos de 1 día/semana	6,8	7,2	6,3	6,8	6,5
No consumió	19,2	24,6	14,6	18,9	20,2
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,1	4,5	7,4	5,1	10,3
Pulmonar	50,5	51,1	50,2	49,9	53,1
Intranasal o esnifada	40,0	38,7	40,8	41,3	33,8
Parenteral o intravenosa	2,7	4,7	1,0	2,9	1,9
Otras	0,8	1,0	0,6	0,7	0,9
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	10,6	18,2	4,1	11,3	7,5
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	4,4	7,3	1,8	4,8	3,0
Prevalencia VIH mínima (%)	3,3	5,2	1,7	3,4	2,9
Prevalencia VIH máxima (%)	8,7	10,1	6,0	9,0	7,3
Prevalencia hepatitis C mínima (%)	5,2	9,2	1,7	5,4	4,2
Prevalencia hepatitis C máxima (%)	14,0	18,7	6,3	14,7	10,9
Prevalencia hepatitis B mínima (%)	0,4	0,7	0,3	0,5	0,3
Prevalencia hepatitis B máxima (%)	1,9	2,4	1,4	2,0	1,5

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido).

Prevalencia máxima: Positivos entre los casos con información (positivos y negativos); en Hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune).

Nota: Debido al redondeo algunos totales no suman.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.35.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2020.

	Total	Sexo*		Tratamiento previo*	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Total	20.017	14.854	5.149	8.705	10.501
Tratamiento previo (%)					
Sí	45,3	45,8	43,8	100,0	0,0
No	54,7	54,2	56,2	0,0	100,0
Edad media (años)	46,4	46,3	46,9	47,6	45,5
Sexo					
Hombre	74,3	100,0	0,0	75,1	73,5
Mujer	25,7	0,0	100,0	24,9	26,5
Máximo nivel de estudios (%)					
Sin estudios	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Primaria 44,3	47,0	36,2	46,8	42,5	
Secundaria	44,6	43,7	47,3	43,2	45,7
Estudios superiores	10,3	8,5	15,7	9,1	11,1
Situación laboral (%)					
Trabajando	41,7	43,1	37,4	37,1	45,2
Parado no habiendo trabajado antes	2,5	2,2	3,3	2,4	2,6
Parado habiendo trabajado antes	36,0	35,1	38,5	38,9	33,6
Otras	19,9	19,5	20,8	21,7	18,6
Fuente de referencia principal (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	2,7	2,6	3,1	4,3	1,4
Médico general, Atención Primaria de Salud	24,1	24,1	24,1	19,3	28,3
Hospitales u otros servicios de salud	12,9	12,2	14,9	10,7	14,7
Servicios Sociales	5,0	4,3	6,9	5,2	4,8
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	1,8	2,3	0,4	1,9	1,8
Servicios legales o policiales	2,2	2,7	0,9	2,2	2,2
Empresas o empleador	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Familiares y amigos	11,9	12,4	10,3	9,7	13,9
Iniciativa propia	36,6	36,9	35,7	44,2	29,8
Servicios de educación	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3
Otra	2,5	2,2	3,1	2,2	2,7

	Total	Sexo*		Tratamiento previo*	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	23,0	23,3	22,0	25,0	21,1
Únicamente con pareja	16,1	15,5	18,0	15,3	16,8
Únicamente con hijos/as	5,1	2,3	13,4	5,2	5,0
Con la pareja e hijos/as	23,2	24,1	20,6	20,3	25,7
Con padres o familia de origen	22,5	24,1	17,6	22,7	22,2
Con amigos/as	3,6	3,5	3,8	3,8	3,5
Detenido (Ej. centro penitenciario, centro de inserción social)	1,7	2,1	0,4	1,9	1,6
En instituciones no detenido (Ej. albergue)	2,7	3,0	2,0	3,4	2,1
Otros	2,1	2,1	2,2	2,4	1,9
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	91,8	90,6	95,1	90,3	93,2
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	1,7	2,1	0,4	1,8	1,6
Otras instituciones	2,2	2,4	1,6	2,7	1,8
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,6	0,4	0,8	0,4
Alojamiento inestable/ precarios	2,8	3,1	1,9	3,2	2,4
Otros lugares	1,0	1,1	0,7	1,2	0,7
Español o extranjero (%)					
Extranjero	16,4	15,5	19,3	13,1	19,1
Español 83,6	84,5	80,7	86,9	80,9	
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)					
Opioides	3,6	4,4	2,7	3,8	2,9
Cocaína	65,9	67,6	64,0	67,4	59,1
Estimulantes sin cocaína	4,1	3,7	4,3	3,9	5,0
Hipnosedantes	6,2	7,1	5,6	4,6	13,3
Alucinógenos	0,7	0,6	0,8	0,7	0,9
Sustancias volátiles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Cannabis	50,3	47,1	52,8	51,7	43,8
Otras sustancias psicoactivas	0,5	0,3	0,5	0,4	0,9

	Total	Sexo*		Tratamiento previo*	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Edad de inicio droga principal (años)	18,4	17,9	18,8	17,5	21,0
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	56,8	54,7	58,5	58,0	53,4
4-6 días a la semana	7,1	6,6	7,4	6,9	7,7
2-3 días a la semana	12,0	10,9	12,9	11,5	13,5
1 día a la semana	3,9	3,5	4,4	3,6	4,8
Menos de 1 día a la semana	4,7	5,1	4,3	4,4	5,4
No consumió	15,5	19,2	12,4	15,6	15,3
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	99,2	99,3	99,2	99,2	99,5
Pulmonar o fumada (en chinos, papel de plata)	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3
Intranasal o esnifada	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Inyectada o parenteral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Inyección alguna vez en la vida (%)					
Sí	2,4	2,9	1,8	2,6	1,6
Inyección últimos 12 meses (%)					
Sí	0,4	0,6	0,3	0,5	0,2
Inyección últimos 30 meses (%)					
Sí	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2
Prevalencia mínima VIH (%)					
Positivo	0,9	1,0	0,9	1,0	0,6
Prevalencia de Hepatitis C mínima (%)					
Positivo	1,9	2,2	1,6	2,0	1,6
Prevalencia de Hepatitis B mínima (%)					
Portador crónico (HBs Ag positivo)	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.36.

Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2020.

	Alcohol	Cocaína polvo	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes	Otros opioides	Metadona
Total	20.017	15.357	10.587	7.652	2.122	824	947	560	289
Tratamiento previo (%)									
Sí	45,3	44,8	28,3	76,0	54,4	25,3	33,9	38,6	51,0
No	54,7	55,2	71,7	24,0	45,6	74,7	66,1	61,4	49,0
Sexo (%)									
Hombre	74,3	85,0	77,8	85,9	82,5	53,8	82,5	66,4	81,3
Mujer	25,7	15,0	22,2	14,1	17,5	46,2	17,5	33,6	18,7
Edad media (años)	46,4	37,4	27,5	43,8	38,3	42,6	36,2	46,4	45,6
Máximo nivel de estudios (%)									
Sin estudios	0,8	0,6	0,7	1,5	1,4	3,5	0,1	0,4	1,9
Primaria	44,3	48,1	51,5	64,9	57,3	50,7	29,7	48,3	69,8
Secundaria	44,6	45,4	43,4	30,9	38,2	33,6	50,3	39,6	25,7
Estudios superiores	10,3	6,0	4,4	2,7	3,1	12,2	19,9	11,7	2,6
Situación laboral (%)									
Trabajando	41,7	48,0	25,8	18,4	24,5	24,1	41,5	24,7	18,9
Parado no trabajado antes	2,5	3,2	9,2	8,3	5,8	10,2	4,8	4,9	8,9
Parado habiendo trabajado antes	36,0	38,4	33,4	53,5	53,1	39,3	40,4	36,4	50,7
Otras	19,9	10,4	31,5	19,9	16,6	26,5	13,3	34,0	21,4
Español o extranjero (%)									
Español	16,4	9,6	15,2	13,9	13,9	13,9	21,2	85,2	90,0
Extranjero	83,6	90,4	84,8	86,1	86,1	86,1	78,8	14,8	10,0
Fuente de referencia principal (%)									
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	2,7	3,4	1,8	11,9	6,0	1,5	6,1	10,2	16,3
Médico general, Atención Primaria de Salud	24,1	13,7	13,1	3,9	8,6	23,4	14,9	23,5	6,6
Hospitales u otros servicios de salud	12,9	5,8	9,3	2,5	6,0	13,7	17,4	16,2	7,3
Servicios Sociales	5,0	2,7	6,9	1,7	3,2	3,9	2,6	2,2	2,8
Prisión, centro de reforma									
o de internamiento para menores	1,8	4,0	5,5	12,3	7,5	4,2	3,9	2,4	11,8
Servicios legales o policiales	2,2	4,5	11,9	2,6	7,4	2,8	6,5	1,6	1,0
Empresas o empleador	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Familiares y amigos	11,9	13,9	14,1	5,7	10,5	8,6	8,1	2,6	3,5
Iniciativa propia	36,6	49,4	30,7	57,1	48,8	33,1	35,5	38,3	49,0
Servicios de educación	0,3	0,1	1,0	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2	1,4
Otra	2,5	2,2	5,5	2,2	1,8	8,5	4,6	2,7	0,3
Número de hijos	1,2	1,0	0,5	1,0	1,1	1,1	0,5	1,2	1,0

	Alcohol	Cocaína polvo	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes	Otros opioides	Metadona
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Solo/a	23,0	14,5	10,0	22,8	18,1	21,4	23,5	17,2	18,0
Únicamente con pareja	16,1	14,1	8,9	12,0	11,5	15,2	14,6	22,1	14,5
Únicamente con hijos/as	5,1	2,8	1,6	1,9	1,7	9,0	1,3	3,6	3,2
Con la pareja e hijos/as	23,2	23,9	11,3	11,6	14,1	16,8	7,4	22,8	16,3
Con padres o familia de origen	22,5	35,0	54,3	27,9	34,3	24,1	35,4	24,3	24,7
Con amigos/as	3,6	2,7	3,2	5,1	4,1	2,6	8,8	3,7	6,7
Detenido (ej. centro penitenciario, centro de inserción social)									
	1,7	3,7	3,7	11,3	9,0	3,5	2,9	1,9	5,3
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,7	1,2	3,6	3,4	3,4	3,7	1,5	2,6	8,8
Otros.	2,1	2,1	3,5	4,1	3,8	3,6	4,7	1,7	2,5
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Casas, pisos, apartamentos	91,8	92,7	89,6	73,0	79,3	86,2	89,8	92,2	77,5
Prisiones, centros reforma o internamiento menores	1,7	3,8	4,0	12,2	9,3	3,4	3,0	1,8	9,2
Otras instituciones	2,2	1,2	3,3	2,6	3,2	3,9	2,0	2,7	2,8
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,3	0,3	0,8	0,9	0,4	0,4	0,0	1,8
Alojamientos inestables/precarios	2,8	1,4	1,7	8,8	5,2	3,9	3,4	2,2	6,3
Otros lugares	1,0	0,6	1,1	2,5	2,0	2,1	1,4	1,1	2,5
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)									
Opioides	3,6	2,8	2,8	9,9	22	8,3	3,1	11,2	25,8
Cocaína	65,9	0,3	40,7	49,1	4,6	30,1	28,5	36,7	29,5
Estimulantes sin cocaína	4,1	4,6	11,3	1,4	4,8	7,6	13,1	4,1	0,0
Hipnosedantes	6,2	4,3	7,4	10,5	14,0	0,0	16,2	18,9	13,6
Alucinógenos	0,7	1,2	1,9	0,2	1,1	1,4	4,1	1,2	0,0
Sustancias volátiles	0,1	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0
Cannabis	50,3	48,8	0,0	49,5	62,5	56,9	49,2	43,2	52,3
Alcohol	0,0	71,4	69,7	31,4	50,1	41,3	42,4	30,2	34,1
Otras sustancias psicoactivas	0,5	0,2	0,7	0,2	0,4	1,1	2,0	0,6	0,8
Edad de inicio droga principal	18,4	20,8	15,6	22,1	22,0	29,7	25,1	32,6	29,3

	Alcohol	Cocaína polvo	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes	Otros opioides	Metadona
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Todos los días	56,8	24,0	66,9	58,1	40,4	84,9	27,5	75,1	87,6
4-6 días a la semana	7,1	12,6	5,2	5,0	11,8	2,0	9,6	2,8	2,8
2-3 días a la semana	12,0	23,9	7,1	5,5	17,0	3,1	21,3	4,1	0,4
1 día a la semana	3,9	9,2	2,1	2,0	4,4	1,7	8,4	0,9	0,7
Menos de 1 día a la semana	4,7	11,1	3,4	3,1	6,5	1,0	12,8	2	1,4
No consumió	15,5	19,2	15,4	26,2	19,8	7,3	20,4	15,1	7,1
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Oral	99,2	3,4	1,7	0,6	0,2	97,9	17,6	50,6	89,5
Pulmonar o fumada	0,5	2,8	97,7	81,5	96,5	1,6	18,7	29,6	6,6
Intranasal o esnifada	0,2	92,4	0,5	5,7	2,5	0,2	56,0	4,2	1,0
Parenteral o intravenosa	0,0	0,8	0,0	10,9	0,2	0,1	7,2	6,4	2,4
Otras	0,1	0,7	0,1	1,3	0,5	0,1	0,5	9,2	0,3
Se inyectó drogas (%)									
Alguna vez en la vida	2,4	2,7	1,4	38,7	9,9	4,7	13,6	23,2	39,0
Últimos 12 meses	0,4	1,3	0,3	16,6	2,9	1,1	11,1	8,7	5,6
Últimos 30 días	0,3	1,1	0,2	14,2	1,3	0,5	9,4	8,1	4,0
Prevalencia mínima VIH (%)	0,9	1,2	0,7	9,4	2,8	3,4	16,0	5,5	9,0
Prevalencia máxima de VIH (%)	2,6	3,3	2,6	17,2	6,1	9,5	31,3	13,0	20,8
Prevalencia mínima Hepatitis C (%)	1,9	1,3	0,9	18,5	4,5	3,0	6,9	9,1	13,1
Prevalencia máxima Hepatitis C (%)	5,2	3,7	3,6	35,0	10,2	8,8	15,2	22	32,3
Prevalencia mínima Hepatitis B (%)	0,4	0,3	0,2	1,1	0,5	0,0	0,5	0,4	0,7
Prevalencia máxima Hepatitis B (%)	1,7	1,4	0,9	4,0	1,7	0,0	1,9	1,7	3,6

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido)

Prevalencia máxima: Positivos entre los casos con información (positivos y negativos); en Hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune).

Nota: Debido al redondeo algunos totales no suman.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.37.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento por sexo. España, 2020.

	Alcohol		Cocaína polvo		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Total	14.854	5.149	13.046	2.302	8.237	2.345	6.573	1.075	1.747	371	443	381	783	166
Tratamiento previo (%)														
Sí	45,8	43,8	45,3	42,0	29,4	24,2	76,8	71,0	55,4	50,3	27,1	23,0	33,7	34,6
No	54,2	56,2	54,7	58,0	70,6	75,8	23,2	29,0	44,6	49,7	72,9	77,0	66,3	65,4
Edad media (años)	46,3	46,9	37,3	38,1	27,5	27,4	44,1	41,8	38,3	38,3	37,4	48,6	36,7	34,2
Máximo nivel de estudios (%)														
Sin estudios	0,8	0,8	0,5	0,8	0,8	0,3	1,5	1,3	1,5	0,5	4,0	3,0	0,1	0,0
Primaria	47,0	36,2	49,1	42,8	52,8	47,0	66,3	56,3	58,8	49,7	53,0	48,0	28,8	33,5
Secundaria	43,7	47,3	44,8	48,2	42,4	46,7	29,8	37,9	37,0	44,2	34,2	33,0	49,1	55,3
Estudios superiores	8,5	15,7	5,6	8,2	4,0	6,0	2,4	4,5	2,6	5,5	8,8	16,1	21,9	11,2
Situación laboral (%)														
Trabajando	43,1	37,4	50,7	32,8	26,8	22,2	19,0	15,1	25,9	18,1	23,3	25,0	44,8	24,5
Parado, no habiendo														
trabajado antes	2,2	3,3	3,0	4,6	9,5	8,3	7,6	12,1	5,5	7,1	13,6	6,2	4,1	7,5
Parado, habiendo														
trabajado antes	35,1	38,5	36,6	48,7	32,8	35,6	53,0	56,1	52,3	57,1	39,0	39,5	39,5	44,7
Otras situaciones	19,5	20,8	9,7	13,9	30,9	34,0	20,4	16,7	16,3	17,6	24,0	29,3	11,5	23,3
Español o extranjero (%)														
Español	84,5	80,7	90,8	87,9	84,2	86,9	86,3	84,8	85,9	86,8	80,9	92,3	78,1	82,3
Extranjero	15,5	19,3	9,2	12,1	15,8	13,1	13,7	15,2	14,1	13,2	19,1	7,7	21,9	17,7

	Alcohol		Cocaína polvo		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Fuente de referencia principal (%)														
Otro servicio de tratamiento de drogodependencias	2,6	3,1	3,4	3,9	1,8	1,9	11,3	15,6	5,6	8,2	1,1	1,9	6,7	3,1
Médico general o At. Primaria	24,1	24,1	13,7	13,9	12,9	14,1	3,8	4,4	8,3	9,8	18,5	29,2	15,2	13,0
Hospitales u otros serv. salud	12,2	14,9	5,2	9,4	8,6	12,0	2,4	2,9	4,6	12,2	11,8	15,9	16,8	21,0
Servicios Sociales	4,3	6,9	1,6	9,3	5,0	13,6	1,6	2,9	2,4	7,1	4,1	3,7	1,7	6,8
Centro penitenciario, de reforma o internamiento para menores	2,3	0,4	4,4	1,3	6,3	2,8	13,5	5,2	8,6	2,7	7,1	0,8	3,7	4,3
Servicios legales o policiales	2,7	0,9	4,7	3,4	13,0	8,0	2,6	2,5	8,4	2,7	3,9	1,6	6,6	5,6
Empresa o empleador	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Familiares o amigos/as	12,4	10,3	14,5	10,6	15,1	10,8	5,7	5,9	11,1	7,9	9,3	7,7	7,9	9,3
Iniciativa propia	36,9	35,7	50,2	44,7	31,0	30,0	56,8	58,9	49,1	47,6	35,1	30,8	36,5	31,5
Servicios de educación	0,2	0,4	0,1	0,1	0,9	1,4	0,0	0,1	0,1	0,5	0,7	0,0	0,3	0,6
Otra	2,2	3,1	2,0	3,4	5,6	5,4	2,2	1,7	1,9	1,4	8,4	8,5	4,5	4,9
Número de hijos	1,2	1,3	1,0	1,3	0,4	0,6	1,0	1,5	1,0	1,4	0,8	1,5	0,4	0,8
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)														
Solo/a	23,3	22,0	14,4	15,0	9,8	10,7	23,7	17,2	18,6	15,9	23,7	18,8	24,6	18,6
Únicamente con pareja	15,5	18,0	14,0	15,0	7,9	12,4	9,8	25,3	9,9	19,5	12,0	19,1	14,8	13,7
Únicamente con hijos/as	2,3	13,4	1,4	11,1	0,7	4,7	1,1	6,4	0,6	6,7	0,7	18,8	0,5	5,0
Con la pareja e hijos/as	24,1	20,6	24,7	19,0	10,9	12,5	11,7	10,9	15,1	9,5	13,1	21,3	6,9	9,3
Con padres o familia de origen	24,1	17,6	35,9	29,8	56,0	48,2	29,3	19,6	35,0	30,6	32,2	14,4	34,7	38,5
Con amigos/as	3,5	3,8	2,5	4,0	3,3	2,9	4,8	7,4	3,8	5,8	3,7	1,4	9,7	4,3
Detenido (ej. Centro penitenciario o inserción social)	2,1	0,4	4,1	1,4	4,3	1,4	12,4	4,4	10,4	2,5	5,5	1,1	2,8	3,1
En instituciones, no detenido (ej. albergue)	3,0	2,0	1,0	2,1	3,6	3,4	3,3	4,0	3,2	4,2	5,5	1,6	1,3	2,5
Otros	2,1	2,2	2,0	2,6	3,4	3,9	3,9	4,8	3,4	5,3	3,7	3,5	4,6	5,0
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)														
Casas, pisos, apartamentos	90,6	95,1	92,6	93,2	88,9	92,0	72,3	77,7	78,6	82,8	79,2	94,4	89,8	89,7
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	2,1	0,4	4,2	1,4	4,7	1,5	13,4	4,8	10,7	2,7	5,3	1,3	2,9	3,0
Otras instituciones	2,4	1,6	1,0	2,3	3,2	3,5	2,6	2,7	2,9	4,6	5,7	1,9	1,7	3,6
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,8	0,9	1,0	0,5	0,7	0,0	0,5	0,0
Alojamiento inestable/ precarios	3,1	1,9	1,3	2,0	1,7	1,4	8,5	10,8	4,8	7,1	6,2	1,3	3,7	1,8
Otros lugares	1,1	0,7	0,6	0,6	1,1	1,1	2,4	3,1	2,0	2,2	3,0	1,1	1,4	1,8

	Alcohol		Cocaína polvo		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)														
Opioides	3,8	2,9	2,7	3,3	3,1	1,6	9,4	13,0	21,0	27,2	9,1	6,4	3,1	2,7
Cocaína	67,4	59,1	0,3	0,4	41,4	37,6	47,9	57,7	5,0	2,0	33,8	20,5	28,3	29,3
Estimulantes sin cocaína	3,9	5,0	4,5	5,5	10,7	13,2	1,4	1,1	4,1	8,4	9,1	3,8	15,3	1,3
Hipnosedantes	4,6	13,3	3,9	6,3	7,4	7,6	10,7	9,1	14,2	12,9	0,0	0,0	18,2	5,3
Alucinógenos	0,7	0,9	1,2	1,5	2,0	1,5	0,3	0,2	0,9	2,5	2,0	0,0	4,6	1,3
Sustancias volátiles	0,1	0,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Cannabis	51,7	43,8	49,0	47,7	0,0	0,0	50,5	42,6	63,1	58,9	61,6	44,9	48,7	52,0
Alcohol	0,0	0,0	72,2	66,3	69,9	69,2	32,8	22,3	52,0	39,6	37,4	51,3	40,4	53,3
Otras sustancias psicoactivas	0,4	0,9	0,2	0,6	0,6	0,7	0,3	0,0	0,4	1,0	1,0	1,3	2,4	0,0
Edad de inicio droga principal	17,5	21,0	20,5	22,8	15,4	16,3	21,8	24,1	21,5	24,2	25,8	34,0	25,7	22,2
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)														
Todos los días	58,0	53,4	24,3	22,0	67,3	65,5	58,3	56,9	40,7	38,9	83,1	87,1	27,3	28,2
4-6 días a la semana	6,9	7,7	12,8	11,5	5,2	5,1	5,2	4,1	11,9	11,7	2,7	1,1	9,7	9,2
2-3 días a la semana	11,5	13,5	24,2	22,6	7,1	6,7	5,5	4,8	17,5	14,9	2,5	3,8	22,1	17,8
1 día a la semana	3,6	4,8	9,1	9,7	2,0	2,3	2,0	2,1	4,2	5,4	2,1	1,3	9,1	5,5
Menos de 1 día a la semana	4,4	5,4	10,9	12,1	3,3	3,5	3,2	3,0	6,1	8,7	1,6	0,3	13,5	9,2
No consumió	15,6	15,3	18,6	22,2	15,0	16,9	25,8	29,0	19,6	20,4	8,0	6,4	18,3	30,1
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)														
Oral	99,2	99,5	3,4	3,4	1,6	1,8	0,6	0,7	0,3	0,0	97,3	98,7	17,0	20,5
Pulmonar o fumada	0,5	0,3	2,7	3,4	97,8	97,6	81,4	82,0	96,8	95,4	2,3	0,8	20,6	9,6
Intranasal o esnifada	0,2	0,1	92,4	91,9	0,5	0,5	5,6	6,5	2,2	3,8	0,2	0,3	53,3	68,1
Parenteral o intravenosa	0,0	0,0	0,7	0,9	0,0	0,0	11,2	8,9	0,2	0,3	0,2	0,0	8,7	0,6
Otras	0,1	0,1	0,7	0,4	0,1	0,1	1,2	1,9	0,5	0,5	0,0	0,3	0,4	1,2
Se inyectó drogas (%)														
Alguna vez en la vida	2,6	1,6	2,7	2,8	1,5	1,0	39,7	32,7	10,4	7,2	6,5	2,8	16,0	2,6
Últimos 12 meses	0,5	0,2	1,2	1,4	0,3	0,2	17,0	13,7	3,4	0,9	1,2	0,8	13,2	1,3
Últimos 30 días	0,3	0,2	1,1	1,2	0,2	0,1	14,7	11,5	1,4	0,6	0,7	0,3	11,1	1,3
Prevalencia mínima VIH (%)	1,0	0,6	1,2	1,4	0,7	0,5	9,1	10,9	2,6	3,8	3,8	2,9	18,5	4,2
Prevalencia máxima de VIH (%)	3,0	1,5	3,3	3,3	2,9	1,6	16,9	19,1	5,6	8,0	9,6	9,4	35,7	8,9
Prevalencia mínima hepatitis C (%)	2,0	1,6	1,2	1,9	0,9	0,9	18,8	16,7	4,6	4,3	3,4	2,6	7,9	2,4
Prevalencia máxima hepatitis C (%)	5,6	4,2	3,5	4,7	3,9	3,0	35,8	30,5	10,3	9,6	8,8	8,8	17,4	5,2
Prevalencia máxima hepatitis B (%)														
Portador crónico	1,7	1,4	1,3	1,9	1,0	0,5	4,1	3,3	1,6	2,2	0,0	0,0	2,4	0,0
Prevalencia mínima hepatitis B (%)														
Portador crónico	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	1,2	0,8	0,5	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0

* Estimulantes sin cocaína.

Notas:

– Prevalencia mínima: positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocidos). En Hepatitis B, portador crónico entre el total (incluye portador crónico, inmune, no inmune, pendiente de resultado y desconocidos).

– Prevalencia máxima: positivos entre los casos con información (incluye positivos y negativos); en Hepatitis B, portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune.

– El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

– El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable sexo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.38.

Edad media de inicio en el tratamiento actual, edad del primer uso y latencia primer uso hasta el tratamiento actual. España, 2020.

	Edad media de entrada a tratamiento	Edad media de primer uso	Latencia (inicio-entrada a tratamiento)
Opioides (total)	44,02	23,07	21,02
Heroína	43,79	22,13	21,72
Metadona	45,65	29,32	16,53
Buprenorfina	46,59	39,05	7,35
Fentanilo	50,72	42,74	8,14
Otros opioides	45,60	30,49	15,04
Cocaína total	37,52	20,94	16,57
Cocaína polvo	37,41	20,81	16,58
Cocaína base	38,27	21,85	16,46
Estimulantes distintos de cocaína	36,23	25,08	10,95
Anfetaminas	36,77	22,82	13,72
Metanfetamina	36,57	30,40	6,05
Extasis y derivados	29,97	22,86	6,87
Catinonas sintéticas	37,01	33,19	3,82
Otros estimulantes	36,53	22,11	13,85
Hipnosedantes	42,60	29,63	12,81
Alucinógenos	31,21	22,08	8,96
Inhalantes volátiles	29,00	19,25	9,75
Cannabis	27,46	15,62	11,78
Total	36,25	20,21	15,95

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.39.

Número de casos que entran a tratamiento en función de que presenten policonsumo* de sustancias, total y en función del tratamiento previo. España, 2020.

	Policonsumo Si	Policonsumo No	Total
Sin tratamiento previo	6.584	13.422	20.006
Con tratamiento previo	5.957	11.197	17.154
Desconocido	263	1.121	1.384
Total admisiones	12.804	25.740	38.544

Nota: Se utiliza el término "policonsumo" cuando el sujeto consume más de una sustancia y resulta "prácticamente imposible" identificar cuál es la droga principal. Es decir, cuál es la droga que el terapeuta considera que ha producido la dependencia o los problemas clínicos o sociales más importantes que han motivado la admisión a tratamiento.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.40.

Número de casos admitidos a tratamiento por grupos de edad en función de la droga principal. España, 2020.


	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥65	Desc.	Total
Opioides	1	23	161	400	828	1.228	1.572	1.717	1.527	717	219	84	25	8.502
Heroína	1	18	145	372	758	1122	1.427	1.567	1.374	618	174	55	21	7.652
Metadona	0	0	5	5	20	44	62	58	43	34	14	3	1	289
Buprenorfina	0	1	0	1	0	0	8	4	3	4	0	1	0	22
Fentanilo	0	0	0	3	6	6	9	9	17	14	6	9	0	79
Otros opioides	0	4	11	19	44	56	66	79	90	47	25	16	3	460
Cocaína (total)	0	189	974	2.046	3.377	3.828	3.328	2.044	1.023	394	131	39	117	17.490
Cocaína CLH	0	162	853	1.818	2.992	3.421	2.922	1.753	870	333	105	30	98	15.357
Cocaína base	0	27	120	226	385	404	405	289	152	61	26	9	18	2.122
Estimulantes dif. cocaína	3	28	74	111	201	177	181	96	47	23	3	2	4	950
Anfetaminas	1	13	43	58	117	129	108	67	29	11	2	1	1	580
Metanfetaminas	0	0	6	20	31	15	32	12	8	2	0	0	3	129
Éxtasis	1	12	11	12	14	6	12	3	1	0	0	0	0	72
Catinonas sintéticas	0	0	8	13	26	18	20	8	4	7	0	0	0	104
Otros estimulantes	1	3	6	8	13	9	9	6	5	3	1	1	0	65
Hipnosedantes	0	47	62	52	86	101	97	104	94	78	41	57	5	824
Alucinógenos	0	8	19	23	25	18	9	3	1	2	0	1	3	112
Sustancias volátiles	0	7	4	1	0	2	4	1	1	0	0	0	0	20
Cannabis	160	2.952	1.947	1.635	1.403	942	675	386	268	120	47	11	41	10.587
Total	164	3.254	3.242	4.276	5.928	6.303	5.874	4.360	2.969	1.340	443	196	195	38.544

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2020

2.2.1.

Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España*, 1996-2020.



* Comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.2.

Evolución del número de urgencias relacionadas con el uso de analgésicos opioides*. España, 2005-2020.




* Incluye morfina, Fentanilos, petidina, tramadol, buprenorfina, codeína, dextrometorfano, hidromorfona, oxicodona y tapentadol.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Proporción de urgencias por tipo de opiáceo notificado en el total de urgencias relacionadas con opiáceos. España*, 2005-2020.



* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** Otros opioides: opioides distintos de la heroína y de los analgésicos opioides. Incluye: metadona, opio y otros opioides sin especificar.

*** Analgésicos opioides: incluye morfina, fentanilos, petidina, tramadol, buprenorfina, codeína, dextrometorfano, hidromorfona, oxicodona y tapentadol.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Número de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje según tipo de droga. España*, 1996-2020.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnóticos y sedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y derivados	Alucinógenos	Inhalables volátiles
1996	2.585	19,9	12,4	6,2	23,6	56,1	2,2	13,5	1,3	2,1	0,2
1997	1.932	25,0	15,2	6,6	18,9	50,9	2,9	17,4	2,2	1,8	0,1
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4
2014	6.441	43,7	38,7	35,5	18,5	10,3	8,6	7,6	4,5	2,5	0,3
2015	5.238	43,5	39,8	42,2	18,2	11,2	8,0	7,4	3,7	1,6	0,3
2016	4.565	42,5	43,9	40,1	20,5	8,6	7,5	7,7	3,2	1,5	0,3
2017	4.293	50,2	37,1	50,3	16,9	9,0	8,7	10,3	2,8	1,5	0,5
2018	5.027	52,0	39,0	49,4	17,9	7,4	7,6	10,1	3,4	1,4	0,5
2019	5.352	50,7	40,3	50,6	19,5	7,0	7,8	9,9	3,8	1,8	0,5
2020	4.657	39,9	40,6	44,9	34,6	6,7	5,7	8,9	2,6	0,8	0,4

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5.

Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España*, 1996-2020.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nº episodios	2.585	2.099	2.328	2.673	5.828	7.042	6.431	5.626	5.999	6.441	5.238	4.565	4.293	5.027	5.352	4.657
Edad media (años)	27,8	29,1	30,3	29,8	31,0	31,6	32,4	32,6	32,8	33,2	34,1	34,3	34,6	34,8	34,1	36,5
Sexo (%)																
Mujeres	21,4	23,1	27,4	27,4	28,0	26,1	22,7	26,3	26,1	24,5	22,6	22,6	22,7	25,3	25,7	29,3
Sustancias psicoactivas relacionadas (%)																
Heroína	56,1	38,7	35,3	21,4	17,5	16,9	17,2	17,8	13,0	10,3	11,2	8,6	9,0	7,4	7,0	6,7
Otros opiodes	13,5	16,8	18,0	13,1	9,1	8,5	7,5	6,7	6,1	7,6	7,4	7,7	10,3	10,1	9,9	8,9
Cocaína	19,9	31,6	40,9	44,7	50,0	51,1	55,1	49,5	46,0	43,7	43,5	42,5	50,2	52,0	50,7	39,9
Anfetaminas	2,2	3,0	2,2	3,4	2,3	4,7	4,4	5,5	8,9	8,6	8,0	7,5	8,7	7,6	7,8	5,7
MDMA y der.	1,3	2,2	4,5	5,3	3,2	6,4	4,2	2,9	4,6	4,5	3,7	3,2	2,8	3,4	3,8	2,6
Hipnosedantes	23,6	24,3	28,9	30,1	22,3	21,0	15,6	16,7	18,3	18,5	18,1	20,5	16,9	17,9	19,5	34,6
Cannabis	6,2	8,9	12,8	19,9	19,3	23,9	24,7	30,5	33,0	35,5	42,2	40,1	50,3	49,4	50,6	44,9
Alucinógenos	2,1	2,4	2,7	1,3	0,8	1,7	1,6	1,7	2,5	2,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,8	0,8
I. volátiles	0,2	0,3	0,3	0,2	0,6	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4
Alcohol	12,4	22,2	26,8	35,4	30,7	36,0	37,3	36,3	39,0	38,7	39,8	43,9	37,1	39,0	40,3	40,6
Resolución urgencia (%)																
Alta médica	80,5	81,2	78,7	82,1	81,4	76,2	80,0	79,6	75,9	69,8	72,2	71,6	71,1	72,7	73,0	70,4
Alta voluntaria	7,0	8,8	8,5	7,4	5,3	8,6	8,5	7,0	8,2	9,9	8,2	8,2	8,3	8,4	8,8	7,9
Ingreso hospitalario	7,6	6,0	8,3	6,3	8,0	8,8	7,8	10,2	12,5	15,9	16,0	17,0	17,1	15,2	15,1	17,3
Muerte en urgencias	0,1	0,0	0,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Traslado otro centro	4,8	3,9	3,7	4,0	5,3	6,3	3,7	3,2	3,3	4,2	3,6	3,1	3,5	3,7	3,1	4,3

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Notas: Incluye las sustancias para las que el médico expresa en la historia clínica una relación directa con la urgencia. El alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

En esta tabla se recogen solamente algunos años; la serie completa se puede consultar en <https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2020OEDA-INFORME.pdf>

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.6.

Evolución vía de administración (número y porcentaje) de los episodios de urgencias hospitalarias en consumidores de drogas, según tipo de droga. España*, 2011-2020.

Drogas y vía de administración		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
HEROÍNA	Oral	1,6	0,8	0,2	1,5	1,5	2,2	2,7	9,0	5,3	9,6
	Pulmonar o fumada	35,4	25,4	30,6	25,7	26,0	50,0	61,0	50,7	57,3	54,2
	Intranasal o esnifada	6,8	8,9	9,5	5,2	5,3	6,7	5,1	11,9	13,6	8,5
	Parenteral o inyectada	56,3	64,9	59,6	67,7	68,5	41,1	30,7	27,9	23,8	27,7
	Otra vía	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
OTROS OPIODES	Oral	94,5	96,8	98,7	89,3	85,0	91,3	95,1	95,9	95,0	92,1
	Pulmonar o fumada	1,1	0,8	0,4	1,8	3,2	1,7	1,4	0,8	1,5	4,4
	Intranasal o esnifada	1,8	1,0	0,1	0,0	2,4	0,4	0,0	0,6	0,5	0,3
	Parenteral o inyectada	1,9	0,8	0,5	7,7	7,3	6,1	1,6	1,1	1,5	2,2
	Otra vía	0,7	0,6	0,2	1,2	2,0	0,4	1,9	1,6	1,5	1,0
COCAÍNA	Oral	1,4	1,0	0,5	2,3	2,0	3,3	2,5	1,6	2,1	5,0
	Pulmonar o fumada	20,8	18,2	18,5	10,4	18,4	17,9	11,1	11,8	14,1	13,4
	Intranasal o esnifada	61,9	57,5	61,2	72,7	71,6	73,5	85,6	85,1	81,9	78,5
	Parenteral o inyectada	15,8	23,1	19,6	14,4	10,0	8,6	3,3	1,5	1,7	2,5
	Otra vía	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,7
ANFETAMINAS	Oral	81,6	78,0	69,9	71,9	68,2	65,9	72,3	75,0	73,2	73,5
	Pulmonar o fumada	5,3	5,9	10,6	4,5	7,1	4,8	9,9	2,4	3,0	2,4
	Intranasal o esnifada	12,5	16,1	18,7	21,9	24,7	27,8	17,7	22,6	23,4	23,5
	Parenteral o inyectada	0,3	0,0	0,4	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,4	0,6
	Otra vía	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MDMA	Oral	97,3	97,4	98,6	95,3	92,1	98,1	100,0	96,2	96,2	93,7
	Pulmonar o fumada	1,4	1,1	0,0	1,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	Intranasal o esnifada	0,9	1,6	0,0	2,4	4,8	1,9	0,0	3,8	3,8	3,8
	Parenteral o inyectada	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Otra vía	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HIPNOSEDANTES	Oral	99,5	99,3	99,5	98,8	99,3	99,5	98,5	99,1	99,1	99,5
	Pulmonar o fumada	0,1	0,2	0,2	0,8	0,2	0,3	0,7	0,6	0,6	0,2
	Intranasal o esnifada	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
	Parenteral o inyectada	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3
	Otra vía	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
CANNABIS	Oral	2,6	2,4	2,2	5,3	4,3	5,1	1,8	4,8	4,8	5,9
	Pulmonar o fumada	96,6	97,3	97,3	93,5	95,5	94,8	98,1	94,8	94,8	93,7
	Intranasal o esnifada	0,6	0,3	0,4	0,7	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3
	Parenteral o inyectada	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Otra vía	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
ALUCINÓGENOS	Oral	72,9	73,3	54,8	37,1	76,1	82,8	77,8	86,6	86,6	96,0
	Pulmonar o fumada	15,3	2,7	11,3	2,2	13,0	3,4	0,0	6,7	6,7	4,0
	Intranasal o esnifada	11,9	14,7	17,7	16,9	2,2	13,8	22,2	6,7	6,7	0,0
	Parenteral o inyectada	0,0	6,7	16,1	43,8	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Otra vía	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.7.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España*, 2020.



2.2.8.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España*, 2020.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Número de episodios	4.657	3.289	1.362	1.791	1.819	2.015	1.553	299	256	398	115	37	17
Edad media (años)	36,5	36,5	36,4	37,8	38,2	31,9	39,4	42,3	34,6	42,6	30,2	26,5	29,2
Sexo (%)													
Mujeres	29,3			21,7	29,3	26,0	41,8	14,4	25,0	27,6	24,6	13,5	29,4
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	70,4	69,6	72,3	71,6	71,8	69,7	69,0	66,9	70,2	68,9	71,9	86,1	94,1
Alta voluntaria	7,9	8,7	6,0	8,6	9,2	7,0	8,5	10,5	7,5	10,5	6,1	5,6	0,0
Ingreso hospitalario	17,3	17,4	16,9	15,8	14,2	19,4	17,2	18,2	19,2	15,6	18,4	8,3	5,9
Muerte en urgencias	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	4,3	4,1	4,7	3,9	4,7	3,9	5,1	4,1	2,7	4,8	3,5	0,0	0,0

* Comunidades autónomas que declaran al indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.9.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España*, 2020.

	Total	Hombres	Mujeres
Cannabis	44,9	45,5	38,4
Alcohol	40,6	39,1	39,1
Cocaína	39,9	42,7	28,5
Hipnosedantes	34,6	27,5	47,6
Heroína	6,7	7,8	3,2
Anfetaminas	5,7	5,9	4,7
Otros opioides	8,9	8,7	8,0
MDMA y derivados	2,6	2,6	2,1
Alucinógenos	0,8	1,0	0,4
Inhalables volátiles	0,4	0,4	0,4

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes sólo se registran cuando aparecen acompañados de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.10.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas). España*, 2020.

	2020
Número de episodios	9.239
Edad media (años)	38,2
Sexo (%)	
Mujeres	34,8
Sustancias psicoactivas relacionadas (%)	
Heroína	3,3
Otros opiodes	4,4
Cocaína	20,0
Anfetaminas	2,9
MDMA y derivados	1,3
Hipnosedantes	33,6
Cannabis	22,5
Alucinógenos	0,4
Inhalables volátiles	0,2
Alcohol	54,0
Resolución urgencia (%)	
Alta médica	73,1
Alta voluntaria	8,5
Ingreso hospitalario	14,8
Muerte en urgencias	0,1
Traslado a otro centro	3,5


* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Notas: Incluye las sustancias para las que el médico expresa en la historia clínica una relación directa con la urgencia. El alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.11.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas), según sexo. España, 2020.



	Total	Hombres	Mujeres
Alcohol	53,1	57,5	44,7
Hipnosedantes	33,0	24,2	49,6
Cannabis	22,0	24,9	16,6
Cocaína	19,6	23,4	12,3
Otros opioides	4,4	4,8	3,5
Heroína	3,3	4,3	1,4
Anfetaminas	2,8	3,2	2,0
MDMA y derivados	1,3	1,4	0,9
Alucinógenos	0,4	0,5	0,2
Inhalables volátiles	0,2	0,2	0,2


* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.12.

Porcentaje de sustancias relacionadas con los episodios de urgencia hospitalarias (incluyendo alcohol e hipnosedantes como sustancias únicas), por edad. España*, 2020.



* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: el alcohol y los hipnosedantes se registran también cuando son la única sustancia responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.13.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas únicamente con el consumo de alcohol. Total y según sexo. España*, 2020.

	Total	Hombres	Mujeres
Número de episodios	3.031	2.155	875
Edad media (años)	41,4	42,6	38,4
Sexo (%)			
Mujeres	28,9		
Resolución de la urgencia (%)			
Alta médica	75,5	74,0	79,5
Alta voluntaria	10,7	11,2	9,6
Ingreso hospitalario	12,2	13,3	9,4
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0
Traslado a otro centro	1,5	1,4	1,5

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: alcohol como única sustancia única responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.14.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas únicamente con el consumo de hipnosedantes. Total y según sexo. España*, 2020.

	Total	Hombres	Mujeres
Número de episodios	1.462	545	914
Edad media (años)	37,6	38,4	37,1
Sexo (%)			
Mujeres	62,5		
Resolución de la urgencia (%)			
Alta médica	76,1	73,7	77,4
Alta voluntaria	6,3	7,4	5,6
Ingreso hospitalario	12,7	13,6	12,1
Muerte en urgencias	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	5,0	5,3	4,9

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

Nota: hipnosedantes como única sustancia única responsable de la urgencia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2020

2.3.1.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 1983-2020.

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
Estimación nacional	266	440	453	516	741	1.067	1.440	1.440	1.833	1.760	1.399	1.067	
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	82	139	143	163	234	337	455	455	579	558	444	388	
Registro General de Mortalidad (INE)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Estimación nacional	1.051	1.310	1.127	1.049	972	1.012	923	1.079	900	796	1.004	820	703
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	–	–	–	–	–	444	496	496	493	468	455	428	475
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	395	421	339	306	291	284	268	229	270	212	242	218	188
Registro General de Mortalidad (INE)	–	–	–	–	752	691	650	652	633	659	636	48	519
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2107	2018	2019	2020
Estimación nacional	773	739	706	736	707	727	767	936	866	782	777	1.015	–
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	424	438	517	408	519	489	556	600	613	696	732	920	974
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210	212
Registro General de Mortalidad (INE)	540	442	393	361	383	403	455	390	483	437	450	546	774

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.


Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro General de Mortalidad (INE - Instituto Nacional de Estadística): Se incluyen los códigos CIE-10: F11, F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

2.3.2.

Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2020.



Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España*, 2003-2020.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Número de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732	920	974
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501	632	657	819	872
Sexo (%)																		
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7	80,9	80,6	83,4	78,1	81,6	80,8	77,4
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3	19,1	19,4	16,6	21,9	18,4	19,2	22,6
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42,0	42,7	44,3	43,6	44,1	44,5	44,9	44,4	45,5
Grupo de edad (%)																		
15-19 años	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2	0,7	0,8	0,5	0,0	0,3	0,8	0,9
20-24 años	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4	1,5	2,7	1,8	1,0	2,2	2,6	1,5
25-29 años	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6	4,7	4,7	5,4	5,5	4,4	4,1	4,7
30-34 años	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1	10,4	9,3	8,3	8,3	7,8	9,1	7,3
35-39 años	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7	13,8	18,3	14,0	15,9	13,0	12,7	11,5
40-44 años	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6	17,7	16,5	19,4	16,7	16,5	17,8	17,1
≥45 años	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3	51,2	47,7	50,6	52,6	55,8	52,9	56,9

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Estado civil (%)																		
Soltero	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3	59,3	64,8	64,2	63,3	62,9	62,0	59,6
Casado	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9	14,5	17,8	17,8	20,9	17,2	20,1	19,1
Separado/Divorciado	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9	23,1	16,5	15,6	13,9	17,8	15,6	17,7
Viudo	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1,0	3,1	0,9	2,5	1,9	2,1	2,4	3,6
Procedencia del cadáver (%)																		
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7	74,4	72,6	68,5	71,9	68,7	70,6	69,4
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1	2,4	3,3	3,8	4,0	2,6	3,6	4,7
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1	10,1	8,2	8,2	6,1	7,5	9,1	9,4
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5	0,9	2,1	2,1	3,0	2,6	2,2	1,8
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6	5,5	5,9	8,4	7,7	6,6	6,0	5,8
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1	1,5	3,1	3,3	2,7	5,6	3,1	3,2
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6,0	5,1	4,7	5,6	4,6	6,5	5,4	5,7
Evidencias de consumo reciente (%)																		
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8	81,8	84,9	82,0	88,1	80,4	85,4	83,8
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2	18,2	15,1	18,0	11,9	19,6	14,6	16,2
Evidencia de suicidio (%)																		
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1	20,3	26,4	20,6	22,9	18,4	23,2	26,1
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9	79,7	73,6	79,4	77,1	81,6	76,8	73,9
Signos recientes venopunción (%)																		
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2	12,5	13,5	13,0	13,3	11,3	12,8	8,7
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8	87,5	86,5	87,0	86,7	88,7	87,2	91,3
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)																		
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0	35,4	27,0	31,5	38,2	31,0	27,9	35,7
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0	64,6	73,0	68,5	61,8	69,0	72,1	64,3
Anticuerpos anti-VIH (%)																		
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5	27,2	26,2	21,4	22,1	25,8	18,0	17,4
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5	72,8	73,8	78,6	77,9	74,2	82,0	82,6

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.4.

Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en función del sexo. España*, 2020.


		Hombres	Mujeres
Sexo (%)	Hombre	751	–
	Mujer	–	219
Edad categorías (%)	Menor de 20 años	1,2	0,0
	Entre 20 y 24 años	1,5	1,8
	Entre 25 y 29 años	4,5	5,5
	Entre 30 y 34 años	8,1	4,6
	Entre 35 y 39 años	12,4	8,7
	Entre 40 y 44 años	18,4	12,8
	45 años o mas	53,9	66,7
Estado civil (%)	Soltero	64,5	46,5
	Casado	17,2	24,2
	Separado legalmente/Divorciado	16,8	20,2
	Viudo	1,5	9,1
Procedencia del cadáver (%)	Domicilio	66,6	79,1
	Hotel/Pensión	4,6	5,2
	Calle	10,3	6,2
	Establecimiento público	1,9	1,4
	Hospital	6,0	4,7
	Cárcel	4,0	0,5
	Otro lugar	6,5	2,8
Evidencias de consumo reciente de sustancias psicoactivas (%)	Si	82,7	87,4
	No	17,3	12,6
Signos de autopsia compatible con muerte RASUPSI (%)	Si	83,1	81,2
	No	16,9	18,8
Diagnóstico forense de muerte (%)	Si	87,8	86,7
	No	12,2	13,3
Evidencias de suicidio (%)	Si	18,6	49,7
	No	81,4	50,3
Signos recientes de venopunciones (%)	Si	9,5	6,5
	No	90,5	93,5
Muerte cuya causa es una patología previa (%)	Si	38,5	27,9
	No	61,5	72,1
Anticuerpos del VIH (%)	Positivo	20,1	10,1
	Negativo	79,9	89,9

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.5.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1996-2020.



* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.6.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1996-2020.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Opioides	90,4	89,8	90,1	88,0	89,4	86,8	83,8	76,7	74,9	78,2	78,7	72,8	
Cocaína	32,7	41,4	51,2	63,3	54,4	51,7	54,2	62,2	60,1	69,2	60,0	67,0	
Hipnosedantes	47,7	58,6	47,4	48,8	58,5	55,2	54,0	48,0	48,7	54,1	50,7	46,9	
Anfetaminas	4,0	8,6	2,8	4,5	6,9	3,4	2,9	3,1	2,6	2,6	3,6	3,6	
Cannabis	6,5	12,2	11,3	14,3	15,2	18,7	20,0	16,7	16,7	20,9	16,8	14,6	
MDMA	0,1	1,5	0,0	1,8	1,6	1,5	2,5	1,6	1,9	0,4	1,7	1,1	
Alcohol**	27,7	28,6	26,2	30,5	35,5	35,3	42,5	39,0	35,8	33	34,3	27,8	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opioides	77,7	79,8	79,1	77,9	76,6	77,3	64,0	64,7	63,9	58,1	58,6	59,0	59,5
Cocaína	60,2	59,1	57,3	52,2	58,6	54,1	51,7	48,8	53,7	53,2	61,6	60,3	52,9
Hipnosedantes	45,1	42,2	58,4	65,0	63,2	62,8	65,8	68,0	67,3	68,0	63,2	66,8	63,3
Anfetaminas	2,2	3,5	1,5	4,7	3,8	6,2	7,9	4,4	6,2	5,9	5,8	6,8	6,5
Cannabis	15,6	22,8	23,8	24,5	22,4	21,6	16,5	23,4	23,4	20,7	24,8	25,5	22,4
Extasis	1,4	1,1	0,8	1,7	1,7	1,1	3,5	2,3	2,8	1,7	4,3	2,3	1,9
Alcohol**	25,9	28,8	28,8	33,3	28,9	31,2	40,8	39,8	42,9	44,0	47,5	39,7	30,5

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.7.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico en función del sexo. España*, 2020.



* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.8.


Porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína, opioides y/o diferentes combinaciones de estas sustancias). España, 2005-2020.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo cocaína)	14,5	13,8	17,3	12,5	11,0	12,2	13,7	12,3
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye solo cocaína)	20,4	18,5	25,1	18,9	16,4	18,0	17,2	19,0
Sólo cocaína	5,9	4,7	7,8	6,4	5,4	5,8	3,4	6,7
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo opioides)	25,7	32,0	22,9	28,5	31,4	33,3	38,7	35,1
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides)	29,7	36,7	30,7	35,8	39,6	39,7	42,9	37,9
Sólo opioides	4,0	4,7	7,8	7,3	8,2	6,4	4,2	2,7
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides y cocaína)	48,8	40,0	40,8	40,3	41,5	39,5	35,0	39,5
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, sin sólo opioides y cocaína)	39,6	29,4	29,3	26,4	31,9	33,5	31,1	34,7
Solo opioides y cocaína	9,2	10,5	11,6	13,9	9,6	6,0	3,9	4,8
Nº de defunciones con información toxicológica	455	428	475	424	427	517	408	478
Número total de fallecidos	455	428	475	424	438	517	453	519
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo cocaína)	12,1	13,1	13,5	16,8	22,0	21,3	20,5	13,9
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye solo cocaína)	19,7	17,7	18,0	20,0	25,5	26,8	26,0	22,0
Sólo cocaína	7,6	4,6	4,4	3,2	3,5	5,5	5,5	8,1
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo opioides)	38,2	26,9	32,0	30,1	27,4	21,9	22,6	25,8
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides)	42,8	30,0	33,8	32,1	30,4	23,7	24,7	28,7
Sólo opioides	4,6	3,1	1,7	2,0	3,0	1,8	2,1	2,9
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides y cocaína)	34,3	34,0	30,9	33,7	27,7	34,9	34,3	30,8
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, sin sólo opioides y cocaína)	29,3	29,0	27,2	29,3	24,2	30,7	31,7	28,1
Solo opioides y cocaína	5,0	5,0	3,7	4,4	3,5	4,1	2,6	2,8
Nº de defunciones con información toxicológica	437	520	518	501	632	657	819	872
Número total de fallecidos	489	556	600	613	696	732	920	974

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.9.

Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España*, 2003-2020.




	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Opioides	376	349	356	338	340	324	346	409	318
Cocaína	305	280	315	250	313	251	247	297	213
Benzodiazepinas	234	225	241	203	212	186	180	292	258
Anfetaminas	15	12	12	15	17	9	13	8	19
Cannabis	82	78	95	70	68	65	88	123	100
Alcohol	191	167	150	143	130	108	120	149	136
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opioides	366	337	333	335	320	367	385	483	519
Cocaína	280	236	269	253	269	336	405	494	461
Benzodiazepinas	291	265	327	336	319	403	410	522	522
Anfetaminas	18	27	41	23	31	37	38	56	57
Cannabis	107	94	86	121	117	131	163	209	195
Alcohol	138	136	212	206	215	278	312	325	266
Casos analizados	478	437	520	518	501	632	657	819	872

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.10.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opiode, aunque haya otras sustancias). España*, 2005-2020.




* Comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.11.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España*, 1985-2020.



* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador. Calculados sobre los casos con alguna sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.12.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos). España, 2005-2020.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<15 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0
15-19 años	6	4	3	8	3	2	5	2	1	4	2	3	0	1	7	9
20-24 años	27	18	20	26	28	13	20	15	7	8	16	11	7	16	24	16
25-29 años	49	55	45	45	35	41	24	35	37	26	28	33	38	32	38	46
30-34 años	88	77	82	69	76	64	49	60	64	57	56	51	58	57	83	73
35-39 años	127	102	112	94	83	132	80	82	77	76	110	86	111	95	115	113
40-44 años	91	91	103	84	109	128	86	116	96	97	99	119	116	120	162	168
45-49 años	34	47	61	53	70	83	79	114	96	133	115	122	146	162	183	167
50-54 años	13	19	27	29	26	35	42	62	68	86	89	97	110	121	148	145
55-59 años	3	5	5	11	6	12	11	20	27	45	49	59	76	81	99	118
60-64 años	1	2	7	3	2	6	5	9	9	17	29	30	34	40	49	39
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27
Desconocido	16	8	10	2	0	1	51	4	7	7	4	0	0	6	12	53
Total	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732	920	974

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.13.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en hombres). España, 2010-2020.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<15 años	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0
15-19 años	1	1	2	1	2	0	3	0	0	4	9
20-24 años	11	16	12	4	8	11	10	4	12	21	12
25-29 años	34	21	31	29	22	27	30	28	28	32	34
30-34 años	58	40	54	55	43	47	44	46	49	72	63
35-39 años	114	70	70	60	64	92	72	94	84	101	94
40-44 años	109	70	99	82	70	84	103	94	94	124	139
45-49 años	66	60	94	76	104	95	102	118	132	146	127
50-54 años	29	32	54	55	64	65	76	88	102	112	111
55-59 años	7	7	15	19	33	34	48	48	59	85	81
60-64 años	3	2	7	7	10	22	21	23	29	35	23
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.14.


Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en mujeres). España, 2005-2020.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<15 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15-19 años	1	2	0	0	2	2	0	0	0	3	0
20-24 años	2	4	3	3	0	5	1	3	4	3	4
25-29 años	7	3	4	8	3	1	3	10	4	6	12
30-34 años	6	8	5	9	10	9	7	12	8	11	10
35-39 años	18	10	11	17	8	18	14	16	11	14	19
40-44 años	19	13	16	14	22	15	16	22	25	37	28
45-49 años	16	17	20	20	21	20	20	28	30	37	38
50-54 años	6	9	8	12	15	23	21	22	19	35	33
55-59 años	4	3	5	8	9	15	11	28	22	14	37
60-64 años	3	2	2	2	3	7	9	11	11	13	16
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.15.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo. España, 2004-2020.




	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hombres	390	391	359	409	357	370	432	375	442	394	448	483	511	543	595	741	751
Mujeres	75	62	67	59	60	68	83	71	74	94	106	116	102	152	134	176	219
Total	468	455	428	475	424	438	517	408	519	489	556	600	613	696	732	920	974

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.16.

Evolución número de fallecidos por códigos CIE* en el Registro General de Mortalidad. España, 2010-2020.




	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
F	47	27	33	22	23	24	25	13	39	24	33
X42	112	118	104	88	85	63	124	81	73	114	340
X44	230	211	239	289	338	285	329	330	332	388	380
X62	4	4	5	4	9	15	5	11	4	15	21
Y12	0	1	2	0	0	3	0	2	2	5	0

* Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12. Edad 10-64 años.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Datos Registro General de Mortalidad.

2.3.17.

Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2020.




	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<35 años	505	429	391	349	310	285	262	200	192	193	141
≥35 años	247	262	259	303	323	374	374	289	327	347	301
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<35 años	108	101	104	93	76	80	99	87	74	111	115
≥35 años	285	260	279	310	379	310	384	350	376	435	659
Total	393	361	383	403	455	390	483	437	450	546	774

* Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.18.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas según el Registro General de Mortalidad, según sexo y estimación del número de defunciones. España, 1999-2020.



Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.19.

Evolución de las edades de los fallecidos en 6 ciudades españolas*. España, 2005-2020.


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15-19 años	3	3	1	0	2	0	2	1	1	0	0	3	0	0	2	1
20-24 años	17	7	8	9	8	4	5	7	1	0	3	5	2	4	6	3
25-29 años	31	25	24	15	12	12	11	10	17	9	6	12	11	7	13	6
30-34 años	40	42	30	22	35	21	14	21	24	23	10	14	18	14	17	11
35-39 años	66	43	32	23	26	48	40	29	32	20	35	29	31	18	23	33
40-44 años	52	44	39	23	49	39	41	45	31	28	27	40	29	28	29	37
45-49 años	19	27	23	26	35	39	34	37	42	38	24	29	30	41	43	43
50-54 años	5	13	6	15	12	13	18	30	30	32	39	29	31	30	36	28
55-59 años	1	5	0	4	2	2	6	12	14	13	17	20	26	21	27	30
60-64 años	1	1	2	2	0	3	5	3	4	7	10	13	11	10	11	6
≥65 años	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Desconocida	2	0	23	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	3	3	0
Total fallecidos	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210	212

* Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.20.

Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2020.



* Independientemente de la aparición o no de otras sustancias.

Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.21.


Evolución del índice de infranotificación (Registro General de Mortalidad-Registro Específico). España, 2005-2020.

Año	Índice de infranotificación	Año	Índice de infranotificación
2005	1,58	2013	1,80
2006	1,68	2014	1,69
2007	1,35	2015	2,40
2008	1,43	2016	1,79
2009	1,67	2017	1,79
2010	1,80	2018	1,76
2011	2,04	2019	1,86
2012	1,85	2020	1,26

FUENTE: OEDA. Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.

2.3.22.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas (estimación nacional). España, 1983-2020.



Número de defunciones		Número de defunciones	
1983	266	2002	1.079
1984	440	2003	900
1985	453	2004	796
1986	516	2005	1.004
1987	741	2006	820
1988	1.067	2007	703
1989	1.440	2008	773
1990	1.440	2009	739
1991	1.833	2010	706
1992	1.760	2011	736
1993	1.399	2012	707
1994	1.067	2013	727
1995	1.051	2014	767
1996	1.310	2015	936
1997	1.127	2016	866
1998	1.049	2017	782
1999	972	2018	777
2000	1.012	2019	1.015
2001	923	2020	978

FUENTE: Estimación del Observatorio Español de la Droga y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y datos del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Información complementaria

Páginas web de interés

MINISTERIO DE SANIDAD

<http://www.sanidad.gob.es/>

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<https://pnsd.sanidad.gob.es/>

Encuesta Nacional de Salud

<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/>

MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

MINISTERIO DE HACIENDA

<https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx>

Comisionado para el Mercado de Tabacos

<https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/CMTabacos/Paginas/hometabacos.aspx>

Informes Anuales de Recaudación Tributaria

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria.shtml

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

<https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx>

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

<https://www.mdsocialesa2030.gob.es/>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

<https://www.ine.es/>

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

<https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx>

OFICINAS DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<https://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/es/>

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE)

INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD (INCB)

<https://www.incb.org/>

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)

THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

ENCUESTA EUROPEA SOBRE DROGAS: PATRONES DE USO

EUROPEAN WEB SURVEY ON DRUGS: PATTERNS OF USE (EWS)

https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs_en

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS (HBSC)

HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISIÓN EUROPEA. EUROBARÓMETRO

EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

<https://europa.eu/eurobarometer/screen/home>